

Міністерство охорони здоров'я України
Асоціація хірургів України

КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ

№ 10 (849) жовтень 2013

Щомісячний науково-практичний журнал
(спеціалізоване видання для лікарів)
Заснований у червні 1921 р.



Нагороджений
«КРИШТАЛЕВИМ РОГОМ ДОСТАТКУ»,
медалями «ТРУДОВА СЛАВА» та «ЛІДЕР НАЦІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ»
Міжнародної Академії

Рейтингових технологій та соціології
«Золота Фортuna»

Редактор
Г. В. Остроумова
Коректор
О. П. Заржицька

Видання включене до міжнародних наукометрических баз
SciVerse Scopus, EBSCOhost, Google Scholar та ін.

Затверджений постановою президії ВАК України
№ 1-05/1 від 10.02.10.

Свідоцтво про державну реєстрацію:
серія КВ № 1033.

Адреса редакції:
03680, м. Київ, МСП-03680, вул. Героїв Севастополя, 30,
редакція журналу «Клінічна хірургія».
Тел./факс (- 044) 408.18.11, <http://hirurgiya.com.ua>
e - mail: info@hirurgiya.com.ua
jcs@fm.com.ua

Передплатний індекс 74253

Підписано до друку 25.10.13. Формат 60 × 84/8.
Друк офсетний. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 10
Обл. вид. арк. 9,73. Тираж 1 500.
Замов. 412

Видавець
ТОВ «Ліга-Інформ»
03680, м. Київ, МСП-03680, вул. Героїв Севастополя, 30.
Тел./факс (- 044) 408.18.11.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб'єктів видавничої справи
ДК № 1678 від 04.02.04.

Надруковано з готових фотоформ
в друкарні ТОВ «Лазурит-Поліграф»
04048, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73,
тел./факс (- 044) 417.21.70.

Розмноження в будь-який формі матеріалів, опублікованих в
журналі, можливе тільки з письмового дозволу редакції.

Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе
рекламодавець.

© Клінічна хірургія, 2013
© Ліга – Інформ, 2013

ISSN 0023 - 2130



КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ

№ 10 (849) жовтень 2013

Головний редактор
М. Ю. Ничитайло

Заступник
головного редактора
С. А. Андреєщев

РЕДАКЦІЙНА
КОЛЕГІЯ

М. Ф. Дрюк
М. П. Захараш
В. І. Зубков
Г. В. Книшов
Г. П. Козинець
В. М. Копчак
О. Г. Котенко
Д. Ю. Кривченя
В. Б. Лазоришинець
О. С. Ларін
П. М. Перехрестенко
С. Є. Подпрятов
Ю. В. Поляченко
А. П. Радзіховський
Б. В. Радіонов
А. В. Скумс
І. М. Тодуров
О. Ю. Усенко
Я. П. Фелештинський
В. І. Цимбалюк
В. В. Чорний
С. О. Шалімов
П. О. Шкарбан

РЕДАКЦІЙНА
РАДА

Я. С. Березницький
В. В. Бойко
М. М. Велігоцький
В. В. Ганжий
Б. С. Запорожченко
І. В. Йоффе
Л. Я. Ковальчук
П. Г. Кондратенко
І. А. Криворучко
В. І. Лупальцов
О. С. Никоненко
В. В. Петрушенко
В. І. Русин
Ю. С. Семенюк
В. М. Старосек
А. І. Суходоля
С. Д. Шаповал



ЗМІСТ



ПРОБЛЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ

- 5-9 **Бондарь Г. В., Башеев В. Х., Совпель О. В., Совпель И. В.**
Перспективы развития хирургии рака прямой кишки
- 10-13 **Ничитайло М. Е., Булик Л. М., Яковлев Б. Ф.**
Лечение и профилактика инфекционных осложнений в гепатобилиарной хирургии
- 14-17 **Запорожченко Б. С., Шевченко В. Г., Зубков О. Б., Бородаев И. Е., Горбунов А. А.**
Функциональное состояние системы гемостаза у пациентов, оперированных по поводу псевдокист поджелудочной железы
- 18-20 **Ерко И. П., Молошок А. А., Зотов В. Н.**
Хирургическое лечение гастроинтестинальных стромальных опухолей
- 21-23 **Велиев Н. А., Гасанова Д. Н., Исмаилов В. Ф.**
Взаимная роль факторов эндотоксикоза и синдрома внутрибрюшной гипертензии в патогенезе абдоминального сепсиса
- 24-28 **Глоба М. В., Литвак С. О.**
Застосування інтраопераційної мікросудинної допплерографії при хірургічному лікуванні артеріальної аневризми головного мозку
- 29-32 **Зиньковский М. Ф., Сейдаметов Р. Р., Бацак Б. В., Довгань А. М., Трембовецкая Е. М., Атаманюк М. Ю., Дыкуха С. Е., Бабаджанов К. Б.**
Изучение кровотока по верхней полой вене для прогнозирования результатов применения двунаправленного кавапульмонального анастомоза для коррекции гемодинамики у пациентов при гипоплазии правого желудочка
- 33-37 **Никоненко А. С., Губка А. В., Волошин А. Н.**
PRP-терапия и регулярная физическая нагрузка в комплексе лечения пациентов по поводу дистальной формы артериальной окклюзии
- 38-40 **Шипулин П. П., Севергин В. Е., Кузнецов Н. А., Аграхари А.**
Опыт применения рентгеноэндоваскулярной эмболизации бронхиальных артерий в лечении легочного кровотечения
- 41-44 **Опанасенко М. С., Левандя Л. І., Кононенко В. А., Клименко В. І., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Конік Б. М., Обремська О. К., Демус Р. С., Кшановський О. Е.**
Актуальність проблеми поєднання у хворих цукрового діабету та туберкульозу органів дихання, що потребує хірургічного лікування
- 45-47 **Кабаков Б. О.**
Вплив сатурації змішаної капілярної крові на суб'єктивну оцінку інтенсивності післяопераційного болю
- 48-51 **Заруцький Я. Л., Трутяк І. Р.**
Етапне хірургічне лікування постраждалих за тяжкої закритої поєднаної абдомінальної травми
- 52-55 **Олійник О. В., Красій Н. І.**
Аналіз антибіотикорезистентності у хворих, яких лікували у Тернопільській університетській лікарні
- 56-58 **Паламарчук В. А.**
Значение хирургической реиннервации гортани в лечении инвазивного рака щитовидной железы
- 59-62 **Возняк О. М.**
Технічні особливості транссфеноїдальних хірургічних втручань з приводу аденоми гіпофіза, що секретує пролактин
- 63-66 **Нікітін О. Д., Базалицкая С. В.**
Еффективность оперативного лечения варикоцеле в плане восстановления репродуктивной функции
- 67-70 **Герасименко С. І., Байчук Б. П., Піонтковський В. К.**
Диференційований підхід до застосування остеосинтезу переломів кісток нижніх кінцівок при політравмі

ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ

- 71-76 **Колесник А. П., Шевченко А. І., Кузьменко В. А.**
Выполнение лимфодиссекции у больных, оперированных по поводу немелкоклеточного рака легкого
- 77-79 **Воловар О. С., Кустрій Т. В.**
Осаждение кристаллов кальция профосфата на суглобовых поверхностях скронево-нижньощелепного суглоба

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

- 80-80 **Березіна Л. Ф., Ільїн І. В.**
Заворот великого сальника





CONTENTS

GENERAL PROBLEMS OF SURGERY

- 5-9 Bondahr G. V., Basheyev V. Kh., Sovpel O. V., Sovpel I. V.
Perspectives of development of the cancer recti surgery
- 10-13 Nichitaylo M. E., Bulik L. M., Yakovlev B. F.
Treatment and prophylaxis of infectious complications in hepatobiliary surgery
- 14-17 Zaporozhchenko B. S., Shevchenko V. G., Zubkov O. B., Borodayev I. E., Gorbunov A. A.
Functional state of the hemostasis system in patients, operated for pancreatic pseudocysts
- 18-20 Yerko I. P., Moloshok A. A., Zотов V. N.
Surgical treatment of gastrointestinal stromal tumours
- 21-23 Veliyev N. A., Gasanova D. N., Ismailov V. F.
Mutual role of factors of endotoxicosis and intraabdominal hypertension syndrome in pathogenesis of abdominal sepsis
- 24-28 Globa M. V., Litvak S. O.
Application of intraoperative microvascular dopplerography in surgical treatment of arterial aneurysm of the brain
- 29-32 Zihnkovsky M. F., Seydametov R. R., Batsak B. V., Dovgahn A. M., Trembovetskaya E. M., Atamanyuk M. Yu., Dikucha S. E., Babadjanov K. B.
Superior vena cava blood flow measurements for results prognosing of a bidirectional cava-pulmonary anastomosis in correction of hemodynamics parameters in patients with hypoplastic right ventricle
- 33-37 Nikonenko A. S., Gubka A. V., Voloshin A. N.
PRP-therapy and regular physical load in complex of treatment of patients, suffering distal form of arterial occlusion
- 38-40 Shipulin P. P., Severgin V. E., Kuznetsov N. A., Agrahari A.
Application of roentgenendovascular embolization of bronchial arteries in the treatment of pulmonary hemorrhage
- 41-44 Opanasenko M. S., Levanda L. I., Kononenko V. A., Klymenko V. I., Tereshkovich O. V., Kalenychenko M. I., Konik B. M., Obremyska O. K., Demus R. S., Kshanovskiy O. E.
Actuality of problem of coexistent diabetes mellitus and pulmonary tuberculosis in patients, when surgical treatment is necessary
- 45-47 Kabakov B. O.
Impact of saturation of the mixed capillary blood on the subjective estimation of the postoperative pain intensity
- 48-51 Zarutskiy Ya. L., Trutyak I. R.
The staged surgical treatment of the injured persons in severe closed combined abdominal trauma
- 52-55 Oliynyk O. V., Krasiy N. I.
Analysis of the antibiotics resistance in the patients, treated in the Ternopil university hospital
- 56-58 Palamarchuk V. A.
Reinnervation of larynx in surgical treatment of invasive thyroidal gland cancer
- 59-62 Voznyak O. M.
Technical peculiarities of transsphenoidal surgical interventions of the hypophysis adenoma, which secrete prolactin
- 63-66 Nikitin O. D., Bazalitska S. V.
Reproductive efficiency of surgical treatment of varicocele
- 67-70 Gerasymenko S. I., Baychuk B. P., Piontkovskiy V. K.
Differentiated approach for the osteosynthesis application in polytrauma with the lower extremities bones fractures

REVIEWS

- 71-76 Kolesnik A. P., Shevchenko A. I., Kuhzmenko V. A.
Performance of the lymph node dissection in patients, operated on for nonsmallcell pulmonary cancer
- 77-79 Volovar O. S., Kstryo T. V.
Sedimentation of the calcium pyrophosphate crystals on the joints surfaces of the bones, creating temporo-mandibular joint

BRIEF COMMUNICATIONS

- 80-80 Berezina L. F., Ihlin I. V.
Torsion of the great omentum



ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ



УДК 616.24–006.6–089.12

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИМФОДИССЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО

А. П. Колесник, А. И. Шевченко, В. А. Кузьменко

Запорожский государственный медицинский университет

PERFORMANCE OF THE LYMPH NODE DISSECTION IN PATIENTS, OPERATED ON FOR NONSMALLCELL PULMONARY CANCER

A. P. Kolesnik, A. I. Shevchenko, V. A. Kubzmenko

Рак легкого (РЛ) является важной медико-социальной проблемой, что обусловлено высоким уровнем заболеваемости и смертности. Оперативное вмешательство – основной метод лечения РЛ, поскольку позволяет пациенту получить шанс на выздоровление. Операцией выбора является лобэктомия либо пульмонэктомия. Выполнение сегментэктомии возможно только при наличии сопутствующих заболеваний, что не позволяет выполнить больший объем хирургического вмешательства [1–5]. Если вопрос об объеме резекции паренхимы легких достаточно хорошо изучен и не требует обсуждения, относительно объема лимфодиссекции единого мнения нет. Удаление лимфатических узлов (ЛУ) средостения необходимо для адекватного стадирования и лечения пациента. Под адекватным стадированием подразумевают исследование ЛУ для обнаружения в них метастазов [6, 7]. Именно наличие метастазов у больных РЛ обуславливает прогрессирование заболевания и смерть. У 80% пациентов при наличии диагностированных метастазов в регионарных ЛУ обнаруживают гематогенные кластеры опухолевых клеток в костном мозге, что ассоциируется с неблагоприятным прогнозом.

Метастатическое поражение ЛУ средостения возможно установить с помощью неинвазивных и инвазивных методов. Из неинвазивных методов наиболее часто используют КТ/ПЭТ. Чувствительность КТ при определении метастатического поражения ЛУ средостения составляет от 4 до 70,5% [7–12]. Сочетанное использование КТ, определения уровня раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови и таллиум-201 позволяет улучшить стадирование ЛУ средостения [13].

Инвазивные процедуры (медиастиноскопия, эндобронхиальное и чреспищеводное ультразвуковое исследование, видеоассистированная медиастино-

скопическая лимфаденэктомия – VAMLA, трансцервикальная расширенная медиастинальная лимфаденэктомия – TEMLA) для корректного стадирования ЛУ являются более чувствительными методами по сравнению с КТ [14]. Однако имеются определенные сложности при применении инвазивных методов диагностики (точность исследования, доступность всех лимфатических коллекторов и др.). Необходимо дальнейшее изучение эффективности этих методов [7–16].

Наиболее точным методом, позволяющим определить наличие метастазов в ЛУ, является морфологическое исследование. Точность диагностики лимфогенного метастазирования РЛ зависит от качества материала, удаленного во время операции, а также особенностей патоморфологического анализа, при котором исследуют, как правило, малую часть ЛУ, а большая его часть остается вне поля зрения морфолога [17].

Успешная диагностика метастазов в ЛУ зависит от размеров узла, размеров метастаза, числа исследованных срезов, локализации метастаза в узле [18]. Кроме явных метастазов, возможно наличие в ЛУ так называемых "скрытых" метастазов (СМ), которые не выявляют при использовании обычных инструментальных методов (КТ, ПЭТ), а обнаруживают только при послеоперационном морфологическом исследовании. Наиболее часто для выявления СМ используют иммуногистохимическое исследование с антителами к AE1/AE3, Вег-Ер4 [19].

Существуют некоторые факторы, связанные с обнаружением метастазов в ЛУ у больных при немеллоклеточном РЛ (НМКРЛ). Из наиболее изученных – локализация, размеры, гистологический тип опухоли, инвазия злокачественным новообразованием кровеносных сосудов, висцеральной плевры [20].

Выделяют 3 прогностические группы больных РЛ [21]:

- низкий риск метастазирования: отсутствие инвазии висцеральной плевры, опухоль левого легкого;
- умеренный риск метастазирования: опухоль правого легкого без инвазии плевры или опухоль верхней доли левого легкого с инвазией висцеральной плевры;
- высокий риск метастазирования: опухоль правого легкого или опухоль нижней доли левого легкого с инвазией висцеральной плевры.

Некоторые авторы также отмечают более благоприятный прогноз у пациентов при расположении опухоли в верхней доле правого легкого, по сравнению с таковым у больных при раке нижней доли правого легкого (показатели пятилетней выживаемости соответственно 26,9 и 15,7%). Возможно, это обусловлено тем, что правосторонний верхнедолевой РЛ наиболее часто (в 23–27,3% наблюдений) поражает правосторонние паратрахеальные ЛУ, а правосторонний нижнедолевой рак – наиболее часто (в 14–48,8% наблюдений) метастазирует в субкарнальные ЛУ [20, 22, 23]. В то же время, наличие метастазов в наивысших ЛУ средостения значительно ухудшает прогноз у больных РЛ ($P=0,026$). Показатели трехлетней выживаемости составили 52% – у пациентов без метастазов в ЛУ и 21% – при наличии метастазов в ЛУ ($P < 0,001$).

В связи с этим разработаны рекомендации по диссекции ЛУ в зависимости от локализации опухоли. Удаление верхних ЛУ средостения с околоаортальными необходимо при локализации опухоли в верхней доле легкого; диссекцию паратрахеальных и бифуркационных ЛУ необходимо выполнять у пациентов при локализации опухоли в нижних долях легких [11, 23].

Однако некоторые авторы считают, что расположение опухоли не влияет на пути ее лимфатического распространения и характер поражения ЛУ [24].

Разноречивы также данные о связи размеров опухоли и частотой метастатического поражения ЛУ. По данным некоторых авторов, размеры опухоли не влияли на метастатическое поражение ЛУ средостения; другие – получили данные о том, что по мере увеличения размера опухоли на 1 см риск поражения ЛУ в стадии N2 или N3 повышается в 3 раза. Некоторые полагают, что размеры опухоли влияют на риск возникновения метастазов при определенной гистологической форме опухоли. Так, прогноз у пациентов при периферической adenокарциноме диаметром менее 2 см значительно лучше, чем у пациентов при железистом РЛ диаметром 2 см и более [12, 20, 25].

В связи с тем, что на основании прогностических критериев возможно лишь с определенной долей вероятности предположить поражение ЛУ средостения,

некоторые авторы рекомендуют проводить интраоперационную биопсию так называемых "сторожевых" ЛУ, которые поражаются в первую очередь по пути лимфатического метастазирования опухоли. При НМКРЛ сторожевые ЛУ выявляют у 80% пациентов, прогностическая значимость метода составляет 80–100% [26]. Некоторые авторы указывают на отсутствие метастазов в сторожевых ЛУ у 83% больных при РЛ I стадии, при этом не рекомендуют выполнение медиастинальной лимфодиссекции. Показатели пятилетней выживаемости при РЛ IA стадии составляли 96,6%, IB стадии – 67,4% [22, 27, 28]. Рекомендуют исследование сторожевых ЛУ следующих групп: 3, 7, 8, 10–й, 11–й – при наличии первичной опухоли в нижней доле справа, 4, 7–й и 10–й – при локализации опухоли в средней доле, 2, 3, 4–й, 10–й – в верхней доле справа, 4, 5, 6, 7–й, 10–й – в верхней доле слева, 4, 7, 8, 10–й, 11–й – в нижней доле слева [22]. К сожалению, единого стандарта исследования сторожевых ЛУ нет.

Однако у 17–33% пациентов РЛ метастазы в ЛУ средостения обнаруживаются при отсутствии метастазов в узлах корня легкого. Такое непоследовательное метастазирование называют "прыгающим". По данным гистологического исследования, "прыгающие" метастазы обнаружены при правосторонней локализации РЛ – в 22% наблюдений, при левосторонней – в 25% [29]. Наиболее часто "прыгающие" метастазы выявляются при adenокарциноме – у 55% больных, при плоскоклеточном РЛ – у 36%, при крупноклеточном – у 9,5% [29, 30].

Принимая во внимание приведенные данные, понятна необходимость точной диагностики поражения ЛУ. Большинство хирургов настаивают на обязательной систематической медиастинальной лимфодиссекции (СМЛД) у пациентов при НМКРЛ с последующим гистологическим исследованием удаленных ЛУ [1, 4, 31, 32].

Впервые о необходимости выполнения СМЛД у больных РЛ начали говорить в середине XX в. [33, 34]. N. Martini [35] в 1995 г. детализировал диссекцию ЛИ следующих анатомических зон: верхнее средостение справа, субаортальная зона слева, бифуркационная зона и нижнее средостение, сформулировав ее цель – удаление ЛУ средостения вместе с окружающей жировой тканью одним блоком. Такая техника получила название полной, или радикальной, лимфодиссекции ЛУ средостения. Объем ее справа включал все паратрахеальные ЛУ от подключичных сосудов до трахеобронхиального угла, все бифуркационные и околопищеводные ЛУ, расположенные в пространстве между главными бронхами, перикардом, пищеводом и нижней легочной веной, а также все ЛУ легочной связки. Слева, как предлагал N. Martini, полная лимфодиссекция ограничена ЛУ аортального окна, би-

фуркаціонними, околопищеводними і ЛУ легочної связки [35]. N. Wu и соавторы [20] описали лимфодиссекцію трьох отделів средостення: верхній отдел – 1–4–й колектори, середній отдел – 7–8–й колектори, нижній отдел – 9–й колектор. Передній край верхнього отдела – верхня полая вена, задній – трахея, нижній – легочна артерія, верхній – угол між плечеголовною веною і трахеєю. В середнім отделі средостення резекція ЛУ починається від верхнього края нижньої легочної вени, продовжується вгору вдоль перикарда і пищевода, обнажають правий і левий главні бронхи і кіль трахеї. Лимфодиссекція нижнього отдела средостення предполагає видалення жирової клетчатки з ЛУ нижньої легочної связки [20].

В таблиці представлена обсяг необхідної диссекції ЛУ в залежності від локалізації первинної опухолі, по даним Міжнародного об'єднання по дослідженням РЛ [36].

Крім СМЛД, відрізняють селективну медиастинальну лимфодиссекцію, розширену диссекцію. При розширеніх операціях виконують билатеральне видалення клетчатки средостення. При цьому показатели трьох- і п'ятилітньої виживаемості становлять відповідно 80,3 і 70%, після типичних операцій – 60 і 19% [37].

Билатеральна диссекція може бути виконана з використанням правостороннього доступа. Двусторонню лимфодиссекцію з використанням левостороннього доступа не вважають стандартною процедурою. Виконання билатеральної лимфодиссекції сліва можливо без пересечення ductus arteriosus і мобілізації аорти у больних при раке нижньої долі левого легкого і наявності метастазів в 7–й групі ЛУ, а також при локалізації опухолі в верхній долі левого легкого і пораженні 5–ї і/або 6–ї груп ЛУ [38].

Селективна медиастинальна лимфодиссекція – диссекція визначеного колектора ЛУ, в залежності від локалізації опухолі. Так, при локалізації опухолі в верхній долі рекомендують видалення ЛУ верхнього средостення, в нижній долі – нижнього отдела средостення [7, 25, 39].

Виконання медиастинальної диссекції можливе при відкритих або ендоскопічних опера-

ціях. При цьому немає значущих розниць ефективності і безпеки процедур [40, 41].

Некоторі хірурги рекомендують виконувати селективну лимфодиссекцію средостення. Це обумовлено відсутністю чітко визначених рекомендацій щодо обсягу лимфодиссекції, а також недостатніми даними про негативні наслідки СМЛД. За даними дослідників, СМЛД не покращує результатів виживаемості больних при НМКРЛ [24]. F. Ishiguro і соавтори [42] з 1995 по 2003 р. у 625 больних виконали СМЛД, у 147 – селективну лимфодиссекцію (семплінг). Показатели п'ятилітньої виживаемості становили відповідно 76 і 71,9%. Таким чином, селективна лимфодиссекція не ухудшує результатів лікування больних при НМКРЛ. Інші автори вказують, що дані відносно ефективності виконання лимфодиссекції у больних при НМКРЛ I стадії сомнительні і разнорічні, в то ж часі при II і III стадії – виконання лимфодиссекції сприяє достовірному покращенню показателей виживаемості больних [43–45]. Ефективність лимфодиссекції у больних різного віку відрізняється. У пацієнтів від 70 років при діаметрі опухолі менше 2 см виконання медиастинальної лимфодиссекції не покращує показателів трьохлітньої виживаемості по порівнянню з таковою після селективної лимфодиссекції (відповідно 81,3 і 77,5%) [12, 39, 46]. За даними авторів, СМЛД не впливає на загальну виживаемість, а покращує лише показателі безрецидивної виживаемості у больних при РЛ в стадії pN1–pN2, а також дозволяє частіше виявляти метастази в ЛУ N2 [47, 48]. Крім того, лимфодиссекція може ухудшувати результати лікування пацієнтів без метастазів в ЛУ. В. Whitson і соавтори [7] помічають збільшення частоти осложнень після СМЛД до 17,3% (після семплінга – 10,1%). Також після виконання СМЛД збільшується тривалість операційного втручання, як мінімум, на 15 хвилин, зростає ризик порушення возвратних нервів, виникнення хілоторакса, збільшується смертність в постоператорному періоді, зростає ризик формування рецидива опухолі (обумовлено збільшенням продукції цитокінів і факторів росту після СМЛД) [11, 21, 49–51]. В зв'язку з цим необхідно виділяти групу пацієнтів

Рекомендуюмий мінімальний обсяг лимфодиссекції ЛУ средостення у больних РЛ в залежності від локалізації первинної опухолі

Локалізація первинної опухолі	Обсяг лимфодиссекції
Верхня і середня долі правого легкого	Паратрахеальні, претрахеальні і бифуркаційні ЛУ
Нижня доля правого легкого	Бифуркаційні, нижні паратрахеальні, параезофагеальні і ЛУ легочної связки
Верхня доля левого легкого	Субаортальні, бифуркаційні і передні медиастинальні ЛУ
Нижня доля левого легкого	Бифуркаційні, параезофагеальні і ЛУ легочної связки

с высоким риском возникновения метастазов в ЛУ средостения и им производить лимфодиссекцию.

Сторонники выполнения СМЛД указывают на улучшение результатов лечения больных по поводу НМКРЛ после выполнения операции в полном объеме, особенно в стадии N2 [52, 53]. Однако B.Whitson и соавторы [7] по данным ретроспективного исследования отметили эффективность СМЛД и у больных РЛ I стадии. В исследование были включены 442 пациента с НМКРЛ I стадии, у которых выполнена выборочная диссекция медиастинальных ЛУ и СМЛД. После выборочной лимфодиссекции показатели пятилетней выживаемости значительно меньше, чем после СМЛД – соответственно 51 и 80% ($P=0,001$). По данным D. Lardinois и соавторов [11], у пациентов при НМКРЛ I стадии показатели безрецидивной выживаемости после СМЛД были лучше (60,2 мес), чем после выборочной лимфодиссекции ЛУ (44,8 мес) ($P < 0,03$). Локальный рецидив при НМКРЛ I стадии возник у 45% больных – после выборочной лимфодиссекции и у 13% – после СМЛД ($P = 0,02$); II стадии – соответственно у 55 и 17% ($P=0,09$). Лимфодиссекцию следует выполнять у всех пациентов при плоскоклеточном РЛ (диаметр опухоли 2 см и менее), аденокарциноме (диаметр опухоли 1 см и менее), мелкоклеточном раке (диаметр опухоли 1 см и менее), локализованном бронхиоло–альвеолярном раке (диаметр опухоли 2 см и менее), с фокусами активно пролиферирующих фибробластов [54]. Показатели пятилетней выживаемости у больных при РЛ после СМЛД составили 64,7%, после семпллинга – 59,1% [47, 55]. По данным B.Witte и соавторов [56], отмечены значительные различия в оценке состояния ЛУ средостения в различных клиниках: в академических клиниках их оценивали в 67,9% наблюдений, в общих универсальных медицинских центрах – в 55,6%, в общественных больницах – в 48,1%.

Нет единого мнения относительно того, какие коллекторы, какое количество ЛУ необходимо удалять для улучшения прогноза у больных РЛ [20]. В TNM классификации 7–й редакции дана характеристика стадии N в зависимости от локализации ЛУ. Однако в группы N1, N2 включены пациенты, гетерогенные в отношении прогноза. При классификации злокачественных новообразований грудной железы, желудка, толстой и прямой кишки учитывают количество ЛУ, поскольку это более надежный прогностический критерий, чем локализация ЛУ. По данным авторов, для точного установления стадии N необходимо исследовать, по меньшей мере, 6 ЛУ корня легкого и средостения (обязательно субкарнальные) [11, 20, 47]; другие авторы рекомендуют диссекцию 10–16 ЛУ из трех различных зон средостения. Отмечено увеличение общей выживаемости при увеличении количества удаленных ЛУ. Однако при удалении более 16 ЛУ

показатели выживаемости больных РЛ не улучшались [7, 20, 57, 58]. В исследовании A.Gajra и соавторов [47], пациенты, в зависимости от количества удаленных ЛУ, распределены на четыре группы (1–я группа – 0–3 ЛУ, 2–я группа – 4–6 ЛУ, 3–я группа – 7–9 ЛУ, 4–я группа – более 9 ЛУ). Показатели пятилетней общей выживаемости составили соответственно 47, 73, 76 и 79% ($P=0,0001$); безрецидивной – 43, 67, 76, и 75% ($P=0,0001$). У больных при НМКРЛ I стадии после удаления 11–12 ЛУ медиана выживаемости составила 97 мес, 1–2 ЛУ – 65 мес [7, 55, 59].

Кроме самого факта поражения метастазами ЛУ корня легкого или средостения, важно, какая именно группа ЛУ поражена. Так, по данным одномерного анализа установлен значительно лучший прогноз у больных при НМКРЛ с одноуровневым поражением ЛУ по сравнению с таковым при многоуровневом (показатели пятилетней выживаемости – соответственно 23,8–55 и 14,7–48%) [57, 60, 61]. Многоуровневое поражение ЛУ средостения чаще отмечают у больных при аденокарциноме легкого, чем при плоскоклеточном раке (у 66 и 48%). При поражении ЛУ доли легкого показатели выживаемости практически не отличаются от таких у пациентов при РЛ в стадии N0. При экстрадолевом поражении ЛУ в стадии N1 прогноз значительно ухудшается [60, 62].

Таким образом, практическое значение лимфодиссекции тяжело переоценить в плане диагностики и прогноза выживаемости больных, а также проведения адъювантной химиотерапии. Влияние СМЛД на показатели выживаемости проявляется благодаря правильному определению стадии и последующему назначению адъювантной терапии, а также терапевтическому эффекту диссекции не выявленных пораженных ЛУ в стадии N2 [7, 25, 44].

ЛИТЕРАТУРА

- National Collaborating Centre for Acute Care. The diagnosis and treatment of lung cancer. – London (UK): National Institute for Clinical Excellence (NICE), 2005. – 350 p.
- Role of sublobar resection (segmentectomy and wedge resection) in the surgical management of non-small cell lung cancer / B. Pettiford, M. Schuchert, R. Santos [et al.] // Thorac. Surg. Clin. – 2007. – Vol. 17. – P. 175 – 190.
- Scott W. Treatment of stage II non-small cell lung cancer / W. Scott, J. Howington, B. Movsas // Chest. – 2003. – Vol. 123. – P. 188 – 201.
- Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Management of patients with lung cancer. A national clinical guideline. – Edinburgh (Scotland): SIGN, 2005. – 63 p.
- Smythe W. Treatment of stage I non-small cell lung carcinoma / W. Smythe // Chest. – 2003. – Vol. 123. – P. 181 – 187.
- Давыдов М. И Современные принципы выбора лечебной тактики и возможности хирургического лечения немелкоклеточного рака легкого / М. И. Давыдов, Б. Е. Пороцкий // Новое в терапии рака легкого. – 2003. <http://medi.ru/doc/0446503.htm>
- Surgical assessment and intraoperative management of mediastinal lymph nodes in non-small cell lung cancer / B. Whitson, S. Groth, M. Maddaus [et al.] // Ann. Thorac Surg. – 2007. – Vol. 84. – P. 1059 – 1065.
- Плоскоклеточный рак легкого: иммуногистохимическое выявление микрометастазов в регионарных лимфатических узлах /

- В. Делекторская, А. Переvoщиков, Б. Погоцкий [и др.] // Клин. исследования. – 2002. – № 13(1). – С. 21 – 24.
9. Зборовская И. Б. Детекция молекулярных нарушений, характерных для рака легкого. Возможности использования в клинической практике / И. Б. Зборовская, В. В. Чижиков // Новое в терапии рака легкого. – 2003. <http://medi.ru/doc/0446502.htm>
 10. Хузин Ф. Прогностическое значение выявления скрытых микрометастазов в регионарных к раковой опухоли лимфатических узлах / Ф. Хузин, Д. Цышлаков // Казан. мед. журн. – 2010. – № 91(1). – С. 69 – 72.
 11. Morbidity, survival, and site of recurrence after mediastinal lymph-node dissection versus systematic sampling after complete resection for non-small cell lung cancer / D. Lardinois, H. Suter, H. Hakki [et al.] // Ann. Thorac. Surg. – 2005. – Vol. 80. – P. 268 – 275.
 12. Can tumor size be a guide for limited surgical intervention in patients with peripheral non-small cell lung cancer? Assessment from the point of view of nodal micrometastasis / Y. Ohta, M. Oda, J. Wu, Y. Tsuneyuka // J. Thorac. Cardiovasc. Surg. – 2001. – Vol. 122. – P. 900 – 906.
 13. Combined procedures for mediastinal staging in non-small cell lung cancer / M. Tomita, Y. Matsuzaki, M. Edagawa [et al.] // Asian Cardiovasc. Thorac. Ann. – 2004. – Vol. 12. – P. 125 – 129.
 14. Witte B. Does endoesophageal ultrasound-guided fine-needle aspiration replace mediastinoscopy in mediastinal staging of thoracic malignancies? // B. Witte, W. Neumeister, M. Huertgen // Eur. J. Cardiothorac. Surg. – 2008. – Vol. 33. – P. 1124 – 1128.
 15. Current evidence on transcervical mediastinal lymph nodes dissection / J. Kuzdzal, A. Szlubowski, Zb. Grochowski, W. Czajkowski // Ibid. – 2011. – Vol. 40. – P. 1470 – 1473.
 16. Comparison of computed tomography and systematic lymph node dissection in determining TNM and stage in non-small cell lung cancer / Th. Siorisa, R. Jarvenpaa, P. Kuukasjarvi [et al.] // Ibid. – 2003. – Vol. 23. – P. 403 – 408.
 17. Junker K. Histopathologic evaluation of mediastinal lymph nodes in lung cancer / K. Junker // Lung Cancer. – 2004. – Vol. 45, N 2. – P. 79 – 83.
 18. Wilkinson E. Probability in lymph node sectioning / E. Wilkinson, L. Hause // Cancer. – 1974. – Vol. 33. – P. 1269 – 1274.
 19. Mediastinal lymphadenectomy in non-small cell lung cancer: effectiveness in patients with or without nodal micrometastases – results of a preliminary study / B. Passlicka, B. Kubuschok, W. Sielen [et al.] // Eur. J. Cardiothorac. Surg. – 2002. – Vol. 21. – P. 520 – 526.
 20. Systemic mediastinal lymph node dissection of right lung cancer: surgical quality control and analysis of mediastinal lymph node metastatic patterns / N. Wu, C. Lv, S. Yan [et al.] // Interact. CardioVasc. Thorac. Surg. – 2008. – Vol. 7. – P. 240 – 243.
 21. Classification for predicting mediastinal lymph node metastases in patients with T1 or T2 lung cancer / A. Bernard, L. Benoit, C. Renaud, J. Favre // Ibid. – 2005. – Vol. 4. – P. 256 – 259.
 22. Lymph node sampling in lung cancer: how should it be done? / T. Naruke, R. Tsuchiya, H. Kondo [et al.] // Eur. J. Cardiothorac. Surg. – 1999. – Vol. 16. – P. 17 – 24.
 23. Lymph node involvement, recurrence and prognosis in resected small, peripheral non-small cell lung carcinomas: are these carcinomas candidates for video-assisted lobectomy? // H. Asamura, H. Nakayama, H. Kondo [et al.] // J. Thorac. Cardiovasc. Surg. – 1996. – Vol. 111. – P. 1125 – 1134.
 24. Radical systematic mediastinal lymphadenectomy in non-small cell lung cancer: a randomized controlled trial / J. Izicki, O. Thetter, M. Habekost [et al.] // Br. J. Surg. – 1994. – Vol. 81. – P. 229 – 235.
 25. Proposal for reasonable mediastinal lymphadenectomy in bronchogenic carcinomas: Role of subcarinal nodes in selective dissection / M. Okada, N. Tsubota, M. Yoshimura, Y. Miyamoto // J. Thorac. Cardiovasc. Surg. – 1998. – Vol. 116. – P. 949 – 953.
 26. Intraoperative sentinel lymph node mapping in non-small-cell lung cancer improves detection of micrometastases / M. Liptay, S. Grondin, W. Fry [et al.] // J. Clin. Oncol. – 2002. – Vol. 20, N 8. – P. 1984 – 1988.
 27. Limited mediastinal lymph node dissection for non-small cell lung cancer according to intraoperative histologic examinations / T. Yoshimasu, S. Miyoshi, S. Oura [et al.] // J. Thorac. Cardiovasc. Surg. – 2005. – Vol. 130. – P. 433 – 437.
 28. Sentinel node sampling limits lymphadenectomy in stage I non-small cell lung cancer / M. Muraoka, Sh. Akamine, T. Oka [et al.] // Eur. J. Cardiothorac. Surg. – 2007. – Vol. 32. – P. 356 – 361.
 29. Sugi K. Usefulness of sentinel lymph node biopsy for the detection of lymph node micrometastasis in early lung cancer / K. Sugi // Interact. CardioVasc. Thorac. Surg. – 2008. – Vol. 7. – P. 913 – 915.
 30. Skip mediastinal nodal metastases in non-small cell lung cancer / F. Tanaka, K. Takenaka, H. Oyanagi [et al.] // Eur. J. Cardiothorac. Surg. – 2004. – Vol. 25. – P. 1114 – 1120.
 31. Prognostic classifications of lymph node involvement in lung cancer and current International Association for the Study of Lung Cancer descriptive classification in zones / M. Riquet, A. Arame, C. Foucault [et al.] // Interact. CardioVasc. Thorac. Surg. – 2010. – Vol. 11. – P. 260 – 264.
 32. Type of resection and prognosis in lung cancer. Experience of a multicentre study / R. Rami-Portaa, M. Mateu-Navarroa, J. Freixinet, M. de la Torrec // Eur. J. Cardiothorac. Surg. – 2005. – Vol. 28. – P. 622 – 628.
 33. Колесников И. С. Оперативные вмешательства при раке легкого / И. С. Колесников. – Л.: Медгиз, 1975. – 296 с.
 34. Cahan W. Radical pneumonectomy / W. Cahan, W. Watson, J. Pool // J. Thorac. Cardiovasc. Surg. – 1951. – Vol. 22. – P. 449 – 471.
 35. Martini N. Mediastinal lymph node dissection for lung cancer / N. Martini // Chest Surg. Clin. N. Am. – 1995. – Vol. 5. – P. 189 – 203.
 36. Акопов А. Л. Лимфогенное метастазирование рака легкого: можно ли считать операционную диагностику окончательной? / А. Л. Акопов // <http://omr.med.by/html/www/journal/oj3/akopov.pdf>
 37. Черных А. Современные варианты лечения немелкоклеточного рака / А. Черных // Вестн. Санкт-Петербург. мед. ун-та. – 2009. – № 2. – С. 153 – 163.
 38. Alternative paratracheal lymph node dissection in left-sided hilar lung cancer patients: comparing the number of lymph nodes dissected to the number of lymph nodes dissected in right-sided mediastinal dissections / A. Toker, S. Tanju, S. Ziyade [et al.] // Eur. J. Cardiothorac. Surg. – 2011. – Vol. 39. – P. 974 – 980.
 39. Can non-performance of radical systematic mediastinal lymphadenectomy be justified in elderly lung cancer patients? An evaluation using propensity-based survival analysis / T. Okasaka, N. Usami, T. Taniguchi [et al.] // Ibid. – 2010. – Vol. 38. – P. 27 – 33.
 40. Mediastinal lymph node dissection in early-stage non-small cell lung cancer: totally thoracoscopic vs thoracotomy / R. Ramosa, P. Girarda, C. Masueta [et al.] // Ibid. – 2012. – Vol. 41. – P. 1342 – 1348.
 41. Efficacy of mediastinal lymph node dissection during lobectomy for lung cancer by thoracoscopy and thoracotomy / Th. D'Amico, J. Niland, R. Mamen [et al.] // Ann. Thorac. Surg. – 2011. – Vol. 92. – P. 226 – 232.
 42. Effect of selective lymph node dissection based on patterns of lobe-specific lymph node metastases on patient outcome in patients with resectable non-small cell lung cancer: A large-scale retrospective cohort study applying a propensity score / F. Ishiguro, K. Matsuo, T. Fukui [et al.] // J. Thorac. Cardiovasc. Surg. – 2010. – Vol. 139. – P. 1001 – 1006.
 43. Selective mediastinal lymphadenectomy for clinico-surgical stage I non-small cell lung cancer / M. Okada, T. Sakamoto, T. Yuki [et al.] // Ann. Thorac. Surg. – 2006. – Vol. 81. – P. 1028 – 1032.
 44. In patients undergoing lung resection for non-small cell lung cancer, is lymph node dissection or sampling superior? / M. Hughes, M. Chowdhry, S. Woolley, W. Walker // Interact. CardioVasc. Thorac. Surg. – 2011. – Vol. 13. – P. 311 – 315.
 45. De Giacomo T. Role of lymphadenectomy in the treatment of clinical stage I non-small cell lung cancer / T. De Giacomo, F. Venuta, E. Rendina // Thorac. Surg. Clin. – 2007. – Vol. 17. – P. 217 – 221.
 46. Extent of mediastinal node metastasis in clinical stage I non-small-cell lung cancer: the role of systematic nodal dissection / M. Oda, Y. Watanabe, J. Shimizu [et al.] // Lung Cancer. – 1998. – Vol. 22. – P. 23 – 30.
 47. Effect of number of lymph nodes sampled on outcome in patients with stage I non-small-cell lung cancer / A. Gajra, N. Newman,

- G. Gamble [et al.] // J. Clin. Oncol. – 2003. – Vol. 21. – P. 1029 – 1034.
48. Mediastinal lymph node dissection improves survival in patients with stages II and IIIa non–small cell lung cancer / S. Keller, S. Adak, H. Wagner [et al.] // Ann. Thorac. Surg. – 2000. – Vol. 70. – P. 358 – 365.
49. Lewis R. Is radical lymphadenectomy a valid oncologic procedure?// R. Lewis // Eur. J. Cardiothorac. Surg. – 1999. – Vol. 16, N 1. – P. 11 – 12.
50. Completeness of lung cancer surgery: is mediastinal dissection common practice? // A. Verhagen, M. Schoenmakers, W. Barendregt, H. Smitc // Eur. J. Cardiothorac. Surg. – 2012. – Vol. 41. – P. 834 – 838.
51. Morbidity and mortality of major pulmonary resections in patients with early–stage lung cancer: initial results of the randomized, prospective ACOSOG Z0030 trial / M. Allen, G. Darling, T. Pechet [et al.] // Ann. Thorac. Surg. – 2006. – Vol. 81. – P. 1013 – 1019.
52. Sampling or node dissection for intraoperative staging of lung cancer: a multicentric cross–sectional study / G. Massard, X. Ducrocq, E. Kochetkova [et al.] // Eur. J. Cardiothorac. Surg. – 2006. – Vol. 30. – P. 164 – 167.
53. Long–term survivors with pN2 non–small cell lung cancer after a complete resection with a systematic mediastinal node dissection / T. Yano, Y. Fukuyama, H. Yokoyama [et al.] // Ibid. – 1998. – Vol. 14. – P. 152 – 155.
54. Should mediastinal nodal dissection be routinely undertaken in patients with peripheral small–sized (2 cm or less) lung cancer? Retrospective analysis of 225 patients / S. Watanabe, M. Oda, T. Go [et al.] // Ibid. – 2001. – Vol. 20. – P. 1007 – 1011.
55. Does the extent of lymph node dissection influence outcome in patients with stage I non–small–cell lung cancer? / C. Doddoli, A. Aragon, F. Barlesi [et al.] // Ibid. – 2005. – Vol. 27. – P. 680 – 685.
56. Video–assisted mediastinoscopic surgery: clinical feasibility and accuracy of mediastinal lymph node staging / B. Witte, M. Wolf, M. Huertgen [et al.] // Ann. Thorac. Surg. – 2006. – Vol. 82. – P. 1821 – 1827.
57. Prognostic value of single nodal zone metastasis in non–small–cell lung cancer / M. Kim, H. Lee, J. Lee [et al.] // Eur. J. Cardiothorac. Surg. – 2010. – Vol. 38. – P. 491 – 497.
58. Proposal of new nodal classifications for non–small–cell lung cancer based on the number and ratio of metastatic lymph nodes / H. Matsugumaa, I. Okib, R. Nakaharaa [et al.] // Ibid. – 2012. – Vol. 41. – P. 12 – 24.
59. A randomized trial of postoperative adjuvant therapy in patients with completely resected stage II or IIIA non–small–cell lung cancer. Eastern Cooperative Oncology Group / S. Keller, S. Adak, H. Wagner [et al.] // New Engl. J. Med. – 2000. – Vol. 343. – P. 1217 – 1222.
60. Riquet M. Direct lymphatic drainage of lung segments to the mediastinal nodes. An anatomic study on 260 adults / M. Riquet, G. Hidden, B. Debesse // J. Thorac. Cardiovasc. Surg. – 1989. – Vol. 97. – P. 623 – 632.
61. Lobe–specific extent of systematic lymph node dissection for non–small cell lung carcinomas according to a retrospective study of metastasis and prognosis / M. Allen, H. Nakayama, H. Kondo [et al.] // Ibid. – 1999. – Vol. 117. – P. 1102 – 1111.
62. Prognostic significance of surgical–pathologic N1 lymph node involvement in non–small cell lung cancer / A. Demir, A. Turna, C. Kocaturk [et al.] // Ann. Thorac. Surg. – 2009. – Vol. 87. – P. 1014 – 1022.

