



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ - 2015

**Сборник тезисов докладов
69-й научно-практической конференции
студентов и молодых ученых с
международным участием**

Минск БГМУ
2015

УДК 61:615.1(043.2)

ББК 52я73

А43

Рецензенты: член-корреспондент НАН Беларуси, д.м.н., профессор Висмонт Ф. И.; д.м.н., профессор Таганович А. Д.; заслуженный деятель науки РБ, д.м.н., профессор Третьяк С. И.

Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2015"
сборник тезисов докладов 69-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием.

В авторской редакции.

/под редакцией профессора О. К. Кулаги, профессора Е. В. Барковского, -
Минск: БГМУ, 2015/

ISBN 978-985-567-176-4

Содержатся тезисы докладов студентов и молодых ученых, посвященных широкому кругу актуальных проблем современной теоретической и практической медицины и фармации. Рекомендован студентам высших учебных медицинских заведений и медицинских колледжей, врачам, научным сотрудникам.

ISBN 978-985-567-176-4



УДК 61:615.1(043.2)

ББК 52я73

А43

Варакута О. А.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ БИОПЛЕНКИ ЗУБОДЕСНЕВОЙ БОРОЗДЫ НА ФОНЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА

Научный руководитель д-р биол. наук, проф. Куц О. Г.

Кафедра оториноларингологии и стоматологической пропедевтики

Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье

Актуальность. В системе «наружных барьеров» слизистая оболочка полости рта представляет собой первую линию защиты организма против разнообразных патогенных факторов окружающей среды и отражает постоянство внутренней среды.

Устойчивость анатомических образований и слизистой оболочки полости рта к повреждающим факторам микробного происхождения зависит от состояния защитных систем.

Цель: исследовать качественный и количественный состав биополимеров в структуре биопленки зубодесневой борозды, микробиологическую нагрузку в норме и при экспериментальном сахарном диабете.

Задачи:

1 Изучить качественный и количественный состав биопленки крыс в норме и на фоне экспериментального сахарного диабета.

2 Изучить структуру биополимеров, входящих в биопленку в норме и при перманентной гипергликемии.

Материал и методы. Объектом исследования стали челюсти лабораторных крыс. Для индукции сахарного диабета крысам вводили стрептозотоцин.

Проводили изучение пристеночной микрофлоры. Метод фиксации биопсийного материала с сохранением биопленки по Морозову И.А. (1999). Для изучения углеводных полимеров биопленки ставили лектингистохимический метод.

Результаты и их обсуждение. В биопленке у животных с моделированным сахарным диабетом доминирует кокковая микрофлора. Количество кислых-черных кокков составляет 1675 ± 46 клеток на единицу площади. Одновременно в биопленке увеличивается количество биополимеров, имеющие углеводные остатки: β DGal, α NacDGal и α DMan, NAc α DGal. Особенно увеличивается количество биополимеров, имеющих рецепторы к галактозе (++++) и галактазамину (++++).

Выводы:

1 При экспериментальном сахарном диабете увеличивается микробная нагрузка в биопленке эпителия зубодесневой борозды и изменяется качественный микробный пейзаж, в сравнении с нормой.

2 Гипергликемия постоянного характера способствует усиленному накоплению в биопленке биополимеров, имеющих концевые углеводные остатки к галактозе, галактазамину, маннозе, что изменяет биоценоз биопленки и лимфоидной компонент слизистой десны.