



ISSN 2522-1116

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**науково-практичної конференції з міжнародною участю
молодих вчених та студентів**

**«Актуальні питання сучасної медицини і
фармації - 2021»**

15 – 16 квітня 2021 року



ЗАПОРІЖЖЯ – 2021

УДК: 61

А43

Конференцію зареєстровано в Укр ІНТЕІ (посвідчення № 163 від 12.02.2021).

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова оргкомітету: проф. Колесник Ю.М.

Заступники голови: проф. Туманський В.О., проф. Беленічев І.Ф.

Члени оргкомітету: проф. Візір В.А., доц. Моргунцова С.А., доц. Павлов С.В., доц. Лур'є К.І., доц. Кремзер О.О., доц. Полковніков Ю.Ф., доц. Шишкін М.А., д.біол.н., проф. Разнатовська О.М., ст.викл. Абросімов Ю.Ю., голова студентської ради Турчиненко В.В.

Секретаріат: ас. Данукало М.В., ст.викл. Борсук С.О.

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Актуальні питання сучасної медицини і фармації – 2021» (Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, 15 – 16 квітня 2021 р.). – Запоріжжя: ЗДМУ, 2021. – 202с.

ISSN 2522-1116

Запорізький державний медичний
університет, 2021.

СТРУКТУРА ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ВАГІТНИХ ЖІНОК З РЕПРОДУКТИВНИМИ ВТРАТАМИ В АНАМНЕЗИ

Соловйова Н.М.

Науковий керівник: д.мед.н., доц. Сюсюка В.Г.

Кафедра акушерства і гінекології

Запорізький державний медичний університет

Проблема репродуктивних втрат залишається актуальною в сучасному акушерстві. Щорічно в країні майже кожна п'ята бажана вагітність завершується мимовільним абортom. Втрачені вагітності складають 15-20 % всіх бажаних, а 75-80 % викиднів відбувається в терміні гестації до 12 тижнів, при цьому відсутня тенденція до їх зниження (Scarpellini F., Sbracia M., 2020). Висока частота цього ускладнення вагітності вказує на труднощі, що виникають при веденні жінок з невиношуванням вагітності в анамнезі (Hyde K.J., 2015).

Мета роботи: дати оцінку структури екстрагенітальної патології у вагітних жінок з репродуктивними втратами в анамнезі.

Матеріали та методи дослідження: проведено ретроспективний аналіз 100 історій пологів жінок репродуктивними втратами в анамнезі, які народжували у пологовому відділенні КНП "Пологовий будинок №9" ЗМР, за період 2017-2019 рр. Варіаційно-статистична обробка проводилась з використанням програми «STATISTICA 13.0».

Результати дослідження та їх обговорення: за результатами аналізу історій пологів встановлено, що 73 % вагітних жінок з репродуктивними втратами в анамнезі мають екстрагенітальну патологію (ЕГП). В загальній структурі провідне місце займають захворювання серцево-судинної (41 %) та сечовидільної (20,5 %) систем. Варикозну хворобу вен нижніх кінцівок мали 10,9% жінок, захворювання органів дихання і травлення – 6,8 % та 4,1 %, відповідно та у 5,5 % мало місце ожиріння I-II ступеня. У 43,8 % жінок ЕГП мала поєднаний характер. Патологія серцево-судинної системи представлена пролапсом мітрального клапану 1 ст. у 26,0 %, варикозною хворобою вен нижніх кінцівок у 10,9 % та хронічною артеріальною гіпертензією у 4,1 % жінок, а захворювання сечостатевої системи – хронічним пієлонефритом (9,6%), сечокам'яною хворобою (2,7 %) та хронічним циститом (8,2 %). Серед хвороб ока та придаткового апарату встановлені: міопія середнього ступеня (15 %), астигматизм (5,5 %) та ангіопатія сітківки (1,4 %).

Висновок результати проведеного дослідження свідчать, що у 73 % вагітних з репродуктивними втратами встановлена екстрагенітальна патологія, яка у 43,8 % жінок мала поєднаний характер. Провідне місце серед них займають хвороби серцево-судинної (41 %), сечовидільної систем (20,5%).

КЛІНІЧНО-АНАМНЕСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ІЗ СИНДРОМОМ ПОЛІКІСТОЗУ ЯЄЧНИКІВ

Єршова О.А.

Науковий керівник: д.мед.н., доц. Сюсюка В.Г.

Кафедра акушерства і гінекології

Запорізький державний медичний університет

Синдром полікістозу яєчників (СПКЯ) – це системна патологія, при якій порушуються всі ланки ендокринної системи, а не лише функція яєчників. СПКЯ зустрічається у жінок будь-якого віку, розпочинаючи від пубертатного періоду та до менопаузи, із залученням у процес майже всіх систем організму [Урбанович А. М., 2018]. Він є дуже поширеним ендокринним порушенням серед жінок репродуктивного віку і у загальній популяції спостерігається в 6-15% жінок [Камінський В. В., 2016]. Основна мета діагностики СПКЯ – визначення ступеня тяжкості клінічних проявів, джерела та патогенезу гіперпродукції андрогенів, впливу на репродуктивну функцію, оцінка метаболічних і кардіоваскулярних ризиків [Baskind N. E., Balen A. H., 2016].

Мета дослідження: з'ясувати клінічно-анамнестичні особливості жінок репродуктивного віку із синдромом полікістозу яєчників.

Матеріали і методи. В основну групу дослідження включено 34 пацієнтки, які звернулися з приводу порушення менструального циклу та/або дерматопатій за рекомендацією дерматолога. Контрольна група представлена 30 жінками без гінекологічної та соматичної патології. Середній вік жінок основної групи склав $26,4 \pm 0,9$ років та $29,1 \pm 0,9$ років в групі контролю ($p > 0,05$). Вік жінок в групах дослідження знаходився в межах 18-35 років.