



ISSN 2522-1116

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**82 Всеукраїнської науково-практичної конференції з
міжнародною участю молодих вчених та студентів**

**«Актуальні питання сучасної медицини і
фармації - 2022»**

17 травня 2022 року



ЗАПОРІЖЖЯ – 2022

УДК: 61
А43

Конференція входить до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2022 році

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:

ректор ЗДМУ, Заслужений діяч науки і техніки України, **проф. КОЛЕСНИК Ю.М.**

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:

Проректор з наукової роботи, Заслужений діяч науки і техніки України, **проф. Туманський в.о.;**

Голова Координаційної ради з наукової роботи студентів, **проф. Бєленічев і.ф.;**

Члени оргкомітету: проф. Візір В.А., доц. Моргунцова С.А., проф. Павлов С.В., доц. Компанієць В.М., доц. Кремзер О.О., доц. Полковніков Ю.Ф., доц. Шишкін М.А., ст. викл. Абросімов Ю.Ю., голова студентської ради Федоров А.І.

Секретаріат: ас. Попазова О.О.; Будагов Р. І. заступник голови студентської ради; Єложенко І. Л. голова навчально-наукового сектору студентської ради

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Актуальні питання сучасної медицини і фармації – 2022» (Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, 17 травня 2022 р.). – Запоріжжя: ЗДМУ, 2022. – 121с.

ISSN 2522-1116

Запорізький державний
медичний університет, 2022.

ЗМІСТ

| | |
|--|-----------|
| КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА | 10 |
| ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ГЕМОКОАГУЛЯЦІЇ ТА ЧАСТОТА РОЗВИТКУ ТРОМБОТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ПОМЕРЛИХ ХВОРИХ ВНАСЛІДОК COVID-19 | 10 |
| Черкаський В. В., Савченко Д. О. | |
| СЕРОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХВОРОБОЮ ЛАЙМА ЗАЛЕЖНО ВІД ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ . | 10 |
| Рябокоть Д. Ю., Пак К. А. | |
| ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СЕРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ДОРΟΣЛИХ ХВОРИХ НА КІР ІЗ РОЗВИТКОМ УСКЛАДНЕНЬ . | 11 |
| Білокобила С. О. | |
| СТАН КИШЕЧНИКУ У ДІТЕЙ РАНЬОГО ВІКУ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОЇ ГОСТРОЇ ДІАРЕЇ ЗА ДАНИМИ 6-МІСЯЧНОГО КАТАМНЕЗУ..... | 12 |
| Білих В. М. | |
| АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОШКОДЖЕНЬ ТАЗОВОГО КІЛЬЦЯ ТА ОБСЯГУ ЛІКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З ПЕРЕЛОМАМИ ТАЗУ | 12 |
| Богдан С. О. | |
| ЕФЕКТИВНІСТЬ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЛЮДЕЙ БЕЗ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ З НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 13 |
| Будагов Р. І., Єложенко І. Л. | |
| ГОСТРА ІНФЕКЦІЙНА ДІАРЕЯ – ВПЛИВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИНКОМ ДІТЕЙ РАНЬОГО ВІКУ НА ПЕРЕБІГ ХВОРОБИ | 14 |
| Печугіна В. В. | |
| ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ОСТЕОАРТРИТІ У ПІДЛІТКІВ | 14 |
| Ворона Д. А., Кобзар Д. С., Єлецький М. С., Тесленко А.О. | |
| ПРОБЛЕМА ШЕМІЇ ПРИ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧОЇ ХІРУРГІЇ ПУХЛИН НИРОК | 15 |
| Гайдур М. В. | |
| РЕМОДЕЛЮВАННЯ СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ ST 3 ЛЕГЕНЕВОЮ ГІПЕРТЕНЗІЮ | 16 |
| Дземешкевич Д. М. | |
| ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ ПОДУШКИ ПІСЛЯ АНТИГЛАУКОМНИХ ВТРУЧАНЬ ФІЛЬТРУЮЧОГО І НЕПРОНИКАЮЧОГО ТИПУ У ВІДДАЛЕНИХ ТЕРМІНАХ | 17 |
| Діденко Л. Г. | |
| КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ COVID-19 ІНФЕКЦІЇ У ХВОРИХ НА АЛЕРГІЧНУ ПАТАЛОГІЮ | 17 |
| Дрига А. О. Шаповалова А. О. | |
| ТОПОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЕГ-ПАТЕРНУ У ПАЦІЄНТІВ З ГПІ У ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ ЗАХВОРЮВАННЯ | 18 |
| Дронова А. О. | |
| ВПЛИВ КОМБІНОВАНОЇ ТЕРАПІЇ ПЕРИНДОПРИЛОМ З АМЛОДИПІНОМ НА ФУНЦІЮ НИРОК ТА ПАРАМЕТРИ ДОБОВОГО МОНІТОРУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ЧОЛОВІКІВ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА ПОРУШЕННЯМ ПУРИНОВОГО ОБМІНУ..... | 19 |
| Дудко О. В. | |
| ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ СИНДРОМУ ПОЛІКІСТОЗУ ЯЄЧНИКІВ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІСІ..... | 20 |
| Єршова О. А. | |
| РОЛЬ ГЕПСИДИНУ У РОЗВИТКУ ТА ХРОНІЗАЦІЇ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ | 20 |
| Захарченко Н. А. | |
| ВИБІР МЕТОДУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПРЯМОКИШКОВИХ НОРИЦЬ | 21 |
| Ліоска С. | |
| ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ КОАГУЛЯЦІЙНОГО ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА COVID-19 З УРАХУВАННЯМ ВАЖКОСТІ УРАЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ..... | 21 |
| Ісайченкова А. В. | |
| ІНТЕРВАЛЬНА ЦИТОРЕДУКЦІЯ ПРИ РАКУ ЯЄЧНИКІВ ІІІС/ІV СТАДІЇ ПІСЛЯ 3 ТА 6 КУРСІВ НЕОАД'ЮВАНТНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ..... | 22 |
| Кабаков А. О., Нізяєва В. В. | |
| ВЕРИФІКАЦІЯ КРИТЕРІЇВ СПЕЦИФІКАЦІЇ ПЕРЕБІГУ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ ЗА ДАНИМИ ДОБОВОГО МОНІТОРУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ | 23 |
| Козьменко А.В., Буряк В.В. | |
| ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ РЕАКЦІЇ ВІД COVID-19 У ДІТЕЙ..... | 23 |
| Компанієць П. А., Денисенко А. М., Лямцева О. В. | |
| ВПЛИВ СУПУТНОЇ АНЕМІЇ НА ГЕОМЕТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ | 24 |
| Коновалова М. О. | |
| КЛІНІКО-НЕЙРОВІЗУАЛІЗАЦІЙНА ВЕРИФІКАЦІЯ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУ У ПАЦІЄНТІВ З ГЕМОРАГІЧНИМ ПІВКУЛЬОВИМ ІНСУЛЬТОМ НА ТЛІ КОНСЕРВАТИВНОЇ ТЕРАПІЇ ЯК СКЛАДОВА ПІДГРУНТЯ ДЛЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ | 24 |
| Кузнєцов А. А. | |

При гострому пієлонефриті його рівень становив 16,2 (7,6; 22,4) ng/ml, при хронічному пієлонефриті – 6,8 (3,03; 12,6) ng/ml, при циститі – 9,9 (5,3; 16,4) ng/ml, при не уточненій ІСШ 20,95 (5,5; 23,4) ng/ml, тоді як у контрольній групі гепсидин становив 17,3 (7,4; 23,3) ng/ml. Додатково відмічено, що тяжкість перебігу ІСШ зворотно корелювала з рівнем гепсидину плазми крові ($r=-0,41$; $p<0,05$). Ми звернули увагу і на те, що найнижчий рівень гепсидину спостерігався у хворих другої групи, що, не виключено, відіграє певну роль у хронізації процесу. Однак, цей факт потребує подальшого вивчення.

Висновки. Таким чином, рівень сироваткового гепсидину у хворих на ІСШ залежить від клінічної форми інфекції, а його значення, вочевидь, можливо використовувати як маркер хронізації захворювання, але це потребує подальшої розробки.

ВИБІР МЕТОДУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПРЯМОКИШКОВИХ НОРИЦЬ

Глюска С.

Науковий керівник: Охріменко Г. І.

Кафедра госпітальної хірургії

Запорізький державний медичний університет

Мета дослідження. Вивчити найближчі та віддалені результати лікування хворих з прямокишковими норицями (ПН), яким виконували операції за методом Габрієля, Масляка, лігатурним методом, і сформулювати оптимальні показання для використання кожного виду хірургічного втручання.

Матеріали та методи. Проаналізовано результати лікування 50 хворих з ПН. У 6 (12,0%) пацієнтів з інтрасфінктерними і 26 (52,0%) з трансфінктерними норицями виконана операція Габрієля. 9 (18,0%) хворим з трансфінктерними і 5 (10,0%) з екстрасфінктерними норицями виконана операція Масляка. В 2 (4,0%) випадках при трансфінктерних і в 2 (4,0%) пацієнтів з екстрасфінктерними норицями використовували лігатурний метод.

Результати. Через 6 місяців після операції Габрієля недостатність анального жому мала місце у 2 (6,2%) хворих з трансфінктерними норицями. Рецидив нориці спостерігався в 1 (7,1%) пацієнта після операції Масляка. Добрі віддалені результати отримані в 100% хворих, оперованих з використанням лігатурного методу.

Висновки. Встановлено, що найкращі результати операції Габрієля можуть бути досягнуті при інтрасфінктерних норицях. При трансфінктерних норицях використання цієї операції слід обмежити. Операція Масляка і лігатурний метод достатньо ефективні при трансфінктерних та екстрасфінктерних норицях (92,9% і 100,0% добрих результатів відповідно).

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ КОАГУЛЯЦІЙНОГО ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ НА COVID-19 З УРАХУВАННЯМ ВАЖКОСТІ УРАЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ

Ісайченкова А. В.

Науковий керівник: д. мед. н., доц. Бідзіля П. П.

Кафедра внутрішніх хвороб 1 та симуляційної медицини

Запорізький державний медичний університет

Актуальність. На сьогодні відомо, що дисфункція клітин ендотелію на тлі COVID-19 є поширеним явищем та проявляється утворенням тромбіну з розвитком гіперкоагуляції, ступінь якої прямо корелює із важкістю коронавірусної хвороби, зокрема пневмонії.

Мета дослідження: оцінка показників коагуляційного гемостазу у хворих на COVID-19 з урахуванням важкості ураження легень пневмонією.

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз історій хвороб 172 пацієнтів, які проходили стаціонарне лікування в КНП "Міська лікарня №4» за 2020-2021 рр.

з підтвердженим COVID-19 методом ПЛР. У дослідження включено 92 жінки (53,5%) та 80 чоловіків (46,5%), віком 19-84 років (середній вік $61,8 \pm 13,9$ років). Відповідно важкості ураження досліджувані розподілялись на 4 групи. До першої групи увійшли 23 пацієнти без рентгенологічних ознак пневмонії, другу групу становили 45 хворих із однією вогнищевою або сегментарною пневмонією, в третю групу залучено 27 досліджуваних із двома вогнищевими пневмоніями, четверта група складалась із 76 пацієнтів із двома полісегментарними пневмоніями. Критерієм включення було підтвердження COVID-19 методом ПЛР. Пацієнтам оцінювали показники коагуляційного гемостазу. Статистична обробка проводилась за допомогою пакету статистичних програм "Statistica 6.0". Дані наводились у вигляді середнього арифметичного та стандартного відхилення ($M \pm SD$), розбіжність вважалась статистично вірогідною при $p < 0,05$.

Отримані результати. Вірогідна відмінність показників коагуляційного гемостазу встановлена лише за рівнем фібриногену, який був підвищеним у 102 хворих (59 %). Найбільший рівень фібриногену спостерігався в групі двоїх полісегментарної пневмонії ($5,02 \pm 1,60$ г/л) ($p < 0,05$), він переважав значення хворих без пневмонії ($4,12 \pm 1,05$ г/л) ($p < 0,05$), з однією вогнищевим чи сегментарним ($4,21 \pm 1,34$ г/л) ($p < 0,05$) та двоїх вогнищевим ураженням ($4,26 \pm 1,16$ г/л) ($p < 0,05$).

Висновки. У 59% хворих на COVID-19 має місце порушення показників коагуляційного гемостазу у вигляді підвищення рівня фібриногену, що прогресує із важкістю пневмонії та найбільш виразне при двоїх полісегментарному ураженні.

ІНТЕРВАЛЬНА ЦИТОРЕДУКЦІЯ ПРИ РАКУ ЯЄЧНИКІВ ІІІ/ІV СТАДІЇ ПІСЛЯ 3 ТА 6 КУРСІВ НЕОАД'ЮВАНТНОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ

Кабаков А. О., Нізяєва В. В.

Науковий керівник: д. мед. н., проф. Колеснік О. П.

Кафедра онкології та онкохірургії

Запорізький державний медичний університет

Мета. Метою цієї роботи було проаналізувати сучасні рекомендації та літературу стосовно вибору оптимальної кількості циклів НПХТ хворих на РЯ ІІІ-ІV стадії.

Матеріали та методи. Були досліджені сучасні рекомендації, такі як NCCN (Національна Всеосяжна Мережа Раку), ESMO (Європейське Співтовариство Медичної Онкології) 2022 року. Проведено систематичний огляд та порівняльний аналіз літератури на просторі PubMed у періоді з 2001 по 2022 рік.

Результати дослідження. За даними аналізу світової літератури та рекомендацій NCCN та ESMO на сьогодні немає встановлених критеріїв, які б допомогли визначити кількість циклів хіміотерапії перед операцією з видалення пухлини у пацієток з поширеним раком яєчників. Проте лише кілька досліджень продемонстрували, що збільшення кількості циклів перед інтервальною циторедуктивною операцією має перевагу в оптимальній кількості резекції, а також не впливає негативно на результати виживаності. В дослідженні Ansquer et al. у пацієнтів, які перенесли операцію після 6 циклів, частіше не виявляли макроскопічного залишкового захворювання, ніж у пацієнтів, яким було проведено операцію після 3–4 циклів (61,0 проти 45,0% відповідно). Але, як і раніше, недостатньо клінічних даних щодо валідності 6 циклів неоад'ювантної хіміотерапії при лікуванні поширеного епітеліального раку яєчників.

Висновки. Таким чином, наразі немає встановлених критеріїв, які б допомогли визначити оптимальну кількість циклів хіміотерапії перед операцією у пацієнтів з поширеною злоякісною пухлиною яєчників. Потрібні подальші проспективні випробування, щоб підтвердити, що збільшення кількості циклів хіміотерапії призводить до покращення результатів інтервальної циторедукції.