

Міністерство освіти і науки України
Національна наукова медична бібліотека МОЗ України
Академія наук вищої школи України,
Відділення фундаментальних проблем медицини
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
Кафедра реабілітації і нетрадиційної медицини
ПВНЗ «Київський медичний університет»,
Кафедра фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини
ТОВ «Науково-дослідний інститут інформаційної медицини»
ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»

СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ «СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАРОДНОЇ І НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ» У ПЕРВИННУ ЛАНКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Науковий симпозіум з міжнародною участю

22 листопада 2019 року

**За редакцією д. мед. н., проф. Т.П. Гарник,
д.мед.н., проф. Л.В. Андріюка,
д. мед. н., проф. В.А. Туманова**

Київ-2019

Затверджено рішенням Вченої Ради
ПВНЗ «Київський медичний університет»
(протокол № 2 від 29.10.2019 р.)

коти чорної (*Hyoscyamus niger*) зі спазмолітичною, антидепресивною та седативною дією; алкалоїди стрихнін та бруцин з **бобів ігнації (*Ignatia amara*)**, які усувають перепади настрою, знімають головний біль, страх і дратівливість. Така комбінація дозволяє посилити дію препарату на різні ланки патогенезу завдяки синергізму його складових.

В дослідженні брали участь 20 жінок віком 55-60 років, хворих на стабільну стенокардію напруги (СН) II функціонального класу (ФК). Найбільш частими скаргами хворих були: болі в області серця, що виникають при фізичних та емоційних навантаженнях, перебої в роботі серця, головні болі, запаморочення, шум у вухах, дратівливість, порушення сну. Дослідження стану здоров'я хворих до та після медичної реабілітації проводилася з визначенням: САТ, ДАТ, середній АТ і ЧСС, динаміка індексів Робінсона і Кердо; оцінювання якості життя за Сіетлівським опитувальником щодо стенокардії (SAQ). Після проведення медичної реабілітації практично у всіх хворих зменшилась кількість та інтенсивність ангінозних нападів, зменшилися відчуття перебоїв в роботі серця і серцебиття, головний біль, запаморочення, зменшилися прояви емоційної лабільності. Відзначалися нормалізація артеріального тиску і ЧСС, підвищення толерантності до фізичного навантаження, економізація серцево-судинної діяльності, достовірно підвищилась якість життя.

В результаті було вирішене питання безпечного застосування медикаментозних засобів, вдалося відокремити прогностично загрозливі морфологічні зміни в серцево-судинній системі від функціональних вегетативних порушень. Даний напрямок є дуже перспективним в медичному та реабілітаційному аспекті для подальшого вивчення як у кардіології, так і для інших груп хворих.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІПОФІЛЬНИХ СПОЛУК ТРАВИ ЧЕБРЕЦЮ ЛИМОННО ЗАПАШНОГО

- Я. М. Стешенко, аспір. каф. фармакогноз., фармхімії і технол. ліків
- О. В. Мазулін, д. фарм. н., проф., зав. каф. фармакогноз., фармхімії і технол. ліків

- Запорізький державний медичний університет

Актуальною проблемою сучасної фармації є пошук перспективних лікарських рослин з вираженою протимікробною, протизапальною та антиоксидантною активністю. Перспективною рослиною є **чебрець лимонно запашний (*Thymus Citriodorus*, var. «Silver Queen»)**, гібрид

чебрецю блошиного (*Thymus pulegoides* L.) та чебрецю звичайного (*Thymus vulgaris* L.).

Метою роботи було: дослідження методом ГРХ-МС якісного складу та кількісного вмісту ліпофільних сполук у траві чебрецю лимонно запашного.

Матеріали і методи дослідження

Рослинну сировину заготовляли в південних регіонах України, на території яких вирощується рослина. Ідентифікацію сполук та встановлення їх кількісного вмісту проводили на приладі ГРХ «HP-6890 series з МС детектором 5973 N (Японія).

Результати дослідження та їх обговорення

Отримані результати свідчать про накопичення в траві рослини до 15 біологічно активних сполук ліпофільної природи. Вперше ідентифіковано 8 речовин.

Висновки

В результаті проведених досліджень у траві чебрецю лимонного з різних місць зростання флори України, методом ГРХ-МС встановлено присутність 15 біологічно активних сполук ліпофільної природи. Вперше ідентифіковано 8 речовин. Ліпофільні екстракти з трави чебрецю лимонно запашного перспективні для отримання високоефективних лікарських засобів протизапальної та антимікробної дії.

МЕТОД RANC В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ИНТЕРНИСТА

- С. В. Ходун, руков. центра
- Т. Н. Пленова, практик. врач

- *Киевский центр фунготерапии, аюрведы и биорегуляции*

В практике врачей разных специализаций зачастую возникают ситуации, когда необходимо оказывать помощь пациентам, имеющим несколько хронических заболеваний, патогенетически связанных между собой. Такое коморбидное состояние снижает качество жизни и предусматривает использование значительного количества лечебных средств и медикаментозных препаратов, что далеко не всегда приводит к желаемому результату, чревато частым возникновением побочных эффектов, а сам процесс лечения требует значительных материальных вложений. В подобных ситуациях актуальным и целесообразным является применение

Я. М. Стешенко, О. В. Мазулін

Дослідження ліпофільних сполук трави чебрецю лимонно запашного 78

С. В. Ходун, Т. Н. Пленова

Метод RANC в практиці врача-інтерніста 79

Т. В. Черная, Г. А. Гасай

Цвет и асимметрия мозга (в память о профессоре А. П. Чуприкове). 81

С. В. Абрамов, С. И. Соколовский

Современный взгляд на проблемные вопросы комплементарной/
альтернативной (народной и нетрадиционной медицины) при подготовке
будущих специалистов. Международное сотрудничество. 83

О. С. Шпичак

Актуальні питання і перспективи діяльності громадської організації
«Всеукраїнська асоціація апітерапевтів», як складової в системі охорони
здоров'я громадян 87

Н. В. Шолойко

Сучасні тенденції розвитку фарміндустрії та перспективні лікарські засоби
рослинного походження 91