

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА



ТЕРАПІЯ

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ТЯЖЕСТЬЮ ДЕРМАТОЗА И МОНИТОРИРОВАНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ.

Антипенко О.А.

Научный руководитель: доц. Макурина Г.И.

Запорожский государственный медицинский университет

Кафедра дерматовенерологии и косметологии

с курсом дерматовенерологии и эстетической медицины ФПО

Псориаз по-прежнему остается одним из самых распространенных, но не до конца изученных заболеваний в дерматологии.

Целью нашего исследования явилось сопоставление особенностей течения и оценки тяжести псориаза с результатами суточного мониторинга артериального давления.

Мы проводили суточное мониторирование артериального давления у 25 пациентов, с различными формами псориаза и имеющих нормальные цифры артериального давления. Степень тяжести псориаза оценивали с помощью индекса PASI. В ходе исследования использовали общеклинические и статистические методы.

Из 25 больных псориазом, имевших нормальные цифры артериального давления, категория dipper составила 40%, night-peaker и non-dipper - в сумме 60%. Группа dipper в большинстве представлена пациентами с вульгарным псориазом, в меньшей степени - артропатической, экссудативной формами псориаза. Среди night-peaker и non-dipper - половина больных представлена экссудативными, диффузной и артропатическими формами псориаза.

Из этого можно сделать вывод, что необходимо регулярное измерение артериального давления у пациентов с псориазом, а также назначения препаратов, нормализующих баланс вегетативной нервной системы.

TREATMENT OF KERATODERMA CLIMACTERICUM (HAXTHAUSEN'S DISEASE) USING SHEA BUTTER

Bankole Adeitan Idowu

Scientific Consultant: Dr Natalia Rezhichenko

Zaporozyhe State Medical University

Dermatology and Venerology department

The incidence of keratoderma climactericum is seen majorly in women of menopausal period. It is a picture of circumscribed hyperkeratosis mainly of palms and soles in women of menopausal period.

Objective: To research effectiveness of shea butter in the treatment of keratoderma climactericum

Materials and Method: The study was held in the department of dermatology and venerology of Zaporozhye state medical university. We collected 10 cases of keratoderma climactericum all consisting of menopausal female patients. The degree of keratoderma was assessed by hyperkeratosis, fissures, dryness and mild itching. The quality of life was measured by DLQI (Dermatology Life Quality Index).

Results. The study showed that shea butter had a quick and effective moisturizing effect. Also, DLQI decreased by 39.5 %.

Conclusion. The results suggest that the use of shea butter is an effective topical treatment for climacteric keratoderma as it decreases dryness and reduces fissures.