



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

**ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
«ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ НАУКИ – 2022»**

4 лютого 2022 року



ЗАПОРІЖЖЯ – 2022

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:

ректор ЗДМУ, Заслужений діяч науки і техніки України, проф. Колесник Ю.М.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:

проректор з наукової роботи, Заслужений діяч науки і техніки України, проф. Туманський В.О.;

голова Координаційної ради з наукової роботи студентів, проф. Бєленічев І.Ф.;

голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, проф. Павлов С.В.;

секретар Координаційної ради з наукової роботи студентів, ст. викл. Абросімов Ю.Ю.;

голова студентської ради ЗДМУ Федоров А.І.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

заступник голови студентської ради Будагов Р.І.; голова навчально-наукового сектору студентської ради Єложенко І.Л.

РАННІЙ РАК ШЛУНКА. ЕНДОСКОПІЧНА ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОГНОЗ 5 РІЧНОГО ВИЖИВАННЯ

Лисенко В.О.

Науковий керівник: ас. Кіосов О.М.

Кафедра факультетської хірургії

Запорізький державний медичний університет

Актуальність роботи. Рання діагностика та лікування раку стравоходу і шлунку – це одна з найбільш актуальних проблем сучасної хірургії та онкології. Своєчасна діагностика даного захворювання на ранній стадії, підвищує відсоток виживаності серед даної групи пацієнтів, дозволяючи виконати радикальне мініінвазивне ендоскопічне лікування.

Мета: дослідити метод ендоскопічної діагностики раннього раку шлунка та стравоходу з використанням сучасного ендоскопічного обладнання Olympus Evis Exera III, 190 HQ gastroscope з функцією збільшення Nearfocus та вузькоспектральною хромоендоскопією NBI.

Матеріали та методи. Були проаналізовані рекомендації з діагностики раку шлунка і стравоходу (видані JGES, 2020 р.); згідно рекомендацій обстежено 120 пацієнтів які входили в групу онкоскрінінгу віком від 55 років з диспепсією.

Результати. В групу обстеження включили 120 пацієнтів віком 50+-15 років, де чоловіків було 75 а жінок 45. Передраковими змінами слизової оболонки шлунка вважали атрофічні зміни які оцінювали за класифікацією Kimura-Takemoto, яка включає 3 типи атрофії. Різновиди: С-0 (атрофія відсутня). Закритий тип (тип С-1, 2, 3). Відкритий тип (Тип О-1, 2, 3, Ор).

Було виявлено:

Тип С-0 – 20 чоловіків, та 10 жінок; С-1 – 15 чоловіків, та 6 жінок; Тип С-2 – 10 чоловіків, та 5 жінок; Тип С-3 – 5 чоловіків, та 5 жінок; Тип О-1 – 9 чоловіків, та 6 жінок; Тип О-2 – 6 чоловіків, та 6 жінок; Тип О-3 – 10 чоловіків, та 7 жінок; Тип Ор виявлено не було.