

Летальність при панкреонекрозі після відеолапароскопічних та лапаротомних операцій

Капшитар О. В.

Запорізький державний медичний університет

Рівень летальності при хірургічному лікуванні панкреонекрозу не задовольняє хірургів. Лапаротомні операції асоціюються з високим показником летальності. Використання малоінвазивних відеолапароскопічних операцій дало змогу поліпшити результати.

Мета: визначити рівень летальності після відеолапароскопічних та лапаротомних операцій залежно від форми панкреонекрозу.

Матеріали та методи. Ретроспективно вивчено медичні карти 67 стаціонарних хворих на панкреонекроз (4,3 % від 1553 пролікованих хворих на гострий панкреатит), яким у 2017–2021 рр. виконано операції у хірургічному відділенні з Центром шлунково-кишкових кровотеч міської лікарні екстреної і швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя – бази кафедри загальної хірургії та післядипломної хірургічної освіти Запорізького державного медичного університету. Вік пацієнтів – від 32 до 83 років. Серед них переважали жінки (55 (82,1 %)).

Результати. Відеолапароскопічні операції при панкреонекрозі виконано у 41 (61,2 %) хворого з використанням ендовідеохірургічного комплексу фірми «Richard Wolf» (Німеччина). Аспірацією високотоксичного ексудату з дренажуванням черевної порожнини та малого таза обмежились у 23 (34,3 %) пацієнтів з асептичним панкреонекрозом і перитонітом. Після дренажування із 15 (65,2 %) хворих померли 4 (26,7 %), 8 (34,8 %) були прооперовані з приводу інфікованого панкреонекрозу, з них померли 4 (50,0 %). Конверсію виконано у 18 (26,9 %) пацієнтів з інфікованим панкреонекрозом та гнійним перитонітом, з них 5 (27,8 %) померли. Первинні лапаротомні операції проведено 26 (38,8 %) хворим з інфікованим панкреонекрозом та різними поєднаними гнійно-

септичними ускладненнями черевної порожнини та заочеревинного простору, з них померли 17 (65,4 %).

Висновки. Частота оперативних втручань при панкреонекрозі становила 4,3 %, летальність – 44,8 %. Найнижчою була летальність при відеолапароскопічних операціях – 26,7 %, а після лапаротоміх операціях вона зростала. Усі лапаротомні операції виконано при інфікованому панкреонекрозі та його ускладненнях.