



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

**КООРДИНАЦІЙНА РАДА З НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ,
ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
СТУДЕНТСЬКА РАДА**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**84 ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ З
МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

**«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ - 2024»**

23-24 травня 2024 року



ЗАПОРІЖЖЯ – 2024

Conclusions: Confirmation of the quality of education is the groups of foreign students with an English-language form of education who continued to study at the Zaporizhzhya State University of Medicine and Pharmacy, despite the war.

ПРОГЕСТАГЕНИ ПРИ ВАГІТНОСТІ ВИСОКОГО РИЗИКУ. СУЧАСНІ АСПЕКТИ

Копос Д.М.

Науковий керівник: д. мед. н., доцент Шаповал О.С

Кафедра акушерства та гінекології

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Актуальність теми: новітня історія України зіткнулася з жахіттям війни. За оцінками ООН, до 2050 року населення України може скоротитися майже на 20%. Згідно статистики, країна займає 227-е місце з 240 за показниками приросту чисельності населення. Відтак, вельми актуальним є проведення якісної преконцепційної підготовки та проведення заходів, спрямованих на забезпечення нормального перебігу фізіологічного вагітності.

До ефективних методів збереження вагітності у разі невиношування вагітності належать модифікація способу життя та терапія прогестагенами.

Мета: узагальнення актуальних і клінічних даних щодо ролі прогестеронової підтримки в жінок груп ризику невиношування та недоношування вагітності згідно стандартів доказової медицини.

Методи дослідження: проведено аналітичний огляд літературних джерел: дослідницьких статей, аналітичних записок, клінічних протоколів, монографічних досліджень, кокранівських системних оглядів із метааналізом, даних популяційних ретроспективних когортних досліджень.

Результати: застосування прогестагенів у пацієнток з загрозливим невиношуванням асоціюється з вищим рівнем живонародження на 28 % та прогресуванням вагітності. При звичному невиношуванні прогестагени також мають сприятливий ефект.

Висновки: узагальнено дані літератури та досвід авторів щодо використання прогестагенів для запобігання втрати вагітності. Гестагени впливають на імплантацію, баланс цитокінів, активність природних клітин-кілерів, вивільнення арахідонової кислоти та скорочувальну здатність міометрія. Таким чином, гестагени використовувалися на всіх стадіях вагітності, включаючи підтримку лютеїнової фази до вагітності, загрозливий викидень, повторний викидень і для запобігання передчасних пологів.

КЛІНІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕРАПІЇ МЕНСТРУАЛЬНОЇ МІГРЕНІ: СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД

Кіпря А.О.

Науковий керівник: доцент Павлюченко М.І.

Кафедра акушерства і гінекології

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

За різними даними, приблизно 60% жінок, які страждають на мігрень, стикаються з менструальною мігренню (ММ). Питання про те, чи є ММ окремою клінічною одиницею з більш тяжкими нападами мігрені та гіршим прогнозом порівняно з неменструальною мігренню (НММ), досі залишається дискусійним.

Вважається, що зниження рівня естрадіолу (естрадіолова відмова), провокує напад мігрені без аури у жінок з менструальною мігренню.

Мета дослідження: З'ясувати особливості клінічної картини ММ, проаналізувати ефективні методи фармакологічної терапії та профілактики

Матеріали та методи: Було здійснено огляд наукової літератури за останні 5 років за допомогою порталу «PubMed».