



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

**КООРДИНАЦІЙНА РАДА З НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ,
ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
СТУДЕНТСЬКА РАДА**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**84 ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ З
МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

**«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ - 2024»**

23-24 травня 2024 року



ЗАПОРІЖЖЯ – 2024

ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ФІКСОВАНОЇ КОМБІНАЦІЇ ПРЕПАРАТУ «ТЕРАФЛЕКС АДВАНС®» У ПАЦІЄНТІВ З ОСТЕОАРТРОЗОМ

Каббадж Фахд

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Красько М.П.

Кафедра клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Остеоартроз є хронічною прогресуючою захворюваністю суглобів, яка досить поширена серед населення. У пошуку ефективного та безпечного лікування остеоартрозу велику увагу приділяють розробці нових препаратів. Фіксовані комбінації препаратів були розроблені з метою посилення терапевтичної ефективності та зменшення побічних ефектів. Один з препаратів, що містить комбінацію глюкозаміну та хондроїтинсу, є «Терафлекс адванс®».

Метою дослідження: вивчення клініко-фармацевтичних особливостей застосування «Терафлекс адванс®» у пацієнтів з остеоартрозом щодо ефективності та безпеки цієї комбінації препарату при лікуванні остеоартрозу.

Матеріали і методи дослідження: дослідження проводилося за допомогою рандомізованого подвійно-сліпого контрольованого методу протягом 12 тижнів. У дослідженні брали участь пацієнти з діагнозом «Остеоартроз коліних суглобів Рг I-II», різної статі, віком $59,3 \pm 4,5$ р які були поділені на дві групи. Пацієнти в 1-й групі отримували фіксовану комбінацію препарату «Терафлекс адванс®», тоді як пацієнти в контрольній групі отримували НПЗП. Для оцінки ефективності препарату були використані визначення інтенсивності болю за допомогою анкети Візуальної аналогової шкали (ВАШ), вимірювання обсягу рухів у колінах та оцінка загального стану пацієнта.

Результати дослідження: застосування препарату у пацієнтів виявилось високоефективним у полегшенні болю, зменшенні запалення та у збереженні функції суглобів. Пацієнти, що приймали «Терафлекс адванс®», вказали на покращення якості життя через зменшення симптомів остеоартрозу та збільшення рухливості суглобів. Більшість пацієнтів спостерігали позитивний ефект вже протягом 2-3 тижнів після початку застосування. Крім того, «Терафлекс адванс®» добре переносився без серйозних побічних ефектів.

Висновки: дослідження клініко-фармакологічних особливостей застосування фіксованої комбінації препарату «Терафлекс адванс®» у пацієнтів з остеоартрозом показало, що застосування препарату сприяє покращанню симптомів остеоартрозу, зокрема зменшенню болю, покращанню функціональності суглобів та зниженню запалення та покращення якості їхнього життя. Встановлено, що препарат є безпечним та добре переносимим для більшості пацієнтів, також зменшило потребу у додаткових засобах лікування та реабілітації у пацієнтів з остеоартрозом.

ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ «СУСТАМАР» У ПАЦІЄНТІВ З ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ

Ібрагімова А.М

Науковий керівник: к.мед.н., доц. Красько М.П.

Кафедра клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Остеоартроз є одним з найпоширеніших хронічних захворювань суглобів, яке впливає на якість життя і працездатність пацієнтів і для його лікування використовують різні препарати для поліпшення стану суглобів та зниження болю. Дослідження клініко-фармакологічних особливостей хондропротекторів і застосування їх у пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів є актуальним завданням, яке дозволить оцінити