



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**85 ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО КОНФЕРЕНЦІЇ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ З
МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

**«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ - 2025»**

15-16 травня 2025 року



ЗАПОРІЖЖЯ – 2025

ВИЗНАЧЕННЯ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ Н-РЕФЛЕКСУ ЯК ДІАГНОСТИЧНОГО КРИТЕРІЮ ПОПЕРЕВО-КРИЖОВОЇ РАДИКУЛОПАТІЇ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ З МРТ	53
<i>Рунчева К.А.</i>	
ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН І СТРАХ ПЕРЕД АНЕСТЕЗІЄЮ В УМОВАХ ВІЙНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЦИВІЛЬНИХ І ВІЙСЬКОВИХ ПАЦІЄНТІВ ПРИФРОНТОВОГО ХАРКОВА	54
<i>Таранська Г.О., Лісовіна Л.О.</i>	
КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ ФОРМ РОЗЛАДІВ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ	55
<i>Кальницька А.В.</i>	
ЧИ МОЖНА БУДЕ ВИЛІКУВАТИ ШИЗОФРЕНІЮ РЕДАГУВАННЯМ ГЕНІВ?	56
<i>Кес О.Ю., Лабіши А.Д.</i>	
THE COMPLEX RELATIONSHIP BETWEEN SUBSTANCE USE AND SCHIZOPHRENIA: A CASE - BASED PERSPECTIVE	56
<i>Rafał Bieś, Monika Kalicka</i>	
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ІЗ РІВНЕМ ПОСТТРАВМАТИЧНОЇ СИМПТОМАТИКИ У ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ	57
<i>Сивоконь О.</i>	
ЛІКУВАННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ: ПСИХОТЕРАПІЯ VS ФАРМАКОТЕРАПІЯ.....	58
<i>Дудчик О.О.</i>	
ВПЛИВ МАЛИХ ДОЗ АЛКОГОЛЮ НА ХАРАКТЕР МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ	58
<i>Лоза Є.К.</i>	
КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО СТАНУ БАТЬКІВ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ	59
<i>Рибалко О.О.</i>	
АКТУАЛЬНІСТЬ ПСИХОКОРЕКЦІЇ, МОДИФІКОВАНОЇ З УРАХУВАННЯМ ЗНИЖЕННЯ КРИТИЧНОСТІ У ОСІБ З ТРИВОЖНО-ФОБІЧНИМИ ТА СОМАТОФОРМНИМ РОЗЛАДАМИ	60
<i>Кондратенко М. Ю.</i>	
ПОШИРЕНІСТЬ ОЧНИХ СИМПТОМІВ ПРИ МАЛЬФОРМАЦІЇ КІАРІ PREVALENCE OF OCULAR SYMPTOMS IN CHIARI MALFORMATION.....	60
<i>Козар В. С.</i>	
ВПРОВАДЖЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОГРАМИ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я «ТИ ЯК?» У ЗДМФУ	61
<i>Ольховська А.</i>	
DEPRESSION. PHARMACOLOGICAL TREATMENT.....	62
<i>Cotruță Tatiana</i>	
АЛКОГОЛЬ ТА МОЛОДЬ: АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОСОЦІАЛЬНИХ ПРИЧИН І НАСЛІДКІВ ВЖИВАННЯ	62
<i>Мамедова А.Ю. Назаренко А.С.</i>	
ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД У ВІЙСЬКОВИХ ТА ЦИВІЛЬНИХ: НЕВРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ І ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ	63
<i>Дмитрук Т.О., Красвий І.А.</i>	
ABSTRACT ELECTROCONVULSIVE THERAPY IN SPECIAL POPULATIONS: FOCUS ON PREGNANT WOMEN AND TREATMENT-RESISTANT CASES.....	63
<i>Thomas, Merlin A.</i>	
ПСИХІЧНИЙ СТАН ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ СКРОНЕВОЇ ЕПІЛЕПСІЇ	64
<i>Кертис С.Я.</i>	
ПСИХОБІОТИКИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У ЛІКУВАННІ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ	64
<i>Долгош Е.С., Кертис С.Я.</i>	
THE IMPACT OF ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER ON THE OCCURRENCE OF RISKY SEXUAL BEHAVIOUR.....	65
<i>Angelika Dyszy, Jakub Galkowski, Gabriela Malecka</i>	
ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ПАЦІЄНТІВ З ТЯЖКИМИ ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ).....	66
<i>Перепечка Т.С.</i>	
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ, ФТИЗІАТРІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ	67
НЕВРОЛОГІЧНІ ТА СЕРЦЕВО-СУДИННІ УСКЛАДНЕННЯ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ COVID-19.....	67
<i>Зімбовський Я.В.</i>	
РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПОДОЛАННІ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ	67
<i>Тросцінський Я.Й., Горбенко О.В.</i>	
ANALYSIS OF MORTALITY IN PATIENTS WITH LEPTOSPIROSIS ACCORDING TO MATERIALS OF ZAPORIZHZHIA REGIONAL INFECTIOUS DISEASES HOSPITAL	68
<i>Mohammad Osman El-youssef</i>	

ЛІКУВАННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ: ПСИХОТЕРАПІЯ VS ФАРМАКОТЕРАПІЯ

Дудчик О.О.

Науковий керівник: Рациборинська-Полякова Н.В., доцент

Кафедра психіатрії, наркології та психотерапії

Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова

Мета дослідження: дослідити ефективність лікування посттравматичного стресового розладу психотерапевтичними та медикаментозними методами.

Матеріали та методи: Аналіз профільних статей за ключовими словами та критеріями включення, використовуючи джерела баз даних PubMed, Google Scholar та інших. Використання мета-аналізу для оцінки загального ефекту лікування.

Результати: За результатами системного аналізу літератури встановлено, що психотерапія виявляє більшу ефективність у лікуванні посттравматичного стресового розладу. Це зумовлене різноманітністю психотерапевтичних підходів, які використовують в терапії ПТСР. Це різноманіття ґрунтується не тільки на відмінностях методичних прийомів, але й задіяності різних систем організму пацієнта. До найбільш часто використовуваних методів належать десенсибілізація та пророблення травми рухами очей, тривала експозиція, когнітивна терапія, когнітивно-поведінкова терапія, травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія тощо. Серед медикаментозних підходів найбільшу доказовість у призначенні мають антидепресанти, проте вони мають цілу низку побічних ефектів, а також їх варто застосовувати в комбінації з психотерапією для отримання бажаного ефекту.

Висновки: Отже, психотерапія є найбільш дієвим методом лікування посттравматичного стресового розладу, і використовується як терапія першої лінії. Проте у випадку тяжкого або ускладненого посттравматичного стресового розладу можна розглядати можливість комбінованої терапії.

ВПЛИВ МАЛИХ ДОЗ АЛКОГОЛЮ НА ХАРАКТЕР МІЖСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Лоза Є.К.

Науковий керівник: к.п.н. Дьома І.С.

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Актуальність. Психологічні, соціальні та культуральні чинники відіграють важливу роль у поширенні вживання алкоголю. Закріплення вживання алкоголю як звичної форми поведінки пов'язане з протитривожною дією та полегшенням соціальних контактів при легкій ступені алкогольного сп'яніння.

Мета дослідження. Узагальнити сучасні уявлення щодо впливу малих доз алкоголю на характер соціальних та міжособистісних взаємодій. Сформулювати перспективи подальших досліджень щодо цієї проблеми та їх практичну значущість для удосконалення психотерапії (когнітивно-поведінкової терапії) психічних розладів, які ускладнені надмірним вживанням алкоголю.

Матеріали та методи. Проведено вивчення сучасних публікацій англomовних видань навчальної та спеціальної літератури закордонних авторів за 2017-2024 роки (Google Scholar, PubMed, ResearchGate): Dolder P.C. et al Holze F., Liakoni E., Harder S., Schmid Y., Liechti M.E. (2017). "Alcohol acutely enhances decoding of positive emotions and emotional concern for positive stimuli and facilitates the viewing of people images". Bowdring M.A. et al Sayette M.A. (2021). "The effect of alcohol on mood among males drinking". Baltariu I.C. et al Enea V., de Jong P.J., Aan Het Rot M. (2024). "Associations between alcohol consumption and empathy in a non-clinical sample: drinking motives as a moderator".

Отримані результати. Більшість наявної наукової літератури присвячена темі коморбідності різних психічних розладів та вживання алкоголю. Також є багато робіт про епідеміологію вживання алкоголю, але тема впливу алкоголю на психосоціальне функціонування досліджена недостатньо. Найближчі до нашої теми дослідження стосувались підвищення суб'єктивної фізичної привабливості інших осіб – ефекту «пивних окулярів». І експеримент, в якому, за допомогою спеціальних окулярів, імітувався вплив алкоголю на зір.

Висновки. Зміна когнітивних та емоційних патернів у міжособистісних відносинах при імітації перцептивних ефектів алкоголю без його вживання, на нашу думку, може вказувати на те, що частину «компенсаторних» ефектів алкоголю обумовлено актуалізацією когнітивних схем, які у учасників дослідження сформувалися під впливом минулого досвіду вживання алкоголю. Дослідження подібних когнітивних схем та неусвідомлених переконань має практичне значення для удосконалення психотерапії пацієнтів, які мають високий ризик алкоголізації. Проте ця тема потребує подальших досліджень.

КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО СТАНУ БАТЬКІВ ДІТЕЙ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Рибалко О.О.

Науковий керівник: д-р психол.н., проф. Большакова А.М.

Кафедра психології

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Одним із вагомих чинників розвитку невротичних змін особистості є хронічне психоемоційне напруження, зумовлене тривалим доглядом за дитиною з порушенням розвитку. Розлади аутистичного спектру (РАС) створюють для батьків складну ситуацію постійного стресу, невизначеності та соціальної ізоляції, що сприяє формуванню стійких невротичних тенденцій. Вивчення статевої відмінності у рівні невротизації батьків дітей із РАС є актуальним завданням психологічних досліджень у контексті вивчення механізмів психологічної адаптації, ризиків розвитку психоемоційних розладів та побудови програм цільової психологічної допомоги.

Мета дослідження – виявлення статевої особливості показників невротизації батьків дітей із РАС.

Матеріали та методи: Опитувальник невротичних особистісних рис KON-2006 (адаптація О. Орлова). Досліджувані: 30 матерів та 27 батьків дітей із РАС віком 3–12 років.

Отримані результати. Аналіз клініко-психологічних особливостей невротичних особистісних рис виявив статистично значущі відмінності між матерями та батьками дітей із розладами аутистичного спектру. Загальний показник невротизації був вищим у матерів ($M = 21,4$), ніж у батьків ($M = 16,2$); $t = 3,21$, $p < 0,01$. При цьому, значення в обох групах перевищили нормативний діапазон – у батьків значення до зони «невизначеного рівня», що потребує дообстеження, тоді як у матерів показники свідчили про високий рівень невротизації. За окремими шкалами також виявлено достовірні розбіжності. Зокрема, матері мали вищі значення за шкалою астенії ($M = 10,2$) у порівнянні з батьками ($M = 7,6$); $t = 3,42$, $p < 0,01$. За шкалою почуття залежності від оточення жінки також демонстрували вищі результати ($M = 8,1$), ніж чоловіки ($M = 6,0$); $t = 3,01$, $p < 0,01$. За шкалою негативної самооцінки матері мали середнє значення 9,5, тоді як у батьків – 7,3; $t = 2,98$, $p < 0,01$. Значущі відмінності також зафіксовано за шкалами труднощів у прийнятті рішень, почуття безпомічності та почуття перенавантаженості, де жінки продемонстрували вищі значення (усі $p < 0,05$). Водночас батьки мали вищі показники за шкалою схильності до ризику ($M = 5,6$) порівняно з матерями ($M = 4,3$); $t = 2,74$, $p < 0,01$.

Висновки. Результати свідчать підвищений рівень невротизації як у матерів, так і у батьків дітей із РАС при більшій вразливості жінок, що підкреслює необхідність реалізації гендерно чутливого підходу до психологічного супроводу батьків дітей з психічними розладами.