

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології

О.В. Крайдашенко, М.П. Красько, Т.О. Самура, І.М. Білай

Клінічна фармація та фармацевтична опіка

**Збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного
іспиту Крок 2 Фармація магістрів галузі знань «22
Охорона здоров'я» спеціальності «226 Фармація,
промислова фармація»**

Запоріжжя
2024

УДК 615.2(075.8)
К 49

*Затверджено на засіданні Центральної методичної ради ЗДМФУ
та рекомендовано для використання в освітньому процесі
(Протокол №2 від 12.12.2024р.)*

Автори:

О. В. Крайдашенко, М. П. Красько, Т. О. Самура, І. М. Білай

Рецензенти:

С. Я. Доценко - д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб 3 ЗДМФУ.

С. Д. Тржецинський - д-р біол. наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії, фармакології і ботаніки ЗДМФУ.

Клінічна фармація та фармацевтична опіка :
К78 збірник тестових завдань для підготовки до ліцензійного іспиту Крок 2 Фармація магістрів галузі знань «22 Охорона здоров'я» спеціальності «226 Фармація, промислова фармація» / О. В. Крайдашенко, М. П. Красько, Т. О. Самура, І. М. Білай. – Запоріжжя : [ЗДМФУ], 2024. – 110 с.

До збірника включені тести, що складені за програмою з клінічної фармації та фармацевтичної опіки. Видання має на меті сприяти кращій підготовки для здачі ліцензійного іспиту Крок 2 Фармація для студентів 5 курсу фармацевтичних і міжнародного факультетів.

Інструкція: кожне з пронумерованих запитань або незавершених тверджень у цьому розділі супроводжується відповідями або завершенням твердження. Оберить одну відповідь (завершене твердження), яка є найкращою у даному випадку та замалюйте у бланку відповідей коло, яке містить відповідну літеру.

Посібник призначений для студентів, фармацевтів.

УДК 615.2(075.8)

© Крайдашенко О. В., Красько М.П., Самура Т.О., Білай І.М. 2024.

©Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, 2024

ПЕРЕДМОВА

Головним стратегічним напрямком у розвитку охорони здоров'я у всьому світі є орієнтація всіх галузей медицини на потреби пацієнтів. Цей принцип закріплений у документах Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та є основою Програми дій з основних лікарських препаратів, затвердженої Європейським регіональним бюро ВООЗ.

Згідно з цією стратегією, роль фармацевта в системі охорони здоров'я радикально змінюється. Основною метою його професійної діяльності є не лише розширення асортименту та підвищення якості лікарських засобів на ринку, але й підвищення ефективності та безпеки лікування конкретного пацієнта. Міжнародна фармацевтична федерація (МФФ) вимагає від усіх практикуючих фармацевтів забезпечення належної якості фармацевтичної допомоги кожному пацієнту.

Поняття "фармацевтична допомога" передбачає, насамперед, активну співпрацю фармацевта з лікарем для збереження здоров'я та запобігання захворюванням серед населення. Фармацевт має обов'язок не лише забезпечувати пацієнта якісними ліками та медичними виробами, але й сприяти їх раціональному використанню. Для цього фармацевт повинен надати пацієнту повну інформацію про ліки, їх форми та особливості застосування, враховуючи вплив препарату на фармакодинамічні ефекти в залежності від віку, статі, захворювань нирок, печінки та інших факторів, а також можливі взаємодії з іншими лікарськими засобами та харчуванням, а також можливі негативні наслідки для організму пацієнта.

Збірник тестових завдань допоможе в підготовці спеціалістів, які мають значний обсяг теоретичних знань та практичних умінь щодо проведення фармакотерапії та надання допомоги.

Тест№1

Мікроорганізм *Helicobacter Pylori* є головним етіологічним чинником:

- А .Хронічного гастриту типу А В. Неспецифічного виразкового коліту С.
Хронічного гастриту типу В D. Хронічного пієлонефриту Е. Бронхіальної астми

Тест№2

. Анафілактичний шок може розвинутися у попередньо сенсibilізованих осіб при :

- А. Повторному введенні малої дози лікарського засобу перорально В. Повторному введенні лікарського засобу будь-яким шляхом і будь-якій дозі С. Повторному введенні великої дози лікарського засобу перорально D. Повторному введенні малої дози лікарського засобу парентерально Е. Повторному введенні великої дози лікарського засобу парентерально Тест№3

.Набряк Квінке може загрожувати життю через

- А. Набряк серцевого м'яза В. Ниркову недостатність С. Печінкову недостатність D. Бронхоспазм Е. Набряк гортані

Тест№4

. Хворого протягом тривалого часу турбують болі в епігастральній ділянці, які виникають через 1,5-2 год. після їжі, а нерідко – й уночі; стан погіршується навесні та восени. Така клінічна картина характерна для:

- А. Виразкової хвороби шлунку
В. Хронічного гастриту
С. Виразкової хвороби дванадцятипалої кишки
D. Хронічного холециститу
Е. Хронічного панкреатиту Тест№5

Оптимальна тактика попередження пошкоджуючого впливу нестероїдних протизапальних засобів на слизову ШКТ при тривалому застосуванні полягає в:

- А. Одночасному застосуванні мізопростолу
В. Їх комбінації з антацидами
С. Їх комбінації з антисекреторними ЛЗ
D. Застосуванні переривчастих курсів лікування
Е. Періодичній зміні препаратів Тест№6

Хворому 30 років у районній поліклініці з приводу виразкової хвороби був призначений циметидин по 0,2 x 4 р/д. Через місяць звернувся зі скаргами на ниючі болі та припухлості в ділянках грудних залоз. Що Ви запропонуєте?

- А. Додати препарат із групи НПЗЗ В. Додати препарат із групи глюкокортикоїдів
С. Провести роз'яснювальну бесіду D. Не потрібно жодної корекції схеми лікування
Е. Відмінити циметидин і, при потребі, призначити інший ЛЗ Тест№7

З метою попередження розвитку кишкового дисбактеріозу внаслідок антибіотикотерапії доцільно призначити:

- А. Протигрибкові препарати одночасно з антибіотиком В. Живі культури “корисних” бактерій одночасно з антибіотиком С. Протигрибкові препарати одночасно з антибіотиком, опісля – живі культури “корисних” бактерій D. Живі культури “корисних” бактерій після антибіотикотерапії Е. Відповідну дієту

Тест№8 Невідкладна терапія анафілактичного шоку передбачає застосування таких груп ЛЗ:А. Антигістамінні, адреноблокаториВ. Антигістамінні, негормональні імунодепресанти С. Стабілізатори мембран тучних клітин, глюкокортикоїди D.

Гангліоблокатори, антигістамінні Е. Антигістамінні, глюкокортикоїди, адреналін

Тест№9 Пеніциліноутворюючі стафілококи не пригнічують антибактеріальну активність перелічених антибіотиків, крім:А. Амоксициліну В. Гентаміцину С. Лінкоміцину D.

Ріфампіцину Е. Рокситроміцину

Тест№10 Антибіотикотерапія не показана при таких вірусних інфекціях, крім:

- А. Цитомегаловірусної інфекції В. Орнітозу

С Герпесу I типу D. Вірусного гепатиту E. Інфекційного мононуклеозу Тест №11
Необхідність застосування комбінованої антибактеріальної терапії виникає в усіх випадках, крім:

А. Рецидивуючого тяжкого перебігу інфекційного захворювання B. Гострої стрептококової інфекції C. Наявності поєднаної патологічної мікрофлори D.
Відсутності позитивного лікувального ефекту від адекватної монотерапії E.

Наявності декількох запальних процесів із різною локалізацією Тест №12

Хвора 62 років, страждає на гіпертонічну хворобу II ст. (нефротичну форму), хронічний бронхіт та виразкову хворобу 12-палої кишки. Об'єктивно: тони серця ритмічні, над аортою акцент II тону, пульс 102 уд/хв, АТ 190/110 мм рт.ст. В легенях вислуховуються сухі хрипи, язик сухий, обкладений білим налетом. Живіт м'який, болючий в епігастральній ділянці. Які гіпотонічні препарати слід призначити в даному випадку? А. Бета-адреноблокатори B.

Альфа-адреноблокатори C. Блокатори кальцієвих каналів D. Центральні симпатолітики E. Інгібітори АПФ

Тест №13 У хворого 32 років діагностовано двобічну інтерстиціальну пневмонію, яка викликана легеневою мікоплазмою. Які антибактеріальні засоби слід включити у схему лікування? А. Пеніциліни B. Цефалоспорини C. Аміноглікозиди D. Сульфаніламід E. Тетрацикліни

Тест №14 Хвора 52 років, страждає на ІХС, стабільну стенокардію, що розвинулася на фоні цукрового діабету II типу середньої важкості. Що рекомендовано призначити з метою переривання приступів стенокардії, якщо від нітрогліцерину виникає нестерпний біль голови А. Ізосорбід 5-мононітрат B. Корватон (молсидомін) C. Анаприлін D. Аспірин E. Ніфедипін

Тест №15

. У хворої 57 років, що хворіє на гіпертонічну хворобу II ст, діагностовано ІХС, стабільну стенокардію спокою. Які гіпотензивні засоби не бажано призначати в цьому випадку

А. Резерпін B. Ізосорбиду динітрат C. Верапамілу гідрохлорид D. Верошпірон E. Атенолол

Тест №16 Які Ви знаєте основні фармакологічні ефекти серцевих глікозидів?

А. Позитивна інотропна дія B. Від'ємна дромотропна дія C. Від'ємна хронотропна дія D. Позитивна батмотропна дія E. Все перелічене Тест №17 У чому полягає механізм дії серцевих глікозидів?

А. Активація гуанілатциклази
B. Стабілізація мембранного потенціалу
C. Підвищення тону артерійол
D. Пригнічують натрієво-калієву помпу міокардіоцитів, що призводить до пригнічення виведення іонів кальцію, збільшення якого активує актин-тропонін-тропомиозиновий комплекс, і як наслідок стимулює взаємодію ниток актину і міозину
E. Стимуляція альфа-адренорецепторів

Тест №18 . Які з наведених засобів можуть ослаблювати терапевтичну дію препаратів заліза?

А. Алкоголь B. Левоміцетин C. Аскорбінова кислота D. Глюкоза E. Метіонін Тест №19

. Які з наведених анемії викликані зниженою продукцією еритроцитів?

А. Постгеморагічна анемія B. Спадкові гемолітичні анемії C. Набуті гемолітичні анемії D. Мікроангіопатична гемолітична анемія E. Залізодефіцитна анемія Тест №20. Якими чинниками зумовлені мегалобластні анемії?

А. Недостатністю фолієвої кислоти і вітаміну B12 B. Інфільтрацією кісткового мозку (мієлофітозом) C. Хронічною нирковою недостатністю D. Алкоголізмом E. Гіпотиреозом

Тест№21 При яких захворюваннях протипоказані блокатори гістамінових H1- рецепторів із холінолітичним ефектом? А. Муковісцидозі В. Пієлонефриті С. Пневмонії D.

Аденомі передміхурової залози, глаукомі Е. Цукровому діабеті

Тест№22 Які препарати слід застосовувати для попередження рідких приступів бронхоспазму будь-якого генезу:

А. Антигістамінні препарати В. Глюкокортикоїди С. Стабілізатори мембран тучних клітин D. Гангліоблокатори Е. Інгаляції бета -адреностимуляторів короткої дії

Тест№23. У хворої Д., 24 роки на фоні ангіни розвинувся гострий отит. Який з наведених препаратів протипоказаний?

А. Гентаміцин В. Еритроміцин С. Ампіцилін D. Цефалексин Е.

Левоміцетин Тест№24. У хворого Н., 52 роки, розвинувся набряковий синдром на фоні гострої ниркостатності. Який з наведених діуретиків слід застосувати в даному випадку? А. Гіпотіазид В. Фуросемід С. Новурит D. Тріамтерен Е.

Спіронолактон

Тест№25. Хвора Н., 18 років, хворіє на цукровий діабет протягом 7 років. Яка цукрознижувальна терапія показана цій хворій? А. Манініл (глібенкламід) В

Інсулінотерапія С. Сіофор (метформін) D. Глюренорм (гліквідон) Е. Діабетон (гліклазид) Тест№26 Хвора К., 17 років, хворіє на ендемічний зоб, функція щитовидної залози не порушена. Яка терапія показана в даному випадку? А. Тиреоїдин В L-

тироксин С Антиструмін D. Тиреокомб Е. Мерказоліл

Тест№27. У хворої Г., 54 років на фоні ревматоїдного артрити розвинулась виразка 12-палої кишки. Який нестероїдний протизапальний препарат рекомендовано призначити для лікування основного захворювання? А. Диклофенак натрію В. Аспірин С. Сургам D.

Індометацин Е. Німесулід

Тест№28. Хворий Р., 65 років, хворіє на інсулінонезалежний цукровий діабет, звернувся з приводу подагри. Який з наведених препаратів протипоказаний даному хворому? А.

Аспірин В. Напроксен С. Ібупрофен D. Полькортолон Е. Бутадіон

Тест№29

. Назвіть основну причину розвитку ендемічного зоба?

А. Йодна недостатність В. Інфекція С. Радіаційне опромінення D. Стресовий фактор Е. Спадковість Тест№30 Яке з перерахованих захворювань не відноситься до колагенозів? А. Ревматоїдний поліартрит В. Бронхіальна астма С.

Системний червоний вовчак D. Системна склеродермія Е. Дерматоміозит

Тест№31 При прийомі відхаркувальних препаратів слід написати хворому.

А. збільшити споживання кухонної солі

В. збільшити споживання рослинної їжі

С. збільшити споживання білкової їжі

D. збільшити споживання рідини

Е. збільшити споживання вітамінів

Тест№32 Після застосування інгаляційних глюкокортикоїдів рекомендується ретельне полоскання горла з метою профілактики

А. загострення гастриту

В. В кандидозу ротової порожнини С

С. . рефлексного бронхоспазму

D. D. підвищення АТ

Е. Е. алергічної реакції

Тест№33 Серед препаратів із групи стабілізаторів клітинних мембран здатністю блокувати H-1 гістамінорецептори має

А. кетотифен

В. натрію кромоглікат

- C. інтал
- D. тайлед
- E. недокромил натрію

Тест №34 При передозуванні відхаркувальних препаратів рефлекторної дії можливе виникнення у хворого

- A. діареї
- B. нежиті
- C. шкірної висипки
- D. блювання
- E. осиплості голосу

Тест №35 Під час прийому аміноглікозидів та протягом 2 тижнів після їх останнього введення не можна призначати

- A. парацетамол
- B. нітрогліцерин
- C. папаверин
- D. препарати заліза
- E. індометацин

Тест №36

Назвіть препарат вибору для лікування атипової пневмонії.

- A. ампіцилін
- B. роваміцин
- C. цефоперазон
- D. гентаміцин
- E. оксацилін

Тест №37. При низькій біодоступності готують кращий шлях введення

- A. пероральний
- B. інгаляційний
- C. ін'єкційний
- D. ректальний
- E. трансдермальний

Тест № 38 Біотрансформація більшості лікарських препаратів, що відбуваються в

- A. нирках
- B. стінці кишечника
- C. легких
- D. стінці шлунка
- E. печінки

Тест №39 Самым частым осложнением при приеме нестероидных противовоспалительных средств является

- A. повреждение печени B. нарушение кроветворения C. повреждение слизистой ЖКТ D. повышение АД E. угнетение ЦНС

Тест №40. Інгаляційні препарати

глюкокортикоїдів для лікування бронхіальної астми повинні

- A. мінімально всмоктуватись у системний кровотік
- B. добре всмоктуватись у системний кровотік
- C. всмоктуватись у системний кровотік через 1 годину
- D. всмоктуватись у системний кровотік через 10 хв
- E. всмоктуватись у системний кровотік у будь-якій кількості

Тест №41 Риніт у маленьких дітей, що супроводжується односторонніми слизово-гнійними виділеннями з носа, дозволяє запідозрити

- A. вірусний риніт
- B. алергічний риніт
- C. синусит (запалення придаткових пазух носа)
- D. аденоїди (розростання носоглоткової мигдалики)
- E. стороннє тіло в носовому ході

Тест №42 При підвищенні температури у дитини 2-х років препаратом вибору є

- A. Новандол" (аспірин)
- B. "Метіндол" (індометацин)
- C. "Анальгін" (метамізол)
- D. "Панадол" (парацетамол)
- E. "Солпафлекс" (ібупрофен)

Тест №43 Діуретичний ефект "петлевих" діуретиків знижується при їх спільному призначенні з

- A. нітратами
- B. міотропними спазмолітиками
- C. інгібіторами АПФ
- D. нестероїдними протизапальними засобами
- E. серцевими глікозидами

Тест №44. У хворого на виразкову хворобу після місяця комплексного медикаментозного лікування розвинулися ознаки гінекомастії. Це може бути викликано прийомом

- A. маалокса
- B. циметидину
- C. омепразолу
- D. де-нолу
- E. гастроцепіну

Тест №45 З групи нестероїдних препаратів протизапальної дії при вагітності дозволено застосування

- A. аспірину
- B. індометацину
- C. анальгін
- D. парацетамолу
- E. ібупрофену

Тест №46. Ознаки гіпофосфатемії (слабкість, нездужання, порушення мислення, зниження апетиту) можуть викликати антацидні препарати, що містять

- A. магнію окис
- B. натрію гідрокарбонат
- C. кальцію карбонат
- D. вісмуту нітрат основний
- E. алюмінію гідроокис

Тест №47. Для симптоматичного лікування запорів у вагітних протипоказані

- A. рослинні проносні, що містять антраглікозиди (сеннаде, глаксена)
- B. ферментні препарати
- C. препарати, що містять лактулозу (дуфулак)
- D. препарати, що містять натрію пікосульфат (гутталакс)
- E. препарати, що містять насіння подорожника (мукофальк)

Тест №48 При сумісному застосуванні нестероїдних протизапальних засобів та алкоголю зростає ризик та ступінь виразності

- A. нефротоксичної дії

- В. бронхоспазму
- С. алергічної реакції
- Д. гіпоглікемії

Тест № 49 Синдром бронхоспазму найчастіше зустрічається

- А.при пневмонії
- В.при бронхіальній астмі
- С.при гострому бронхіті
- Д.при сухому плевриті
- Е.при бронхоектатичній хворобі

Тест №50 Циркуляторно-гіпоксичний синдром зустрічається

- А.при залізодефіцитній анемії
- В.при мегалобластній анемії
- С.при гемолітичній анемії
- Д.при гіпопластичній анемії
- Е.при всіх видах анемії

Тест №51. Глосит, атрофічний гастрит, збочення смаку, ламкість волосся та нігтів характерні для

- А. мегалобластної анемії
- В. гемолітичної анемії
- С. залізодефіцитної анемії
- Д. гіпопластичної анемії
- Е. всіх видів анемії

Тест № 52 Нудота, блювання, гіркота в роті, порушення апетиту, характерні ознаки синдрому

- А. холестазу
- В. портальної гіпертензії
- С. диспепсії
- Д. порушення зовнішньої секреції підшлункової залози
- Е. цитолізу

Тест №53. Характерною ознакою нефротичного синдрому при захворюваннях є
Характерною ознакою нефротичного синдрому при захворюваннях нирок є

- А.розвиток набряків
- В.підвищення АТ
- С.гіпохромна анемія
- Д.дизурія (порушення сечовиділення)
- Е.виражені болі в попереку

Тест №54. Головний біль у потиличній ділянці, що супроводжується запамороченням, миготінням "мушок" перед очима дозволяє запідозрити, що причина болю

- А.вірусна інфекція
- В.запальний процес головного мозку
- С.підвищення АТ
- Д.мігрень
- Е.пухлина мозку

Тест № 55 Хворого, який страждає протягом 20 років на гіпертонічну хворобу при клінічному обстеженні виявлені задишка, серцебиття, ціаноз, хрипи в легенях. Ці симптоми свідчать

- А. про розвиток гіпертонічного кризу
- В. про розвиток інфаркту міокарда
- С. про розвиток супутньої пневмонії
- Д. про розвиток порушень ритму серця
- Е. про розвиток серцевої недостатності

Тест №56 Який лікарський засіб з нітратоподібним ефектом необхідно рекомендувати хворому на ІХС при розвитку толерантності до пролонгованих нітратів?

- А. Ніфедипін
- В. Верапаміл
- С. Метапролол
- Д. Сіднофарм
- Е. Празозин

Тест №57

Хворий страждає на ІХС та артеріальну гіпертензію. Яка з наведених нижче груп ліків є найбільш оптимальною в даній ситуації?

- А. Бета-адреноблокатори
- В. Альфа-адреноблокатори
- С. Нітрати
- Д. Діуретики
- Е. Міотропні спазмолітики

Тест № 58 Згідно з даними хронофармакології можна досягти підвищення гіпохолестеринемічного ефекту статинів призначенням їх у наступний час доби:

- А. Світанок
- В. Ранок
- С. Обід
- Д. Вечір
- Е. Ніч

Тест № 59. Які з наведених нижче груп лікарських засобів викликають «синдром обкрадання»:

- А. Міотропні спазмолітики
- В. Нітрати
- С. Антикоагулянти
- Д. Бета-адреноблокатори
- Е. Діуретики

Тест №60 При яких станах протипоказані дигідропіридинові антагоністи кальцію?

- А. Артеріальна гіпертензія
- В. Брадикардія
- С. Тахікардія
- Д. Бронхоспазм
- Е. Гіперглікемія

Тест № 61 Який із перелічених антигіпертензивних препаратів не слід рекомендувати для лікування хворого на артеріальну гіпертензію, який страждає на подагричний артрит.

- А. Пропранолол
- В. Тріампур
- С. Верапаміл
- Д. Амлодипін

Е. Діхлотіазид

Тест № 62 При лікуванні еналаприлом можливі наступні побічні ефекти:

- А. Слинотеча
- В. Кашель
- С. Гіпокаліємія
- Д. Запори
- Е. Набряки гомілок

Тест №63 Враховуючи провідну роль у патогенезі есенціальної гіпертензії підвищення активності системи ренін-ангіотензин, найбільш адекватним комбінованим препаратом є:

- А. Адельфан
- В. Адельфан-езідрекс
- С. Крістепін
- Д. Трирезід К
- Е. Ко-ренітек

Тест №64. При артеріальній гіпертензії прийом лозартану протипоказаний при наступних станах:

- А. Вагітність
- В. Гіперглікемія
- С. Сечокислий діатез
- Д. Гіперліпідемія
- Е. Гіпокаліємія

Тест № 65. З наведених нижче оберіть препарат, що володіє найбільш вираженим антисекреторним ефектом:

- А. Гастроцепін
- В. Маалокс
- С. Омепразол
- Д. Сукральфат
- Е. Фамотідін

Тест №66

При лікуванні виразкової хвороби препарати, що знижують кислотність шлункового соку, доцільно призначати:

- А. За 15-30 хвилин до їди
- В. Під час їди
- С. Одразу після їди
- Д. Через 1 годину після їди
- Е. Незалежно від їди кожні три години

Тест №67. При тривалому застосуванні не розвивається звикання до наступних проносних:

- А. Лактулоза
- В. Фенолфталеїн
- С. Гутталакс
- Д. Сенаде
- Е. Крушина

Тест №68. Які із зазначених груп антибіотиків є гепатотоксичними:

- А. Пеніциліни
- В. Цефалоспорини
- С. Хінолони
- Д. Тетрацикліни
- Е. Макроліди

Тест №69. При лікуванні ревматизму у вагітних препаратом вибору є:

- A. Індометацин
- B. Аспірин
- C. Вольтарен
- D. Напроксен
- E. Ібупрофен

Тест № 70 Критеріями ефективності медикаментозного лікування дифузного токсичного зоба є всі, крім:

- A. Зменшення тремору рук
- B. Зменшення пітливості
- C. Зменшення брадикардії
- D. Поліпшення самопочуття хворого
- E. Зниження вмісту Т-3 та Т-4

Тест № 71 Який з антибактеріальних препаратів може викликати гемолітичну анемію:

- A. Налідіксова кислота (невіграмон)
- B. Норфлуксацин
- C. Азитроміцин
- D. Бісептол
- E. Канаміцин2

Тест №72.

Який із перерахованих препаратів здатний викликати апластичну анемію:

- A. Розчин хлориду кальцію
- B. Левоміцетин
- C. Фізіологічний розчин
- D. Гіпертонічний розчин глюкози
- E. Преднізолон

Тест №73.

Які препарати можна рекомендувати для лікування гіперхромних анемій:

- A. Піридоксину гідрохлорид
- B. Метилурацил
- C. Аскорбінову кислоту
- D. Ціанокобаламін
- E. Тіаміну бромід

Тест № 74 Найбільш частим ускладненням при внутрішньом'язовому застосуванні препаратів заліза є:

- A. Інфільтрати
- B. Гіперглікемія
- C. Тахікардія
- D. Брадикардія
- E. Алергічні реакції

Тест №75. Які з перерахованих нижче груп препаратів можуть викликати гіперфункцію щитовидної залози:

- A. Седативні препарати, що містять броміди
- B. Тіазидні діуретики
- C. Відхаркувальні препарати, що містять йодиди
- D. Антацидні препарати, що містять алюміній
- E. Антиагреганти

Тест №76

Яке твердження щодо застосування інгаляційних глюкокортикоїдів (бекломет) у хворих на бронхіальну астму невірне?

- A. Має незначний системний ефект
- B. Збільшення добової дози до 1500-2000 мкг підвищує ефективність лікування.
- C. Можуть бути використані для усунення нападу ядухи
- D. Перед застосуванням доцільна інгаляція симпатоміметиків
- E. На фоні лікування можливо розвиток кандидоза ротоглотки

Тест №77. Яка з ознак діабетичного кетоацидозу вказана помилково?

- A. Велике шумне дихання
- B. Артеріальна гіпотонія
- C. Сухість шкіри
- D. Нудота, блювота
- E. Олігурія

Тест № 78 72-річному хворому на ІХС, поширеним атеросклерозом, стенокардією, гіпертонічною хворобою 2 стадії призначили амбулаторне лікування. Загалом стан хворого покращився, але з'явилися болі в литкових м'язах при ходьбі. Які ліки могли сприяти цьому?

- A. Пропранолол
- B. Нітрогліцерин сублінгвально
- C. Каптоприл
- D. Тазепам
- E. Нітромазь

Тест № 79 Яка з перерахованих ознак не відноситься до ревматоїдного поліартриту? А.

- А. наявність симетричного артрити
- B. Ранкова скованість (не менше 1 години)
- C. наявність підшкірних вузликів
- D. Поразка крижово-клубового зчленування
- E. Околосуглобовий остеопороз

Тест № 80 Яке з суджень, що характеризують облітеруючий тромбангіїт, невірне? А.

- А. захворюванню сприяє тривале та інтенсивне куріння
- B. При ангіографії – поразка симетрична, сегментарна
- C. Уражаються переважно чоловіки молодші 45 років
- D. Характерна поразка вен
- E. Уражаються, головним чином, артерії великого калібру

Тест №81. Яка найбільш раціональна схема прийому альмагелю при загостренні виразкової хвороби 12-палої кишки?

- A. Безпосередньо перед кожним прийомом їжі та перед сном
- B. Безпосередньо після кожного прийому їжі та перед сном
- C. Під час їжі і перед сном
- D. Протягом дня при болях та перед сном
- E. Через 1 і 3 години після кожного прийому їжі та перед сном

Тест № 82 Яке з суджень щодо лікування гострого інфаркту міокарда неправильне?

- A. Призначення бета-адреноблокатора покращує прогноз
- B. При розвитку лівошлуночкової недостатності показано введення серцевих глікозидів
- C. Профілактичне призначення антиагрегантів зменшує ризик тромбоемболічних ускладнень
- D. У таких хворих показаний тромболізис

Е. Введення лідокаїну при шлуночкових екстрасистолах зменшує ризик мерехтіння шлуночків

Тест № 83. Яке судження неправильне?

- А. Може викликати синусову тахікардію
- В. Може викликати нудоту, блювоту
- С. Може викликати внутрішньосерцеву блокаду
- Д. Може провокувати стенокардію
- Е. Може брати участь стенокардію

Тест №84. Хвора на аутоімунний гепатит, ШОЕ 60 мм/год.

- А. Гептрал
- В. Альфа-інтерферон
- С. Урсодезоксихолева кислота
- Д. Преднізолон
- Е. Нічого з перерахованого

Тест № 85 Хворий на вірусний гепатит, в крові HbsAg (Поверхневий антиген вірусу гепатиту В). Яка з наявних ЛЗ підходить для лікування в даній ситуації?

- А. Альфа-інтерферон
- В. Гептрал
- С. Преднізолон
- Д. Урсодезоксихолева кислота
- Е. Нічого з перерахованого

Тест №86 У 25-річної жінки: лихоманка, артралгії, шум тертя перикарду, протеїнурія; ШОЕ 55 мм/год. Який ймовірний діагноз обґрунтований наведеними даними?

- А. Ревматоїдний артрит
- В. Системний червоний вовчак
- С. Системна склеродермія
- Д. Дерматоміозит
- Е. Хронічний активний гепатит

Тест № 87 У 50-річної жінки: біль у суглобах кистей рук, значна скутість вранці; ШОЕ 24 мм/год. Який ймовірний діагноз обґрунтований наведеними даними?

- А. Системний червоний вовчак
- В. Системна склеродермія
- С. Дерматоміозит
- Д. Ревматоїдний артрит
- Е. Хронічний активний гепатит

Тест №88 У 30-річної жінки: симетричний поліартрит, синдром Рейно, утруднення при ковтанні твердої їжі; ШОЕ 15 мм/год. Який ймовірний діагноз обґрунтований наведеними даними?

- А. Системний червоний вовчак
- В. Ревматоїдний артрит
- С. Дерматоміозит
- Д. Хронічний активний гепатит
- Е. Системна склеродермія

Тест № 89 Призначення якого препарату небажано через можливість прогресування емфіземи та дихальної недостатності у хворого з загостренням ХОБ, емфіземою легень, дихальною недостатністю?

- А. Антибіотики цефалоспоринового ряду
- В. Ацетилцистеїн усередину
- С. Інгаляції трипсину
- Д. Бромгексин
- Е. Інгаляції атровента

Тест №90 Який лікарський засіб не має ульцерогенної дії?

- А. Індометацин
- В. Резерпін
- С. Преднізолон
- Д. Ацетилсаліцилова кислота
- Е. Пропранолол

Тест № 91 У хворого на ІХС через 6 місяців лікування розвинулася толерантність до нітратів пролонгованої дії. Яке ЛЗ із нітратоподібним ефектом необхідно рекомендувати у цьому випадку?

- А. Сіднофарм
- В. Ніфедипін
- С. Празозін
- Д. Верапаміл
- Е. Метопролол

Тест № 92 Хворий страждає на ІХС та артеріальну гіпертензію. Яка з наведених нижче груп ЛЗ є найбільш оптимальною в даній ситуації?

- А. Альфа-адреноблокатори
- В. Нітрати
- С. Бета-адреноблокатори
- Д. Діуретики
- Е. Міотропні спазмолітики

Тест № 93 Хворому під час нападу стенокардії, який не купувався сублінгвальним прийомом нітрогліцерину, зробили внутрішньовенну ін'єкцію препарату, після чого у пацієнта розвинулася гіпотензія та брадикардія. Який із перерахованих коштів може викликати зазначені небажані ефекти?

- А. Дроперидол з фентанілом
- В. Промедол
- С. Анальгін з димедролом
- Д. Нітрогліцерин
- Е. Верапаміл

Тест № 94 При артеріальній гіпертензії прийом ірбесартану протипоказаний при наступних станах:

- А. Гіперглікемія
- В. Сечокислий діатез
- С. Вагітність
- Д. Гіперліпідемія
- Е. Гіпокаліємія

Тест № 95н Згідно з даними хронофармакології, можна досягти підвищення гіпохолестеринемічного ефекту статинів призначенням їх у наступний час доби:

- А. Світанок
- В. Ранок
- С. Обід
- Д. Вечір
- Е. Ніч

Тест № 96 Хворому поставлено попередній діагноз: інфаркт міокарда. Характерною ознакою даного захворювання є підвищення у крові активності:

- А. Альфа-амілази
- В. Аргінази
- С. Каталази
- Д. Креатинфосфокінази
- Е. Глюкози

Тест № 97 Чоловік 60 років страждає на атеросклероз судин. Яка з наведених нижче сполук відіграє провідну роль у патогенезі цього захворювання?

- А.Хіломікрони
- В. Тканинний фермент ліпопротеїнкіназу
- С.ЛПЗП
- Д.ЛПНЩ
- Е.Комплекс жирних кислот з альбумінами

Тест № 98 Жінка 48 років вступила до кардіологічного відділення з діагнозом ІХС: стенокардія. Напади виникають 1-2 рази на день. Який препарат найдоцільніше рекомендувати для лікування?

- А Кардикет
- В. Еуфілін
- С. Но-шпа
- Д. Папаверін
- Е. Діпіридамол

Тест № 99 Які з наведених нижче груп ЛЗ викликають “синдром обкрадання”:

- А.Нітрати
- В.Антикоагулянти
- С.Міотропні спазмолітики
- Д.Бета-адреноблокатори
- Е.Діуретики

Тест № 100 При яких станах протипоказаний ніфедипін? А. Артеріальна гіпертензія

- В.Брадикардія
- С.Бронхіальна астма
- Д.Гіперглікемія
- Е.Тахікардія

Тест № 101 Хворому на ІХС, хронічним обструктивним бронхітом і цукровим діабетом показані наступні ЛЗ, крім:

- А. Нітросорбід
- В. Окспренолол
- С. Бромгексин
- Д. Корінфар
- Е. Тиклід

Тест № 102н Найбільш ефективно знижують рівень тригліцеридів у плазмі наступні ЛЗ:

- А.Пробукол
- В. Ліпостабіл
- С. Ендурацин
- Д. Фенофібрат
- Е. Гуарем

Тест № 103 Які з наведених нижче ЛЗ застосовуються при інфаркті міокарда для проведення тромболітичної терапії:

- A. Урокіназа
- B. Гепарин
- C. Фенілін
- D. Тиклід

Тест №104 Атерогенні властивості мають такі речовини, крім:

- A. ЛПОНП
- B. ЛПНЩ
- C. ЛПЗП
- D. Тригліцериди
- E. Хіломікрони

Тест №105 Хворому, який переніс інфаркт міокарда, рекомендується прийом ацетилсаліцилової кислоти з метою:

- A. Гіпотіазид
- B. Пропранолол
- C. Тріампур
- D. Верапаміл
- E. Амлодипін

Тест № 106 У 50-річного хворого, який страждає на надмірну вагу, вночі виник різкий біль і припухлість 1 плюснефалангового суглоба, підвищилася температура (напередодні був на банкеті). Для уточнення діагнозу лікар призначив низку досліджень. Найімовірніше, що у хворого буде виявлено:

- A. Гемолітична анемія
- B. Підвищення лужної фосфатази
- C. Підвищення вмісту сечової кислоти
- D. Наявність ревматоїдного фактора
- E. Підвищення рівня калію

Тест № 107 Призначення пропранололу хворому з нестабільною стенокардією протипоказано, якщо у нього є:

- A. Виражена серцева недостатність
- B. Цукровий діабет
- C. Хронічний обструктивний бронхіт
- D. Переміжна кульгавість
- E. Все вищеперелічене

Тест №108 При відсутності в аптеці фепранону можна рекомендувати: A. Букарбан

B. Мерказоліл C. Унітіол D. Дезопімон E. Бутамід

Тест №109 Який з наявних антигіпертензивних препаратів не слід рекомендувати для початкового лікування хворого на артеріальну гіпертонію, страдаючий.

- A. Пропранолол
- B. Діхлотіазид
- C. Тріампур
- D. Верапаміл
- E. Амлодипін

Тест №110 При лікуванні еналаприлом можливі такі побічні ефекти:

- A. Слиноотеча
- B. Гіпокаліємія
- C. Кашель

D.Запори
E.Набряки гомілок

Тест № 111 Враховуючи провідну роль у патогенезі есенціальної гіпертензії підвищення активності системи ренін-ангіотензин, найбільш адекватним комбінованим препаратом є:

A.Адельфан
B. Адельфан-езідрекс
C. Крістепін
D. Коренітек
E. Трирезид К

Тест №112 У хворого К. 50 років при прийомі препарату фіноптин у таблетках у дозі 80 мг 4 рази на день з'являється відчуття жару; почервоніння обличчя, занепокоєння. Як слід оцінювати ці явища?

A. Як ознаки передозування препарату та зменшити дозу B. Як прояв лікарської алергії чи індивідуальної непереносимості та призначити антигістамінний препарат
C. Як побічна дія препарату, пов'язана з його фармакодинамікою і не потребує корекції.
D.Як небажана побічна дія, характерна для даного препарату, і негайно її скасувати
E. Як психологічну реакцію хворого на прийом препарату та провести з хворим відповідну бесіду

Тест № 113 Який із представлених антигіпертензивних препаратів при тривалому застосуванні може спричинити явища гіпокаліємії?

A. Празозін
B. Тріамтерен
C. Метопролол
D. Урегін
E. Каптоприл

Тест №114 При лікуванні гіпертонічної хвороби медикаментозну терапію при стабілізації АТ можна:

A.Скасувати через 1 тиждень
B.Скасувати через 1 місяць
C.Скасувати через 6 місяців
D.Скасувати через 1 рік
E.Продовжувати постійно

Тест№115Під час епідемії грипу з метою профілактики захворювання практично здоровій людині доцільно рекомендувати для застосування:

A.Метилурацил B.Тималін C.Левамізол
D.Гістаглобулін сухий E.Інтерферон лейкоцитарний людський сухий
Тест№116Хворий 34 років отримує еуфілін внутрішньовенно у зв'язку з нападом бронхіальної астми. На тлі нападу розвинулась гостра серцева недостатність. Який з нижченазваних препаратів потенційно небезпечний для застосування:

A.Преднізолон B.Строфантин C.Фуросемід
D.Сульфокамфокаїн E.Допамін

Тест№117Комбіноване застосування β_2 -агоністів (фенотерол) та холінолітиків (іпратропій бромід) у хворих на бронхіальну астму доцільно:

A.Для профілактики тахіфілаксії B.Для зниження кардіотоксичності β_2 -агоністів C.Для зменшення біодоступності холінолітиків
D.Для посилення бронхолітичного ефекту та подовження його E.Для підсилення протиалергічної дії
Тест№118Пацієнт віком 40 років хворіє на бронхіт, гострий перебіг, середнього ступеня тяжкості. Які з нижченазваних препаратів недоцільно застосовувати в лікуванні:

А.Сульгін В.Офлоксацин С.Гентаміцину сульфат D.Цефотаксим Е.Еритроміцин Тест№119 Вагітна жінка захворіла на пневмонію тяжкого перебігу. Який з нижченазваних антибактеріальних препаратів доцільно їй призначити:

А.Тетрацикліну гідрохлорид В.Офлоксацин С.Бісептол D.Цефотаксим Е.Гентаміцину сульфат Тест№120 Хворому з нефротичним синдромом, внаслідок перенесеного гломерулонефриту призначено діазепам в звичайній терапевтичній дозі. Чим можна пояснити симптоми передозування діазепамом, що виникли? А. Підвищеною чутливістю тканин ЦНС до діазепаму В. Зменшенням інтенсивності метаболізму у печенці С. Низьким вмістом білків у плазмі крові D. Дисбактеріозом, внаслідок лікування антибіотиками Е. Підвищеною проникненістю гемато-енцефалічного бар'єру. Тест№121

Хворий, що страждає на гіперацидний гастрит і для профілактики загострення приймає H₂ – гістаміноблокатор ранітидин захворів на гостру пневмонію. З метою лікування пневмонії був призначений ампіцилін у звичайній терапевтичній дозі, усередину. Ефективність антибіотикотерапії у перші дні лікування була низькою. Лише на 2-й день після відміни ранітидину основні симптоми пневмонії почали зникати. Яка причина позитивних змін в лікуванні? А. Підвищення рН шлункового соку і підсилене всмоктування ампіциліну. В. Зниження рН шлункового соку і підсилення всмоктування ампіциліну. С. Зменшення руйнування ампіциліну у печінці. D. Зменшення виведення ампіциліну нирками. Е. Зменшення надходження ампіциліну до легенів. Тест№122

Хворому з тромбозом глибоких вен гомілки, який отримує непрямі антикоагулянти призначили фенobarбітал. Через тиждень від початку прийому фенobarбіталу основні прояви тромбозу з'явилися знову. У чому причина неефективності лікування непрямыми антикоагулянтами на фоні фенobarбіталу? А. Антагонізм з чинниками антизгортаючої систем крові В. Синергізм з чинниками згортаною системи крові. С. Підсилене вивільнення іонів кальцію з тканин і надходження у кров. D. Активація синтезу протромбіну у печінці. Е. Підсилене руйнування непрямих антикоагулянтів у печінці внаслідок індукції ферментів. Тест№123

Хворий з хронічним бронхітом самолікуючись протягом 2 тижнів приймав бісептол у дозі більшій ніж звичайна терапевтична. Звернувся до лікаря з проявами гіповітамінозу А. Чим можна пояснити симптоми А –вітамінної недостатності? А. Антагонізмом білептолу з вітаміном А. В. Одним з проявів дисбактеріозу С. Токсичною дією бісептолу. D. Одним з проявів алергічної реакції на бісептол. Е. Прискороною елімінацією вітаміну А. Тест№124

Рішення про доцільність клінічних випробовувань нових ліків виноситься на підставі: А. Ретельного аналізу доклінічних даних В. Заяви авторів лікарського засобу С. Даних про токсичність лікарського засобу D. Визначення параметрів фармакокінетики Е. Наказу міністра охорони здоров'я України Тест№125

Глоссит, атрофический гастрит, извращение вкуса, ломкость волос и ногтей характерны для

- А. мегалобластной анемии
- В. гемолитической анемии
- С. железодефицитной анемии
- D. гипопластической анемии

Е. всех видов анемии Тест№126 Які антигіпертензивні лікарські засоби мають протипокази до призначення: порушення атріовентрикулярної провідності, синусова брадикардія, виразкова хвороба шлунку, бронхоспазм?

- А. Антагоністи кальцію
- В. Інгібітори ангіотензин – перетворюючого ферменту (АПФ)
- С. Блокатори адренергічних бета-рецепторів.
- D. Діуретики
- Е. Блокатори альфа-рецепторів

Тест№127 Який з вказаних нижче лікарських засобів доцільно застосовувати хворим при колапсі і шоку з метою підвищення артеріального тиску? А. Корглікон

- В. Мезатон
- С. Пропранолол

Д. Добутамін

Е. Еуфілін

Тест№128. Які з вказаних нижче антигіпертензивних препаратів мають калійзберігаючу дію?

А. Фуросемід В. Празозін С. Триамтерен Д. Резерпін Е. Клофелін

Тест№129 При інформуванні лікарів про наявність в аптеці жовчогінних засобів, відмітьте, якому з препаратів властива холекінетична дія?

А Дехолін В. Нікодин С. Магнію сульфат Д. Натрію саліцилат Е. Холагол Тест№130 При інформуванні хворого про наявність в аптеці жовчогінних засобів, відмітьте, якому з препаратів властива холеретична дія?

А Сорбіт В. Холензим С. Магнію сульфат Д. Холецистокінін Е. Еуфілін Тест№131 Хвора 60 років звернулася зі скаргами на загальну слабкість, спрагу, часте сечовиділення, свербіння шкіри. Виявлено ожиріння, вміст глюкози у крові 10 ммоль/л, у сечі 10%, реакція на ацетон негативна. Які гіпоглікемічні препарати оптимальні у даному випадку?

А. Бігуаніди В. Інсулін короткої дії С. Інсуліни пролонгованої дії Д. Похідні сульфанілсечовини Тест№132 Який препарат, що являється гормоном гіпофізу, вводять з метою профілактики та лікування маткових гіпотонічних кровотеч ?

А Динопрост В. Туринал С. Окситоцин Д. Естрон Тест№133 Антикоагулянтна дія гепарину припиняється за допомогою:

А Феніліну В. Вікасолу С. Протаміна сульфату

Д. Пентоксифіліну Тест№134 Хворий з діагнозом “гострий панкреатит” госпіталізований у стаціонар. Вибір якого препарату є патогенетично обґрунтованим? А. Кислота амінокапронова В. Актелізе С. Трентал Д. Контрикал Тест№135 Яка побічна дія найбільш характерна для етацизину ? А. Гіпоглікемія В. АВ-блокада С. Бронхоспазм Д. Гостра затримка сечі Тест№136 Хвора 62 років із зниженою екскреторною функцією підшлункової залози тривалий час приймає панкреатин. В зв'язку з відсутністю препарату в аптеці вона звернулася до фармацевта з проханням порекомендувати лікарський засіб з подібними властивостями. Яку заміну можна запропонувати хворій?

А. Карсил В. Контрикал С. Креон
Д. Холосас Е. Ацидин-пепсин

Тест№137 До лікаря звернулася вагітна (термін 10 тижнів) із гіпертонічною хворобою. Який засіб найбільш безпечний в даній ситуації ? А. Пропранолол

В. Каптоприл С. Лозартан

Д. Гідралазин Е. Метилдопа

Тест№138 Характер ціанозу у хворих з серцево-судинною недостатністю: А. На обличчі

В. Дифузний С. На нижніх кінцівках Д. Акроціаноз Е. На окремих частинах тіла

Тест№139 Виберіть не характерний симптом для гіпертензивного кризу. А. Болюче сечовиділення В. Нудота С. Блювання Д. Миготіння мушок перед очима Е. Біль голови Тест№140. В аптеку з метою придбання жарознижувального засобу звернулася молода жінка. Фармацевт побачив на обличчі почервоніння у вигляді метелика. Про яке захворювання можна думати?

А. Ревматизм В. Системний червоний вовчак С. Подагра Д. Ревматоїдний артрит Е. Остеопороз

Тест№141 Про яке захворювання можна думати, якщо у хворого сеча нагадує колір “м'ясних” помийів?

А. Гострий пієлонефрит В. Уретрит С. Гепатит Д. Гострий гломерулонефрит Е. Цистит

Тест№142 Про яке захворювання можна думати, якщо хворий скаржиться на спрагу та поліурію?

А. Тиреотоксикоз В. Мікседему С. Цукровий діабет Д. Виразкову хворобу

Е.Панкреатит

Тест№143 В аптеку звернулася вагітна жінка з лихоманкою. Порекомендуйте найбільш безпечний препарат. А.Диклофенак

В.Ацетилсаліцилова кислота С.Ібупрофен D.Парацетамол Е.Індометацин

Тест№144 В аптеку звернулася молода жінка з приводу мігрені. Який препарат Ви порекомендуєте для переривання приступу?

А.Суматриптан В.Пірацетам С.Амітриптілін D.Фуросемід Е.Феназепам

Тест№145 У хворого В., 52 років, який хворіє протягом 10 років atopічною бронхіальною астмою розвинувся напад ядухи. З яким переважним ефектом повинні бути призначені хворому препарати? А.Метаболічним В.Бронходилятуючим С.Судинорозширюючим D.Бронхоспастичним Е.Седативним

Тест№146 За призначення чергового лікаря хворому 25 років з метою купування нападу стенокардії був введений внутрішньом'язово розчин 50% анальгін 2 мл, після чого у хворого розвинувся анафілактичний шок, в результаті чого хворий помер. Що повинен був зробити лікар для профілактики побічної дії препарату?

А.Провести огляд хворого В.Розпитати про супутні захворювання С.Конкретизувати скарги хворого D.Виміряти артеріальний тиск Е.Зібрати лікарський (алергологічний) анамнез

Тест№147 Вагітна жінка (ІІІ триместр), яка захворіла грипом протягом 3 діб з метою зменшення температури приймала ацетилсаліцилову кислоту по 0,5 двічі на день. Яку побічну дію може спричинити ацетилсаліцилова кислота на плід? А.Порушення білкового обміну В.Ембріотоксичну С.Порушення вуглеводного обміну D.Тератогенну Е.Порушення жирового обміну

Тест№148 У хворого з серцевою недостатністю після тривалого прийому дигоксину виникло порушення серцевого ритму. Який препарат доцільно призначити як антидот?

А.Анаприлін В.Гідрокарбонат натрію С.Унітіол D.Активоване вугілля Е.Преднізолон

Тест№149. Хворому С., з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки для ерадикації хелікобактерної інфекції була призначена комбінована терапія (омепразол, кларитроміцин, метронідазол). Яка побічна дія може виникнути у хворого?

А.Кишкова кровотеча В.Зниження артеріального тиску С.Бронхоспазм D.Дисбактеріоз Е.Підвищення секреції соляної кислоти

Тест№150 Для лікування артеріальної гіпертензії лікар вважає необхідним призначити хворому препарат з групи блокаторів кальцієвих каналів похідне дигідропіридину ІІ покоління. З нижченаведених лікарських засобів оберіть такий препарат.

А.Верапаміл В.Амлодипін С.Кордарон D.Ділтiazем Е.Ніфедипін

Тест№151. Хворому, 43 років, в гострій фазі інфаркту міокарда було призначено в комплексній терапії гепарин внутрішньовенно по 10000 ОД кожні 4 години. Оберіть серед нижченаведених критеріїв безпеки його застосування

А.Зменшення артеріального тиску В.Зменшення болю С.Пригнічення свідомості D.Відсутність гематурії Е.Зникнення блювоти

Тест№152. Хворому П., 34 років для лікування загострення виразкової хвороби шлунку лікар вважає необхідним до складу основної фармакотерапії додати препарат з гастроцитопротекторними властивостями. Який з нижченаведених лікарських засобів не належить до цього переліку? А.Сукральфат В.Сайтотек С.Пірензепін D.Де-нол Е.Вісмута нітрат основний

Тест№153. Хворий Л., 56 років, ВІЛ-інфікований був госпіталізований з приводу генералізованого кандидомікозу. Проконсультуйте лікаря, який з нижченаведених

протигрибкових препаратів застосовується для лікування системних мікозів? А.Ністатин В.Леворин С.Ундецилова кислота D.Кетоконазол Е.*Амфотерицин В

Тест№154. Хворий Р., 35 років, на виразкову хворобу шлунку в період загострення, приймав альмагель, де-нол та фамотидин. Останнім часом з'явилося безсоння, для лікування якого лікар призначив феноборбітал в дозі 0,05 г/добу, але снотворного його ефекту не спостерігалось. Чим можна пояснити цю обставину? А.Фармакодинамічна взаємодія В.Фармацевтична взаємодія С.Фармакокінетична взаємодія альмагелю та фенобарбіталу на етапі всмоктування D.Фармакокінетична взаємодія альмагелю та фенобарбіталу на етапі виведення Е.Фармакокінетична взаємодія альмагелю та фенобарбіталу на етапі біотрансформації

Тест№155. Пацієнту з захворюванням шлунково-кишкового тракту лікар прописав жовчогінні препарати та панкреатин – фермент підшлункової залози. Для підвищення ефективності дії лікарських препаратів їх слід приймати: А.За годину до прийому їжі В.Перед прийомом їжі С.Під час прийому їжі D.Після прийому їжі Е.Запиваючи водою

Тест№156 Хворий з хронічними гастроентероколітом та гепатохолециститом звернувся до фармацевта з проханням порекомендувати йому препарат для покращання процесів травлення. Який з названих засобів найбільш ефективний? А.Пепсин В.Панкреатин С.Сік шлунковий натуральний D.Кислота хлористоводнева Е.Фестал

Тест№157 Хворому з ознаками атеросклерозу судин було призначено один з гіполіпідемічних засобів, який знижує синтез холестерину за рахунок блокування ферменту 3-гідрокси-3-метилглутарил-КоА редуктази. Вкажіть цей засіб. А.Нікотинава кислота В.Ловастатин С.Холестирамін D.Клофібрат Е.Пробукол

Тест№158 Хворому на шизофренію було призначено аміназин. Який з перерахованих фармакодинамічних ефектів є підставою для його призначення даному хворому? А.Протиблювотний В.Гіпотермічний С.Антипсихотичний D.Міорелаксуючий Е.Гіпотензивний

Тест№159. Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, звернувся в аптеку з приводу зубного болю. Фармацевт порекомендував йому знеболювальний засіб сказавши при цьому, що його необхідно вживати у дозі, меншій від звичайної. Яке явище взяв до уваги фармацевт в даному випадку? А.Сумація В.Потенціювання С.Кумуляція D.Лікарська залежність Е.Толерантність

Тест№160. В аптеку звернувся хворий, якому з приводу виразкової хвороби лікар призначив омепразол. Який механізм лежить в основі дії даного препарату? А.Блокада H₂-гістамінових рецепторів В.Блокада M₁-холінорецепторів С.Блокада H₁-гістамінових рецепторів D.Пригнічення активності H⁺,K⁺-АТФ-ази Е.Блокада H-холінорецепторів симпатичних гангліїв

Тест№161. В аптеку звернувся хворий, якому дерматолог з приводу трихофітії волосистої частини голови призначив протигрибковий антибіотик, який має здатність накопичуватися в клітинах з високим вмістом кератину (шкіра, нігті, волосся). Невдовзі хворий почав скаржитись на головний біль, дезорієнтацію, кропивницю. Який препарат був призначений хворому?

А.Гризеофульвін
В.Леворин
С.Амфотерицин В
D.Міконазол
Е.Ністатин

Тест №162. У хворой з артеріальною гіпертензією розвинувся приступ бронхіальної астми. Не порадившись з лікарем він використав бронхолітичний засіб, введення якого спровокувало гіпертензивну кризу. Який з перерахованих бронхолітичних засобів може спровокувати гіпертензивну кризу?

- А. Сальбутамол
- В. Ефедрину гідрохлорид
- С. Еуфілін
- Д. Беротек
- Е. Ізадрин

Тест №163. Відомо, що в осіб з генетично обумовленою недостатністю глюкозо-6-фосфатдегідрогенази еритроцитів у відповідь на призначення деяких протималарійних препаратів може розвиватися гемоліз еритроцитів. Як називається цей прояв атипових реакцій на лікарські засоби?

- А. Алергія
- В. Сенсibiliзація
- С. Ідіосинкразія
- Д. Тахіфілаксія
- Е. Толерантність

Тест №164

. Хворому, який страждає на атеросклероз судин головного мозку, був призначений препарат, що відноситься до групи блокаторів кальцієвих каналів. Назвіть цей препарат.

- А. Кавінтон
- В. Пентоксифілін
- С. Пірацетам
- Д. Ксантинолу нікотинат
- Е. Циннаризин

Тест №165. Хворому, який страждає на виразкову хворобу шлунка, був призначений противиразковий препарат, що має здатність одночасно знижувати секрецію соляної кислоти і пригнічувати мікроорганізм хелікобактер пілорі. Назвіть цей препарат.

- А. Гастроцепін
- В. Омепразол
- С. Маалокс
- Д. Фамотидін
- Е. Альмагель

Тест №166. Дайте відповідь на питання фармацевта-інтерну: який проносний препарат підвищує тонус матки.

- А. Касторова олія
- В. Вазелінове масло
- С. Оливкова олія
- Д. Гліцерин
- Е. Соняшникова олія

Тест №167. Дайте відповідь на запитання лікаря-інтерну: широта терапевтичної дії – це діапазон доз:

- А. Від мінімальної терапевтичної до мінімальної токсичної
- В. Від середньої терапевтичної до мінімальної токсичної
- С. Від разової до курсової
- Д. Від мінімальної терапевтичної до максимальної токсичної
- Е. Від разової до добової

Тест №168. При проведенні інформації серед лікарів Вам необхідно наголосити, які побічні ефекти можуть розвинути при застосуванні гангліоблокаторів:

- А. Лікарська залежність
- В.Кумуляція
- С. Ортостатичний колапс
- Д.Судороги
- Е.Бронхоспазм

Тест №169. Для гастриту типу характерно все, крім: А.інфікування *Helicobacter pylori*

- В. зниження секреторної функції шлунка
- С. підвищення секреторної функції шлунка
- Д.голодного болю в епігастрії
- Е.підвищеної дратівливості, стомлюваності

Тест №170. Для ерадикації *Helicobacter pylori* до комбінованої терапії хронічного гастриту доцільно включити: А. гастрोцепін

- В.альмагель
- С.Цефтріаксон
- Д.кларитроміцин
- Е.фуросемід

Тест №171. Надіймовірнішою ознакою хронічної ниркової недостатності є

- А.підвищення рівня калію в крові
- В.підвищення артеріального тиску
- С.підвищення вмісту білка в сечі (протеїнурія)
- Д.підвищення рівня креатиніну в крові
- Е.підвищення добового діурезу вище 3 л

Тест №172. До клінічних проявів цукрового діабету не відноситься: А. зниження обсягу сечі, що виділяється (олігурії)

- В.підвищення об'єму сечі, що виділяється (поліурії)
- С. свербіж шкіри
- Д.підвищення апетиту
- Е.фурункульоз

Тест №173. До клінічних проявів тиреотоксикозу не належать:

- А. зниження маси тіла
- В. збільшення маси тіла
- С.підвищена дратівливість
- Д.екзофтальм (витрішкуватість)
- Е. тахікардія

Тест №174. Для ангіоневротичного набряку Квінке не характерний наступний симптом: А. набряк губ

- В.набряк гортані
- С.шкірний свербіж
- Д.еозинофілія
- Е.поліурія

Тест №175. Проконсультуйте лікаря-терапевта, який механізм бронхолітичної дії характерний для сальбутамолу?

- А.Придушення ліпоксигенази
- В.Блокада лейкотрієнових рецепторів
- С.Придушення фосфодіестерази
- Д.Порушення β 2-адренорецепторів
- Е.Блокада М-холіноорецепторів

Тест №176. Дайте колезі пораду щодо вибору раціональної комбінації лікарських препаратів при артеріальній гіпертензії: А.Фуросемід + калію оротат

- В.Дігосин + кальцію хлорид
- С.Дихлотіазид + калію хлорид
- Д.Верошпірон + аспаркам

Е.Панангін + калію хлорид Тест№177. Який із наведених препаратів повинен входити в якості антидоту до аптечки невідкладної допомоги на підприємствах, де можливі гострі отруєння сполуками миш'яку, ртуті, хрому, вісмуту? А.Адреналін
В.Атропін
С.Морфін
D.Унітіол
Е.Дроперидол

Тест№178. До Вас в аптеку звернулася жінка з дитиною 3 років, яка випила 6 таблеток димедролу. Через 30 хв. після цього у неї виникли задишка, утруднене ковтання, хрипота, розширення зіниць, гіпертермія. Який із препаратів слід застосувати з метою невідкладної допомоги?

А.Прозерин
В.Адреналін
С.Атропін
D.Морфін
Е.Дроперидол

Тест№179. До Вас до аптеки звернувся хворий з приводу того, що після роботи на складі хімічних речовин із хлорофосом, з'явилися утруднене дихання, стискання в грудях, блювота, болі в животі, часте сечовипускання. Який препарат невідкладної допомоги слід застосувати?

А.Адреналін
В.Атропін
С.Димедрол
D.Унітіол
Е.Дротаверин

Тест№180

. У хворої після прийому 6 таблеток фенобарбіталу з'явилася виражена сонливість, знижений м'язовий тонус, гіперсаливація, гіпотензія та гіпотермія, зіниці помірно звужені. Який препарат слід застосувати в рамках невідкладної допомоги?

А.Тіамін
В.Адреналін
С.Кальцію хлорид
D.Еуфілін
Е.Бемегрид

Тест№181. У хворого хронічний гастрит типу А зі зниженою секреторною функцією, перніціозна анемія. Який з препаратів показаний хворому?

А.Адреналін
В.Ціанокобаламін
С.Дифенгідрамін (димедрол)
D.Вікалін
Е.Дротаверин (но-шпа)

Тест№182. Хвору 53 років після фізичного навантаження почав турбувати біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку. Який препарат слід призначити для переривання больового приступу?

А.Ізосорбід 5-мононітрат
В.Ніфедипін
С.Нітрогліцерин
D.Метопролол
Е.Дилтіазем

Тест №183. У хворого С., 64 років, який страждає на ІХС, атеросклеротичний кардіосклероз, гіпертонічну хворобу II ст, розвинувся астено-депресивний синдром. Який із призначених йому антигіпертензивних засобів міг цьому сприяти?

- А.Фуросемід
- В.Спіронолактон
- С.Окспренолол
- Д.Клонідин
- Е.Усі вказані засоби

Тест №184. У хворої Т. 42 років після гіпертонічного кризу розвинулася лівошлуночкова недостатність у вигляді набряку легень. Який препарат і яким чином слід призначити негайно?

- А.Пропранолол внутрішньовенно
- В.Фуросемід внутрішньовенно
- С.Фуросемід внутрішньом'язово
- Д.Верапаміл внутрішньовенно

Тест №185. У хворої з гіпертонічною хворобою II ст. після тривалого приймання пропранололу, ніфедипіну та дихлотіазиду з'явилися судом в м'язах нижніх кінцівок, порушення серцевого ритму. Яким препаратом міг бути спричинений цей стан?

- А.Дихлотіазидом
- В.Пропранололом
- С.Дихлотіазидом і пропранололом
- Д.Пропранололом і ніфедипіном
- Е.Не пов'язаний з прийманням цих ліків

Тест №186. До Вас в аптеку звернувся хворий на виразкову хворобу шлунку з помірними клінічними проявами. З анамнезу відомо, що в нього виявлено *Helicobacter pylori*. Яка група ЛЗ має бути основою лікування?

- А.Антациди
- В.Антисекреторні ЛЗ
- С.Коректори моторної функції
- Д.Антимікробні ЛЗ
- Е.Седативні ЛЗ

Тест №187

. Пацієнт скаржиться на помірні болі в животі, які виникли раптово після фізичного навантаження, нудоту, блювоту "кавовою гущею", запаморочення, різку слабкість. Не обстежувався, не лікувався. Хворий блідий, покритий холодним липким потом. Що могло стати причиною описаного стану?

- А.Гострий інфаркт міокарда
- В.Гострий пієлонефрит
- С.Гострий холецистит
- Д.Пневмонія

Е.Шлунково-кишкова кровотеча

Тест №188. В аптеку звернувся хворий з рецептами на омепразол 20 мг х 1 раз/д, кларитроміцин 0,5 х 2 рази/д. Така схема терапії, найімовірніше, була призначена з приводу:

- А.Хронічного гастриту типу А
- В.Хронічного гастриту типу В
- С.Хронічного панкреатиту
- Д.Хронічного холециститу
- Е.Хронічного гепатиту

Тест №189. До Вас звернулася хвора на хронічний панкреатит з вираженими проявами недостатності зовнішньо-секреторної функції підшлункової залози. Який з наведених ЛЗ найдоцільніше призначати в даному випадку?

- А.Панкреатин

- В.Дротаверин (но-шпа)
- С.Де-нол
- Д.Омепразол
- Е.Ацидин-пепсин

Тест №190. Хворий на бронхіальну астму під час приступу ядухи застосовує рекомендований фармацевтом препарат "Беротек". Після десятої інгаляції протягом першої доби виникли тахікардія і болі в ділянці серця з іррадіацією в ліву лопатку. З чим можуть бути пов'язані зазначені явища?

- А.Недостатньою селективністю ЛЗ
- В.Передозуванням
- С.Недостатньою селективністю препарату на фоні передозування
- Д.Психогенними чинниками
- Е.Бронхоспазмом

Тест №191

. Хворому в ділянці хірургічного розтину тканин ввели 0,25% розчин новокаїну. Зненацька пацієнт покрится червоними плямами, виникли інтенсивне потовиділення, тахікардія, набряк слизової носа, бронхоспазм. Яка причина цього ускладнення ?

- А.Алергічна реакція сповільненого типу
- В.Алергічна реакція негайного типу
- С.Місцевоподразнююча дія
- Д.Тахіфілаксія
- Е.Синдром відміни

Тест №192 В результаті необережного поводження біля пасіки дитину вжалило декілька бджіл у різні ділянки тіла та обличчя. Який із препаратів має бути застосований на етапі першої допомоги ?

- А.Кларитин
- В.Атропін
- С.Парацетамол
- Д.Амоксицилін
- Е.Фуросемід

Тест №193. Хвора, яка отримує поліхіміотерапію в рамках комбінованого лікування раку грудної залози, скаржиться на нудоту та блювоту. Водночас є всі підстави для продовження протипухлинного лікування. Запропонуйте оптимальний шлях корекції даного ускладнення.

- А.Знизити дози хіміопрепаратів
- В.Відмінити один із хіміопрепаратів
- С.Додати ефективний протиблювотний засіб
- Д.Тимчасово припинити хіміотерапію
- Е.Обмежитись роз'ясненням

Тест №194. У хворого 52 років внаслідок загострення хронічного гломерулонефриту розвинулась гостра ниркова недостатність. Якому з наведених діуретиків треба віддати перевагу: А.Тріамтерен

- В.Дихлотиазид
- С.Спіронолактон
- Д.Фуросемід
- Е.Амілорид

Тест №195. Хворий Г., 24 років, страждає на цукровий діабет 1 типу протягом 8 років. На ґрунті діабетичної нефропатії розвинулась симптоматична артеріальна гіпертензія. Який з наведених препаратів показаний для тривалої терапії:

- А.Пропранолол
- В.Клофелін

- С.Еналаприл
- Д.Дібазол
- Е.Дихлотиазид

Тест №196 У хворого Н., 15 років, вперше виявлено цукровий діабет І типу. Який цукрознижуючий засіб необхідно призначити:

Тест №197. Хвора М., 33 роки, хворіє на ревматоїдний поліартрит, в анамнезі виразкова хвороба 12-палої кишки. Який нестероїдний протизапальний препарат можна порекомендувати хворій ?

- А.Диклофенак натрію
- В.Німесулід
- С.Піроксикам
- Д.Напроксен
- Е.Індометацин

Тест №198. У хворої О., 43 років, на 6-й день після початку лікування диклофенаком-натрію (100 мг/д) виникли свербіж та пухирчаті висипання на шкірі тулуба та верхніх кінцівок. Запропонуйте раціональну фармакотерапевтичну корекцію.

- А.Підвищити дозу диклофенаку натрію
- В.Відмінити диклофенак натрію та призначити антигістамінні засоби
- С.Відмінити диклофенак натрію та застосувати місцевоанестезуючі засоби
- Д.Знизити дозу диклофенаку натрію
- Е.Призначити глюкокортикоїди

Тест №199. Хворому з інфекційно-алергічною формою бронхіальної астми з частими і вираженими приступами бронхоспазму було призначено комплексне лікування. Який з наведених ЛЗ протипоказаний в даному випадку?

- А.Ацетилсаліцилова кислота
- В.Флунісолід
- С.Амброксол
- Д.Кетотифен
- Е.Теофілін

Тест №200. Хворий скаржиться на продуктивний кашель упродовж багатьох років, задишку при фізичному навантаженні. Спостерігається тахіпное, при перкусії коробковий звук, аускультативно – ослаблене дихання, рентгенологічно – “легеневе серце”. Якому препарату слід надати перевагу для лікування хронічного обструктивного захворювання легень поза загостреннями?

- А.Дротаверин (но-шпа)
- В.Амоксицилін
- С.Іпратропіум бромід (атровент)
- Д.Лоратадин
- Е.Сульфадиметоксин

Тест №201. Хворому з гастритом в анамнезі при ревматоїдному артриті був призначений препарат із групи селективних інгібіторів циклооксигенази-2. Вкажіть препарат:

- А.Індометацин
- В.Диклофенак-натрій
- С.Напроксен
- Д.Ібупрофен
- Е.Німесулід

Тест №202 У хворих з гіпертензією та цукровим діабетом І типу препаратом вибору є представники А.Тіазидних діуретиків

В.Бета-адреноблокаторів

- С. Інгібіторів АПФ
- Д.Петлевих діуретиків
- Е.Альфа-адреноблокаторів

Тест №203. Який препарат може бути використаний з метою усунення гіпертензивного кризу, ускладненого нападом стенокардії

- А.Каптоприл
- В.Дібазол
- С.Ірбесартан
- Д.Празозін
- Е.Ніфедипін

Тест №204. Вкажіть найбільш раціональну комбінацію антигіпертензивних препаратів у хворих з артеріальною гіпертензією та серцевою недостатністю А.Гіпотіазид + верошпірон

- В.Еналаприл + фуросемід
- С.Пропранолол + етакринова кислота
- Д.Пропранолол + верапаміл
- Е.Доксазозин + амілорид

Тест №205. Через кілька місяців після початку терапії у хворого знову почастишали напади стенокардії. Які можливі причини погіршення стану? А.Природний перебіг захворювання

- В.Синдром „обкрадання”
- С. Виникнення синдрому „рикошету”
- Д. Розвиток толерантності до нітратів

Е.Тахіфілаксія Тест №206 Пациент К., страдающий язвенной болезнью 12-перстной кишки, обратился к провизору с вопросом о наиболее оптимальном времени приема маалокса.

- А.Перед едой
- В.Во время еды
- С.После еды
- Д.В межпищеварительный период
- Е.Вне зависимости от приема пищи

Тест №207 Найбільш ефективним препаратом у профілактиці ерозивного гастродуоденіту, що провокується НПЗЗ, є А.Мізопростол

- В. Колоїдний субцитрат вісмуту
- С.Фосфалюгель
- Д.Метронідазол
- Е.Ранітідін

Тест № 208 При тривалому прийомі антацидів, що містять алюміній, відзначається

- А. Зниження слуху
- В.Поліурія
- С.Слиноотеча
- Д.Гіперхолестеринемія
- Е.Ураження кісткової тканини

Тест №209. У вагітної М., 23 років з артеріальною гіпертензією для комбінованої терапії призначення допегіту доцільно поєднувати з: А. Пропранололом

- В.Гіпотіазидом
- С.Еналаприлом
- Д.Празозином
- Е.Корінфаром

Тест №210. У хворого Р., який приймає дигоксин у добовій дозі 0,25 мг, розвинулася екстрасистолія. Що потрібно зробити? А.Збільшити дозу дигоксину

- В. Зменшити дозу дигоксину
- С. Припинити прийом дигоксину
- Д. Не скасовувати дигоксин, призначити новокаїнамід
- Е. Не скасовувати дигоксин, призначити лідокаїн

Тест №211. Які антигіпертензивні засоби протипоказані хворому при супутньому цукровому діабеті з періодами гіпоглікемії? А. Гіпотіазид

- В. Корінфар
- С. Каптоприл
- Д. Пропранолол
- Е. Ділтiazем

Тест №212. При нападі стенокардії болу найчастіше локалізуються: А. У лівій пахвовій області

- В. Міжлопаткова область
- С. Права половина грудної клітки
- Д. За грудиною
- Е. Епігастральна область

Тест №213. Хворому С., з діагнозом сімейна гіперхолестеринемія, призначений препарат, що інгібує фермент 3-гідрокси СоА-редуктазу. Позначте цей препарат. А. Пробукол

- В. Ловастатин
- С. Холестірамін
- Д. Фенофібрат
- Е. Нікотинова кислота F.

Тест №214. Хворому із значно підвищеним рівнем тригліцеридів необхідно провести гіполіпідемічну терапію. Який із перелічених препаратів викликає зниження концентрації у плазмі рівня тригліцеридів, збільшуючи активність ліпопротеїнліпази?

- А. Нікотинова кислота
- В. Сімвастатин
- С. Ловастатин
- Д. Пробукол

Е. Ципрофібрат Тест №215. Больная 62 лет, страдает феохромоцитомой. Какой антигипертензивный препарат целесообразно назначить?

- А. Пропранолол
- В. Талинолол
- С. Фуросемид
- Д. Фентоламин
- Е. Дихлотіазид

Тест №216

. В аптеку звернувся хворий 28 років, який страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки; секреторна функція шлунку різко підвищена. Який з наведених препаратів бажано призначати в даному випадку?

- А. Атропіна сульфат
- В. Сметта
- С. Омепразол
- Д. Метоклопрамід
- Е. Маалокс

Тест №217. Хвору, яка отримує поліхіміотерапію з приводу гострого лейкозу, турбують анорексія, нудота та блювота. Водночас є всі підстави для продовження цитостатичного лікування. Запропонуйте оптимальний шлях корекції даного ускладнення. А. Додати протиблювотний засіб

- В. Знизити дози хіміопрепаратів
- С. Відмінити один із хіміопрепаратів

D.Тимчасово припинити хіміотерапію

E.Підвищити дози хіміопрепаратів

Тест№218. У хворого, який тривалий час лікується з приводу ревматоїдного артрити, виявлено гіперглікемію. Котрий із препаратів міг її спричинити? А.Диклофенак натрію

A.Дексаметазон

B.Ібупрофен

C.Делагіл

D.Левамізол

Тест№219. Проконсультуйте молодого колегу: якому із перелічених антибактеріальних засобів властива гематотоксичність? А.Цефтріаксон

B.Імпенем

C.Левоміцетин

D.Амоксицилін

E.Кларитроміцин

Тест№220. Хвора із сезонним вазомоторним ринітом, яка працює диспетчером на залізниці, звернулася в аптеку за порадою: котрий із антигістамінних лікарських засобів не має пригнічувальної дії на ЦНС? А.Клемастин

B.Дипразин

C.Дифенгідрамін

D.Лоратадин

E.Піпольфен

Тест№221 У хворого на шизофренію розвинулись стійкі галюцинації. Порадьте лікарю-інтерну, препарат з якої групи доцільно призначити пацієнту? А.Транквілізатори

B.Нейролептики

C.Антидепресанти

D.Психостимулятори

E.Наркотичні анальгетики

Тест№222. Хворий звернувся з проханням відпустити йому безрецептурний препарат з метою полегшення болю в горлі. В анамнезі – алергія на місцеві анестетики. Котрий з наведених лікарських засобів йому протипоказаний? А.Колдрекс Ларі Плюс

B.Стрепсилс

C.Фарингосепт

D.Нео-ангін

E.Септефрил

Тест№223 Проконсультуйте молодого колегу: який лікарських засобів застосовують при гострому інфаркті міокарда з метою тромболітичної терапії?

A.Ацетилсаліцилова кислота

B.Гепарин

C.Альтеплаза

D.Пентоксифілін

E.Фраксипарин Тест№224. Хворий Б., 28 років на бронхіальну астму поступив до

терапевтичного відділення з тяжким нападом ядухи. З якого препарату слід почати

лікування? А.Окситропія бромід

B.Еуфілін

C.Сальбутамол

D.Іpratропія бромід

E.Преднізолон

Тест №225. У хворого К, 53 років бронхіальна астма та стенокардія напруги III ф.к. Який препарат із перелічених нижче протипоказаний в даному випадку?

- А.Преднізолон
- В.Орципреналин
- С.Сальбутамол
- Д.Беклометазон
- Е.Амлодипін

Тест №226. Хворому К, 34 років з метою профілактики нападів бронхіальної астми лікар вважає доречним призначення інгаляційного глюкокортикоїдного препарату. Який з нижченаведених не належить до цієї групи? А.Флунісолід

- В.Флутіказон
- С.Будесонід
- Д.Сальметерол
- Е.Беклометазон

Тест №227. Хворий В., потрапив у кардіологічне відділення з приступом надшлуночкової паросизмальної тахікардії. Який препарат з нижче перелічених є препаратом вибору у цьому випадку? А.Верапамил

- В.Лідокаїн
- С.Еналапріл
- Д.Ніфедипін
- Е.Лізиноприл

Тест №228. Хворий К., страждає на ішемічну хворобу серця з серцевою недостатністю другої стадії. З якої комбінації препаратів слід починати лікування цього хворого?

- А.Інгібітори АПФ + блокатори кальцієвих каналів
- В.Інгібітори АПФ + діуретіки
- С.Інгібітори АПФ + нітрати
- Д.Нітрати + діуретіки
- Е.Альфа-адреноблокатори + діуретіки

Тест №229. Після тижневої фармакотерапії артеріальної гіпертензії лізиноприлом в дозі 10 мг 2 раз на добу у хворого з'явилися періодично виникаючі напади сухого кашлю. Чим це може бути зумовлене? А.Підвищенням тонусу кашльового центру

- В.Загостренням супутньої патології
- С.Пригніченням синтезу альдостерону
- Д.Накопиченням в крові залишку брадикініну
- Е.Зменшення вмісту в крові адреналіну

Тест №230. Хворому К, 54 років, який кілька років страждає хронічним гіперацидним гастритом, призначений альмагель. Які ускладнення фармакотерапії з боку органів травлення можуть виникнути перш за все?

- А.Нудота
- В.Закреп
- С.Анорексія
- Д.Блювота
- Е.Діарея

Тест №231. Хворий К 35 років., лікується у кардіологічному відділенні з діагнозом стабільна стенокардія напруги. Стан хворого стабільний, АТ 130/80 мм рт. ст. Який препарат доцільно використовувати для попередження гіперліпідемії? А.Гепарин

- В.Аспірин
- С.Атенолол
- Д.Лізиноприл

Тест №232. При відпустці безрецептурного препарату для симптоматичного лікування болю в горлі в лікарській формі аерозолю, фармацевт зобов'язаний звернути увагу пацієнта на те, що даний препарат:

- А. слід розпорошувати в порожнині рота при затримці дихання
- В. слід розпорошувати в порожнині рота синхронно з глибоким вдихом
- С. слід розпорошувати в порожнині рота синхронно з глибоким видихом
- Д. слід розпорошувати на відстані 10-15 см від порожнини рота
- Е. слід розпорошувати в порожнині рота безпосередньо перед їжею та/або питвом

Тест №233. При відпустці безрецептурного препарату для симптоматичного лікування риніту хворому з артеріальною гіпертензією для максимального зниження ймовірності розвитку небажаної системної судинозвужувальної дії слід рекомендувати лікарську форму:

- А. краплі
- В. аерозоль
- С. таблетки
- Д. мазь
- Е. гель

Тест № 234 При виділеннях з однієї половинки носа у дитини дошкільного віку слід рекомендувати звернутися до лікаря, оскільки цей симптом є загрозливим і вимагає виключити:

- А. гострий алергічний риніт
- В. стороннє тіло в носовому ході
- С. гостре респіраторне захворювання
- Д. синусит
- Е. аденоїди

Тест №235 У хворого з підвищеною бронхіальною секрецією та рясним відділенням мокротиння протикашльові препарати:

- А. є обов'язковим компонентом лікування
- В. призначаються лише на ніч
- С. не призначаються
- Д. не призначаються особам із супутньою патологією печінки.
- Е. не призначаються дітям до 3 років

Тест №236. При призначенні антигістамінного препарату дипразину з метою симптоматичного лікування алергії фармацевт повинен попередити пацієнта, що цей препарат не можна поєднувати з алкоголем, оскільки:

- А. потенціюється пригнічуючу дію на ЦНС
- В. потенціюється подразнююча дія препарату на слизову оболонку шлунка
- С. можливе різке підвищення АТ
- Д. можливий розвиток гепатотоксичного ефекту
- Е. можливе посилення симптомів алергії

Тест №237. При призначенні препарату “Антимігрен” (суматриптан) для лікування мігренозного нападу фармацевт повинен попередити пацієнта, що у разі відсутності належного ефекту повторний прийом препарату можливий: А. не раніше ніж через 30 хв.

- В. не раніше, ніж через 3 години
- С. не раніше, ніж через 12 годин
- Д. не раніше, ніж через 24 години
- Е. не раніше, ніж через 48 годин

Тест №238. Небажана реакція, яка обумовлена фармакологічними властивостями лікарського засобу і спостерігається виключно при застосуванні доз, рекомендованих для медичного застосування лікарського засобу, називається:

- А. токсична дія
- В.алергічна реакція
- С.побічна дія
- Д. ідіосинкразія
- Е. синдром скасування

Тест №239. Запори – побічна дія, розвиток якого нерідко спостерігається при курсовому лікуванні антигіпертензивними препаратами із групи:

- А.діуретиків
- В.інгібіторів АПФ
- С.блокаторів кальцієвих каналів
- Д.альфа-адреноблокаторів
- Е.блокаторів ангіотензинових рецепторів

Тест № 240 Хворому І., 56 років для лікування гіпертонічної хвороби призначені інгібітор АПФ і калійзберігаючий діуретик. Така комбінація:

- А. раціональна, оскільки зменшується ризик розвитку гіпокаліємії
- В.раціональна, оскільки потенціюється гіпотензивна дія ІАПФ
- С.нераціональна, оскільки знижується гіпотензивна дія ІАПФ
- Д.нераціональна, оскільки збільшується ризик розвитку гіперкаліємії
- Е.нераціональна, оскільки збільшується ризик розвитку ортостатичного колапсу

Тест №241. "Сірий синдром" новонароджених (падіння температури нижче за норму, ацидоз, дихальні розлади, сіре забарвлення шкіри, колапс) розвивається при застосуванні:

- А.тетрацикліну
- В.гентаміцину
- С.ципрофлоксацину
- Д.левоміцетину
- Е. еритроміцину

Тест №242. Для профілактики остеопорозу жінкам після 40 років слід рекомендувати полівітамінні препарати з підвищеним вмістом:

- А.заліза
- В.магнію
- С.кальція
- Д.калія
- Е.цинку

Тест №243. При лікуванні гіпертонічної хвороби діуретиками препарати калію не призначають у поєднанні з А.клопамідом.

- В.дихлотіазидом
- С.фуросемідом
- Д.тріамтереном

Е.етакриновою кислотоюТест№244. У хворого 49 років – загострення виразкової хвороби 12-палої кишки з супутнім антральним гастритом. Доведена наявність хелікобактерної інфекції. Під час комплексної фармакотерапії хворий поскаржився на появу калу чорного кольору.

Який із призначених препаратів змінив колір калових мас? А.Метронідазол

- В.Де-нол
- С.Амоксицилін
- Д.Тетрациклін

Е.Фуразолідон Тест№245. Хворому 65 років з гострим інфарктом міокарду призначено в комплексній фармакотерапії гепарин по 5000 ОД кожні 4 години внутрішньовенно. Вкажіть критерій безпеки його застосування: А.Відсутність гематурії

В.Зменшення артеріального тиску

С.Пригнічення свідомості

Д.Зменшення болю

Е.Зникнення блювання

Тест№246. У хворої 26 років діагностовано позагоспітальна пневмонія, спричинена мікоплазмою. Виберіть необхідний протимікробний лікарський засіб: А.Амоксицилін

В.Роваміцин

С.Гентаміцин

Д.Бензілпеніцилін

Е.Амоксіклав

Тест№247. Хвора 60 років страждає гіпертонічною хворобою II стадії, ішемічною хворобою серця, бронхіальною астмою. Після корекції фармакотерапії стався напад бронхоспазму, зросла задишка. Який лікарський засіб спричинив ускладнення? А.Ніфедипин

В.Еуфілін

С.Пропранолол

Д.Мукалтин

Е.Сальбутамол

Тест№248 До фармацевта в аптеці звернулась жінка з проханням відпустити жарознижуючий засіб для дитини 8 місяців. Який препарат Ви порадите?

А.Ацетилсаліцилова кислота

В.Парацетамол

С.Індометацин

Д.Діклофенак натрію

Е.Піроксикам

Тест№249. Хвора 56 років із хронічним панкреатитом та зниженою секреторною функцією підшлункової залози тривалий час приймає мезим. Яку заміну можливо запропонувати хворій в аптеці при відсутності препарату? А.Контрикал

В.Холосас

С.Карсил

Д.Ацидин-пепсин

Е.Панцитрат

Тест№250. Хворий 65 років з хронічною серцевою недостатністю регулярно приймає фуросемід по 40 мг натщесерце 3 рази на тиждень. У нього виникла позашпитальна пневмонія, у зв'язку з чим лікар призначив комбіновану фармакотерапію. Через 3 доби хворий почав втрачати слух. Назвіть лікарський засіб, який при взаємодії з фуросемідом викликав глухоту: А.Амікацин

В.Лінекс

С.Тавегіл

Д.Ністатин

Е.Розчин йодистого калію

Тест№251. У хворого 60 років з ішемічною хворобою серця, хронічною серцевою недостатністю, тахісистолічною формою фібриляції передсердь стався напад серцевої астма. Вкажіть серцевий глікозид з швидкою дією, низькою кумулятивною здатністю, який ефективно підвищує силу серцевих скорочень та необхідний хворому: А.Дігосин

В.Дігітоксин

С.Строфантин

Д.Целанід

Е.Адонізид

Тест№252. Для покращення відходження мокроти, дренажної функції бронхів, хворий 52 років з бронхіальною астмою призначено лікарський засіб. Через деякий час у хворої з'явилися слюзотеча, рінорея, лоскіт в горлі. Який засіб отримувала хвора? А.Мукалтин

В.Бронхолітин

С.Амброксол

Д.Йодид калію

Е.Бромгексін

Тест№253. До лікаря звернувся хворий 70 років з приводу підвищеного артеріального тиску. З анамнезу відомо про наявність доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Який лікарський засіб бажано призначити даному хворому? А.Еналаприл

В.Доксазозин

С.Пропранолол

Д.Дилтіазем

Е.Лозартан

Тест№254. Дитину 6 років вжалило декілька бджіл у різні ділянки тіла. Який з нижченаведених засобів має бути застосовано на етапі першої допомоги?

А.Ацетилсаліцилова кислота

В.Бензилпеніцилін

С.Тавегіл

Д.Кетотифен

Е.Папаверін

Тест№255. Хворого турбують періодичні напади болю за грудиною, з приводу чого він звернувся в аптеку з проханням порекомендувати йому лікарський засіб. Після бесіди з хворим фармацевт зробив висновок, що у нього стенокардія. Яка тривалість больового синдрому при стенокардії? А.Від кількох секунд до 20-30 хвилин

В.1 година

С.2-4 години

Д.6 годин

Е.10 годин

Тест№256. При огляді хворого виявлено збільшений живіт, випинання пупка, наявність на шкірі живота судинних зірочок та розширення судин у вигляді „голови медузи”. Для якого захворювання характерні такі симптоми? А.Ожиріння

В.Вірусний гепатит

С.Хронічний панкреатит

Д.Хронічний холецистит

Е.Цироз печінки

Тест№257. У жінки, яка тривалий час лікується з приводу інфільтративно-вогнищового туберкульозу, різко знизився слух. Який з перерахованих препаратів міг викликати таку побічну дію? А.Ізоніазид

В.Етамбутол

С.Рифампіцин

Д.Стрептоміцин

Е.Етіонамід

Тест№258. В аптеку звернувся хворий, якому з приводу захворювання на виразкову хворобу 12-палої кишки призначено де-нол, з проханням розказати, як правильно вживати препарат.

А.Безпосередньо перед кожним прийомом їжі

В.За 30 хвилин до прийому їжі та перед сном

С.Безпосередньо після кожного прийому їжі

D.Під час прийому їжі

E.На протязі дня при болі в шлунку та перед сном

Тест №259. В аптеку звернувся хворий, якому дерматолог з приводу мікроспорії призначив протигрибковий антибіотик, який має здатність накопичуватися в клітинах з високим вмістом кератину (шкіра, нігті, волосся). Невдовзі хворий почав скаржитись на головний біль, дезорієнтацію, кропивницю. Який препарат був призначений хворому?

A.Леворин

B.Амфотерицин В

C.Міконазол

D.Ністатин

Тест №260. Хворий К 35 років., лікується у кардіологічному відділенні з діагнозом стабільна стенокардія напруги. Стан хворого стабільний, АТ 130/80 мм рт. ст. Який препарат доцільно використовувати для попередження гіперліпідемії?

A.Гепарин

B.Аспірин

C.Атенолол

D.Лізиноприл

E.Ловастатин

Тест №261. Хворий Л., 70 років, поступив в кардіологічне відділення з нападом стенокардії, де йому було призначене лікування. Після прийому ліків хворий відмітив сильний головний біль та нудоту. Для якого антиангінального засобу характерний такий побічний ефект?

A.Метопролол

B.Нітросорбід

C.Амлодипін

D.Ніфедипін

E.Атемолол

Тест №262. Хворий Г., 65 років, страждає гіпертонічною хворобою з брадикардією. Який з лікарських засобів йому доцільно призначити?

A.Ніфедипін

B.Еналаприл

C.Доксазозин

D.Атенолол

E.Метилдофа

Тест №263. Хвора Д., 25 років скаржиться на підвищену збудливість, плаксивість, яка раптово переходить у стана радості, нервовість, серцебиття, зниження маси тіла за умов збереження апетиту, загальну слабкість, підвищену пітливість та порушення сну. Про яке захворювання можна думати?

A.Гіпофізарний нанізм

B.Мікседему

C.Гіпертиреоз

D.Акромегалію

E.Гіпопаратиреоз

Тест №264. В аптеку звернулася молода жінка з приводу різкого болю в правій скроневій ділянці, нудоти, світлобоязні. Приступ почався раптово. Який безрецептурний препарат Ви порекомендуєте?

A.Пірацетам

B.Суматриптан

C.Вінпоцетін

D.Аскорбінова кислота

E.Спіронолактон

Тест №265. В аптеку звернулася мама 4-х місячної дитини з проханням видати жарознижувальний препарат. Який препарат Ви порекомендуєте для дитини?

A.Колдрекс

B.Солпадеїн

C.Німесулід

Д.Панадол
Е.Діклофенак натрію

Тест №266. Жінка Ф., 30 років, хворіє гіпертиреозом, скаржиться на збільшення частоти серцевих скорочень. Який з зазначених препаратів слід призначити для нормалізації серцевого ритму?

А. Сальбутамол
В. Адреналін
С. Пентамін
Д. Пропранолол
Е. Ізадрин

Тест №267. Відпускаючи з аптеки препарат заліза для прийому всередину - ферроплекс, слід попередити хворого, що цей препарат не можна запивати молоком і вживати разом з ним молочні продукти, тому що:

А. Утворюються погано розчинні хелатні комплекси
В. Пролонгується дія препаратів заліза
Посилюється активність препарату
Д. Швидко всмоктується препарат
Е. Прискорюється виведення препарату

Тест №268. В аптеку звернувся хворий із сильним сухим кашлем. Який лікарський засіб Ви порекомендуєте прийняти хворому для пригнічення непродуктивного кашльового рефлексу:

А. Калію йодид
В. Тріпсін
С. Ацетилцистеїн
Д. Лібексин
Е. Натрію гідрокарбонат

Тест №269. Хворому на бронхіальну астму лікар призначив прийом бета-адреностимуляторів. Який із наведених засобів Ви порекомендували б придбати виходячи з його впливів на частоту серцевих скорочень?

А. Ефедрін
В. Сальбутамол
С. Ізадрин
Д. Алупент
Е. Адреналін

№270. До фармацевту звернувся пацієнт, якому рекомендували прийом ацетилсаліцилової кислоти як антиагрегант. Яку добову дозу слід рекомендувати для постійного прийому?

А. 0,1 - 0,3
Ст 0,5 – 1,0
С. 1,0 - 2,0
Д. 2,0 – 3,0
Е. Більше 4,0

Тест №271. У хворої 36 років виявлено атипову позашпитальну пневмонію, яка спричинена хламідійною інфекцією. Який антибактеріальний препарат доцільно рекомендувати у разі?

А. Ванкоміцин
В. Ампіцилін
С. Пеніцилін
Д. Цефуроксим
Е. Роксітроміцин

Тест № 272 У хворого похилого віку діагностовано госпітальну пневмонію. Лікується гентаміцином. Яка побічна дія найчастіше зустрічається при використанні антибіотиків цієї групи?

- A. Псевдомембранозний коліт
- B. Гематотоксична
- C. Ототоксична дія
- D. Ураження печінки
- Є. Тромбофлебіт

Тест № 273 Виберіть із перелічених захворювань ті, які можуть лікуватися за допомогою ОТС-препаратів за консультативної допомоги фармацевта.

- A. Рак легень
- B. ГРЗ
- C. Екссудативний плеврит
- D. Бронхіальна астма
- E. Гостра пневмонія

Тест № 274 Поняття «комплаєнс» означає:

- A. Готовність пацієнта виконувати всі рекомендації лікаря, фармацевта, фармацевта
- B. Самолікування
- C. Займатися самопрофілактикою
- D. Самодопомога
- Є. Усі відповіді правильні

Тест №275В аптеку звернулася вагітна жінка з лихоманкою. Порекомендуйте найбезпечніший препарат.

- A. Ібупрофен
- B. Диклофенак
- C. Ацетилсаліцилова кислота
- D. Парацетамол
- E. Індометацин

Тест № 276Симпатоіметики для лікування риніту призначають з обережністю при:

- A. Мікседемі
- B. Поносі
- C. Гастрит
- D. Гіпотонії
- E. Артеріальної гіпертензії

Тест № 277 У 6-річному віці дитина захворіла на пневмонію, з приводу якої призначений антибіотик. Після лікування дитина втратила слух. Яка група антибіотиків могла спричинити це ускладнення?

- A. Пеніциліни природні
- B. Цефалоспорини
- C. Макроліди
- D. Аміноглікозиди
- E. Пеніциліни напівсинтетичні

Тест №278 Хворому С. з виразковою хворобою 12-палої кишки для ерадикації хелікобактерної інфекції було призначено комбіновану терапію (омепразол, кларитроміцин, метронідазол). Яка побічна дія може виникнути у хворого?

- A. Підвищення секреції соляної кислоти
- B. Кишкова кровотеча
- 3. Зниження артеріального тиску
- D. Бронхоспазм
- E. Дисбактеріоз

Тест № 279 Новонародженому Д. з метою фармакотерапії токсикоінфекції системи травлення призначено левоміцетин. Які ефекти можуть бути спричинені його призначенням?

- А. Порушення розвитку зубів та кісткової тканини
- В. Циркуляторний колапс або «сірий синдром»
- С. Пригнічення дихання, сонливість
- Д. Порушення реологічних властивостей крові, гіпоглікемія з судомами
- Е. Підвищення артеріального тиску крові

Тест №280 Хворий 32 роки надійшов на лікування з діагнозом виразка 12-палої кишки. Лікар призначив у комплексній терапії омепразол. Яким лікарським засобом можна замінити препарат?

- А. Лансопразол
- В. Атропіну сульфат
- С. Метронідазол
- Д. Тетрациклін
- Е. Де-нол

Тест №281 Для лікування артеріальної гіпертензії лікар вважає за необхідне призначити хворому препарат із групи блокаторів кальцієвих каналів – похідне дигідропіридину II покоління. З наведених нижче лікарських засобів виберіть такий препарат.

- А. Кордарон
- В. Верапаміл
- С. Амлодіпін
- Д. Ділтiazем
- Е. Ніфедіпін

Тест № 282 Хвора П., 38 років, ревматоїдним поліартритом у комплексній терапії приймала диклофенак натрію по 0,1 г на добу. Оцінка ефективності використання нестероїдних протизапальних засобів відбувається за всіма наведеними нижче критеріями, крім:

- А. Лабораторні випробування
- В. Індекс набряклості ділянки суглоба
- С. Сила стиснення долоні
- Д. Виникнення агранулоцитозу
- Е. Функціональні тести, які оцінюють обсяг рухів у суглобі

Тест № 283 Хворому, 43 роки, у гострій фазі інфаркту міокарда було призначено у комплексній терапії гепарин внутрішньовенно по 10000 ОД кожні 4 години. Виберіть серед нижченаведених умов безпеки його використання.

- А. Відсутність гематурії
- В. Зменшення артеріального тиску
- З. Зменшення болю
- Д. Придушення свідомості
- Е. Виникнення блювоти

Тест №284 В аптеку звернувся хворий на гіпертонічну хворобу, якому лікар призначив каптоприл. Який механізм дії цього препарату? Блокада рецепторів ангіотензину III. Блокада бета-адренорецепторів

- С. Блокада альфа-адренорецепторів
- Д. Пригнічення активності ангіотензинперетворюючого ферменту
- Е. Діуретична дія

Тест № 285 Хвора на ревматоїдний поліартрит за призначенням лікаря приймала нестероїдний протизапальний препарат індометацин. Через деякий час його застосування у хворої виникло загострення супутнього захворювання, що змусило відмінити препарат. Яке супутнє захворювання могло призвести до відміни препарату?

- А. Цукровий діабет
- В. Ішемічна хвороба серця
- С. Виразкова хвороба
- Д. Гіпертонічна хвороба

Е. Бронхіальна астма

Тест №286. Хворому на шизофренію був призначений аміназин. Який із перелічених фармакодинамічних ефектів став основою його призначення даному хворому?

- А. Гіпотензивний
- В. Протиблювотний
- С. Гіпотермічний
- Д. Міорелаксуючий
- Е. Антипсихотичний

Тест №287 У хворої на гіпертонічну хворобу II ст. після тривалого застосування пропранололу, ніфедипіну та дихлотіазиду з'явилися судом у м'язах нижніх кінцівок, порушення серцевого ритму. Яким препаратом міг бути заподіяний цей стан?

- А. Пропранололом
- В. Дихлотіазидом
- С. Дихлотіазидом та пропранололом
- Д. Пропранололом та ніфедипіном
- Е. Не пов'язано з прийомом цих препаратів

Тест №288 Хворий на гіпертонічну хворобу тривалий час приймав антигіпертензивний препарат, який раптово припинив застосовувати. Після цього стан хворого погіршився, розвинувся гіпертензивний криз. До якої категорії належить ця побічна дія?

- А. Залежність
- В. Кумуляція
- С. Толерантність
- Д. Сенсibiliзація
- Е. Синдром скасування

Тест № 289 У хворого після усунення нападу бронхіальної астми ізадрином розвинулася тахікардія, аритмія. Проконсультуйте лікаря-інтерну який механізм є основою розвитку даного побічного ефекту?

- А. Стимуляція бета-2-адренорецепторів
- В. Блокада М-холінорецепторів
- С. Стимуляція бета-1-адренорецепторів
- Д. Стимуляція альфа-1-адренорецепторів
- Е. Блокада Н-холінорецепторів

Тест № 290 Хворому, який страждає на атеросклероз судин головного мозку, був призначений препарат, що відноситься до групи блокаторів кальцієвих каналів. Назвіть цей препарат.

- А. Пірацетам
- В. Кавінтон
- С. Пентоксифілін
- Д. Циннарізін
- Е. Ксантинола нікотинат

Тест №291. Вагітній жінці із залізодефіцитною анемією слід рекомендувати:

- А. Приймати пероральні препарати заліза до пологів та весь період годування груддю
- В. Приймати пероральні препарати заліза протягом 1-2 тижнів до пологів
- З. Перелити перед пологами еритроцитарну масу
- Д. Зробити 5 внутрішньовенних ін'єкцій препаратів заліза
- Е. Обмежитися включенням до дієти продуктів, що містять залізо

Тест № 292 Всмоктування лікарських речовин при нанесенні на шкірні покриви у дитини першого року життя: Нижче, ніж у дорослого

- В. Не відрізняється від підлітків до 17 років
- С. Не відрізняється від дорослого
- Д. Вище, ніж у дорослого

Е. Не має відмінностей від дітей перших 10 років життя

Тест № 293 Хворий із загостренням хронічного бронхіту приймає лазолван (амброксолу гідрохлорид), калію йодид, аскорутин, теофілін, бісептол. Через 8 днів у нього з'явився угреподібний шкірний висип, гострий риніт і хворобливе набрякання слинних залоз. Проконсультуйте лікаря, який із препаратів міг викликати вказані явища:

- А. Теофілін
- В. Амброксолу гідрохлорид
- С. Бісептол
- Д. Аскорутин
- Е. Калію йодид

Тест № 294 Ви - фармацевт аптеки, розташованої в жіночій консультації. Дайте відповідь на запитання лікаря-інтерну, який із наявних антимікробних препаратів можна призначати вагітною?

- А. Окситетрациклін
- В. Ко-тримоксазол
- С. Доксициклін
- Д. Ампіцилін
- Е. Гентаміцин

Тест №295 У хворого Н., 30 років, розвинувся гострий пієлонефрит. Який із наведених препаратів має нефротоксичну дію? Роваміцин

- В. Еритроміцин
- С. Ампіцилін
- Д. Гентаміцин
- Е. Пеніцилін

Тест №296. Хвора М., 33 роки, страждає на ревматоїдний поліартрит, в анамнезі виразкова хвороба 12-палої кишки. Який протизапальний нестероїдний препарат можна порекомендувати хворий?

- А. Індометацин
- В. Диклофенак натрію
- С. Піроксикам
- Д. Напроксен
- Е. Німесулід

Хворий на гіпертонічну хворобу тривалий час приймав антигіпертензивний препарат, який раптово припинив застосовувати. Після цього стан хворого погіршився, розвинувся гіпертензивний криз. До якої категорії належить ця побічна дія?

- А. Залежність
- В. Кумуляція
- С. Толерантність
- Д. Сенсibiliзація
- Е. Синдром скасування

Тест № 289 У хворого після усунення нападу бронхіальної астми ізадрином розвинулася тахікардія, аритмія. Проконсультуйте лікаря-інтерну який механізм є основою розвитку даного побічного ефекту?

- А. Стимуляція бета-2-адренорецепторів
- В. Блокада М-холіноорецепторів
- С. Стимуляція бета-1-адренорецепторів
- Д. Стимуляція альфа-1-адренорецепторів
- Е. Блокада Н-холіноорецепторів

Тест № 290 Хворому, який страждає на атеросклероз судин головного мозку, був призначений препарат, що відноситься до групи блокаторів кальцієвих каналів. Назвіть цей препарат.

- А. Пірацетам

- В. Кавінтон
- С. Пентоксифілін
- Д. Циннарізін

Е. Ксантинола нікотинат Тест №291. Вагітній жінці із залізодефіцитною анемією слід рекомендувати:

- А. Приймати пероральні препарати заліза до пологів та весь період годування груддю
- В. Приймати пероральні препарати заліза протягом 1-2 тижнів до пологів
- З. Перелити перед пологами еритроцитарну масу
- Д. Зробити 5 внутрішньовенних ін'єкцій препаратів заліза
- Е. Обмежитися включенням до дієти продуктів, що містять залізо

Тест № 292 Всмоктування лікарських речовин при нанесенні на шкірні покриви у дитини першого року життя: Нижче, ніж у дорослого

- В. Не відрізняється від підлітків до 17 років
- С. Не відрізняється від дорослого
- Д. Вище, ніж у дорослого
- Е. Не має відмінностей від дітей перших 10 років життя

Тест № 293 Хворий із загостренням хронічного бронхіту приймає лазолван (амброксолу гідрохлорид), калію йодид, аскорутин, теофілін, бісептол. Через 8 днів у нього з'явився угреподібний шкірний висип, гострий риніт і хворобливе набрякання слинних залоз. Проконсультуйте лікаря, який із препаратів міг викликати вказані явища:

- А. Теофілін
- В. Амброксолу гідрохлорид
- С. Бісептол
- Д. Аскорутин
- Е. Калію йодид

Тест № 294 Ви - фармацевт аптеки, розташованої в жіночій консультації. Дайте відповідь на запитання лікаря-інтерну, який із наявних антимікробних препаратів можна призначати вагітній?

- А. Окситетрациклін
- В. Ко-тримоксазол
- С. Доксидиклін
- Д. Ампіцилін
- Є. Гентаміцин

Тест №295 У хворого Н., 30 років, розвинувся гострий пієлонефрит. Який із наведених препаратів має нефротоксичну дію? Роваміцин

- В. Еритроміцин
- С. Ампіцилін
- Д. Гентаміцин
- Е. Пеніцилін

Тест №296. Хвора М., 33 роки, страждає на ревматоїдний поліартрит, в анамнезі виразкова хвороба 12-палої кишки. Який протизапальний нестероїдний препарат можна порекомендувати хворій?

- А. Індометацин
- В. Диклофенак натрію
- С. Піроксикам
- Д. Напроксен
- Є. Німесулід

Тест № 312 Запори – побічна дія, розвиток якої нерідко спостерігається при курсовому лікуванні антигіпертензивними препаратами із групи:

- А. Блокаторів ангіотензивних рецепторів
- В. Діуретиків

С. Інгібіторів АПФ

Д. Альфа-адреноблокатори

Є. Блокаторів кальцієвих каналів

Тест № 313 Хворому І., 56 років, для лікування гіпертонічної хвороби призначені інгібітор АПФ та калійзберігаючий діуретик. Така комбінація:

А. Раціональна, оскільки потенціюється гіпотензивна дія ІАПФ

В. Раціональна, оскільки зменшується ризик розвитку гіпокаліємії

С. Нераціональна, оскільки збільшується ризик розвитку гіперкаліємії

Д. Нераціональна, оскільки знижується гіпотензивна дія ІАПФ

Е. Нераціональна, оскільки збільшується ризик розвитку ортостатичного колапсу

Тест № 314 «Сірий синдром» новонароджених (падіння температури нижче за норму, ацидоз, дихальні розлади, сіре забарвлення шкіри, колапс) розвивається при застосуванні:

А. Левоміцетину

В. Тетрацикліну

С. Гентаміцина

Д. Ципрофлоксацину

Е. Ерітроміцину

Тест № 315 Для профілактики остеопорозу жінкам після 40 років слід рекомендувати полівітамінні препарати з підвищеним вмістом:

А. Заліза

В. Калія

С. Магнію

Д. Кальція

Є. Цинка

Тест №316. При лікуванні гіпертонічної хвороби діуретиками препарати калію не призначають у поєднанні з:

А. Етакриновою кислотою

В. Клопамідом

С. Дихлотіазидом

Д. Фуросемідом

Е. Тріамтереном

Тест № 317 Назвіть колезі-фармацевту препарат, що відноситься до групи низькомолекулярних гепаринів:

А. Фраксіпарін

В. Сінкумар

С. Фенілін

Д. Гепарін

Е.. Амінокапронова кислотаТест№318Яким інгаляційним препаратом із групи бета2-адреноміметиків можна замінити відсутній в аптеці Фенотерол (беротек) в інгаляціях?

А. Ефедрін

В. Сальбутамолом

С. Ізадріном

Д. Еуфіліном

Е. Метацином

Тест № 319 Який із названих антибіотиків найчастіше викликає ураження печінки?

А. Роваміцин

В. Цефазолін

С. Еритроміцин

Д. ТетрациклінЕ. Феноксиметилпеніцилін

Тест № 320 Хворому, який страждає на хронічну постгеморагічну анемію внаслідок загострення виразкової хвороби, призначено комплексне лікування: реланіум, но-шпа,

гастроцепін, тардиферон. За кілька днів з'явилися певні скарги. Яка з них могла бути пов'язана із тардифероном?

- A. Сухість ротової порожнини
- B. С Темний кал
- D. Порушення акомодції
- E. М'язова слабкість

Тест №321 Проконсультуйте лікаря-психіатра, який побічний ефект не характерний для аміназину?

- A. Екстрапірамідні розлади
- B. Зниження АТ
- C. Підвищення артеріального тиску
- D. Контактний дерматит
- E. Порушення функції печінки, холестази

Тест № 322 Хворому було поставлено діагноз туберкульоз. Який препарат є ефективним засобом лікування цього захворювання?

- A. Ампіцилін
- B. Тетрациклін
- C. Гентаміцин
- D. Левоміцетин
- E. Ріфампіцин

Тест № 323 Хворому, який страждає на гіперацидний гастрит, терапевт призначив препарат вісмуту. Назвіть препарат. Ціанокобаламін

- B. Альмагель
- C. Апоморфіну гідрохлорид
- D. Де-нол
- E. Діхлотіазид

Тест № 324 Хвора, яка страждає на гіпертонічну хворобу, звернулася до лікаря зі скаргою на сухий кашель, що з'явився на тлі лікування гіпотензивним засобом. Який гіпотензивний препарат вона приймала?

- A. Діхлотіазид
- B. Атенолол
- C. Фуросемід
- D. Еналаприл
- E. Ніфедипін

Тест № 325 Для ерадикації *Helicobacter pylori* до комбінованої терапії хронічного гастриту доцільно включити:

- A. Альмагель
- B. Фуросемід
- C. Цефтріаксон
- D. Кларитроміцин
- E. Гастроцепін

Тест № 326 Який із протигрибкових антибіотиків є ефективним при лікуванні генералізованих мікозів?

- A. Леворін
- B. Ністатин
- C. Амфотерицин В
- D. Гризеофульвін
- E. Пімафуцин

Тест № 327 Хворому, який страждає на виразкову хворобу шлунка, був призначений противиразковий препарат, що має здатність одночасно знижувати секрецію соляної кислоти і пригнічувати мікроорганізм *Helicobacter pylori*. Назвіть цей препарат:

- А. Фамотидін
- В. Гастроцепін
- С. Маалокс
- Д. Омепразол
- Е. Альмагель

Тест № 328 Хворому, який страждає на захворювання кровотворної системи, призначений препарат, що містить залізо (ферроплекс). Назвіть показання для застосування цього лікарського засобу. А гранулоцитоз

- В. Гіперхромна анемія
- С. Гіпохромна анемія
- Д. Лейкоз
- Е. Лейкопенія

Відповідайте на питання фармацевта-інтерну: який проносний препарат підвищує тонус матки? Гліцерин

- В. Соняшникова олія
- С. Касторова олія
- Д. Оливкова олія
- Е. Вазелінове масло

Тест №330 В аптеку звернувся хворий з виразковою хворобою шлунка, якому лікар призначив ранітидин. Вкажіть механізм дії цього препарату?

- А Блокада М-холінорецепторів
- В Пригнічення активності Н+К+АТФ-ази
- С Блокада Н1-гістамінових рецепторів
- Д Блокада Н2-гістамінових рецепторів
- Е. Блокада Н-холінорецепторів симпатичних гангліїв

Тест №331. Який із наведених антисептиків необхідно видати з аптеки медичній сестрі, яка працює в акушерському відділенні, для профілактики бленорії новонароджених?

- А. Перекис водню
- В. Хлорамін Б
- С. Срібла нітрат
- Д. Фурацилін
- Е. Калію перманганат

Тест № 332 У хворого після операції виникла атонія кишківника. Проконсультуйте лікаря, який препарат слід призначити.

- А. Лобелії
- В. Атропін
- С. Прозерин
- Д. Армін
- Е. Платіфілін

Тест № 333 Хворому, який страждає на депресію, лікар призначив препарат з групи трициклічних антидепресантів. Назвіть препарат.

- А. Амітріптілін
- В. Аміналон
- С. Дроперідол
- Д. Феназепам
- Е. Кофеїн

Тест № 334 Ви фармацевт-інформатор. З препаратів, які одержала центральна районна аптека, виберіть противірусний засіб для профілактики та лікування грипу.

- А. Ацикловір
- В. Ідоксурідін
- С. Ремантадін

D. Азідотимедін

Є. Сульфален

Тест № 335 Хворому, 43 роки, у гострій фазі інфаркту міокарда було призначено в комплексній терапії гепарин внутрішньовенно по 10000 ОД кожні 4 години. Виберіть серед нижченаведених умов безпеки його використання.

A. Зменшення артеріального тиску

B. Виникнення блювоти

C. Відсутність гематурії

D. Придушення свідомості

E. Зменшення болю

Тест №336. Після тривалого прийому дигітоксину у хворого розвинулася аритмія, з'явилися розлади з боку шлунково-кишкового тракту та нервово-психічні порушення. Що стало причиною погіршення стану хворого?

A. Ідіосинкразія

B. Кумуляція

C. Звикання

D. Тахіфілаксія

E. Сенситивізація

Тест №337 У хворого, 30 років, розвинувся гострий пієлонефрит. Який із наведених препаратів має нефротоксичну дію?

A. Пеніцилін

B. Роваміцин

C. Ампіцилін

D. Еритроміцин

е. Гентаміцин

Тест № 338 Хворому, який страждає на виразкову хворобу шлунка, призначили омепразол. Який механізм дії цього препарату?

A. Блокада гістамінових H₂-рецепторів

B. Стимуляція утворення слизу

3. Пригнічення H⁺K⁺-АТФ-ази

D. Нейтралізація НСІЕ. Блокада М-холінорецепторів

Тест № 339 Хворому, який страждає на атеросклероз судин головного мозку, був призначений препарат, що відноситься до групи блокаторів кальцієвих каналів. Назвіть цей препарат.

A. Кавінтон

B. Пірацетам

C. Пентоксифілін

D. Ксантинолу нікотинат

е. Циннарізін

Тест № 340 Підготуйте аптечку протиотруту для приймального відділення лікарні. Який засіб необхідно увімкнути для підвищення артеріального тиску?

A. Нашатирний спирт

B. Активоване вугілля

C. Унітіол

D. Фуросемід

е. Мезатон

Тест № 341. До Вас, фармацевту лікарняної аптеки, звернувся лікар із проханням порекомендувати місцевий анестетик для проведення інфільтраційної анестезії пацієнту з порушенням серцевого ритму. Який препарат ви оберете?

A. Ультракаїн

B. Новокаїн

- З. Анестезин
Д. Лідокаїн
е. Кокаїн

Тест № 342 При проведенні комплексного лікування гіпертонічної хвороби використовують сечогінні засоби. Порадьте лікарю-інтерну який із наведених нижче препаратів не викликає гіпокаліємію?

- А. Кислота етакринова
В. Маннітол
З. Фуросемід
Д. Спіронолактон
Е. Дихлотіазид

Поясніть хворому, у чому полягає небезпека застосування при підвищеній кислотності шлункового соку такого антацидного засобу як натрію гідрокарбонат.

- А. Виявляє значний латентний період
В. Виникає толерантність
С. Викликає повторне підвищення кислотності
Д. Виявляє низьку активність
Е. Виявляє тенденцію до накопичення

Тест № 344 У хворого із серцевою недостатністю після тривалого прийому дигоксину виникло порушення серцевого ритму. Який препарат доцільно призначити як антидоту?

- А. Гідрокарбонат натрію
В. Активоване вугілля
З. Унітіол
Д. Преднізолон

е. Анапрілін
Тест № 345 Хвора 62 років із зниженою екскреторною функцією підшлункової залози тривалий час приймає панкреатин. В зв'язку з відсутністю препарату в аптеці вона звернулася до фармацевта з проханням порекомендувати лікарський засіб з подібними властивостями. Яку заміну можна запропонувати хворій? А. Карсил В. Контрикал С. Холосас Д. Креон

- Е. Ацидин-пепсин

Тест № 346 У пацієнта 46 років із загостренням ревматоїдного артрити, який лікувався нестероїдним протизапальним засобом, виявлено лейкопенію. Який лікарський засіб міг викликати даний ефект із найбільшою вірогідністю? А. Ібупрофен В. Бутадіон С. Мелоксикам Д. Целекоксиб Е. Диклофенак натрію

Тест № 347 До лікаря звернулась вагітна (термін 10 тижнів) із гіпертонічною хворобою. Який засіб найбільш безпечний в даній ситуації? А. Пропранолол В. Каптоприл С. Лозартан Д. Гідралазин Е. Метилдопа

Тест № 348 У хворого з артеріальною гіпертензією та хронічним бронхітом раптово виник сухий кашель, задишка, температура тіла не змінилась. Відомо, що хворий приймає каптоприл. Поясніть цей феномен при прийомі препарату: А. Збільшене утворення ангіотензину I В. Збільшене утворення реніну С. Збільшене утворення брадикініну Д. Зменшене утворення альдостерону Е. Збільшення утворення Na-уретичного пептиду

Тест № 349 При приступі бронхіальної астми можуть бути ефективними всі препарати, за винятком: А. Кетотифену В. Адреналіну гідрохлориду С. Ізадрину Д. Беротеку Е. Еуфіліну

Тест № 350 Виберіть не характерний симптом для гіпертензивного кризу. А. Нудота В. Болоче сечовиділення

С. Блювання Д. Миготіння мушок перед очима Е. Біль голови
Тест № 351

В аптеку з метою придбання жарознижувального засобу звернулася молода жінка. Фармацевт побачив на обличчі почервоніння у вигляді метелика. Про яка захворювання

можна думати? А. Системний червоний вовчак В. Ревматизм С. Подагру D.

Ревматоїдний артрит Е. Остеопороз

Тест №352 Про яка захворювання можна думати, якщо у хворого сеча нагадує колір “м’ясних” помий? А. Гострий пієлонефрит В. Уретрит С. Гепатит D. Гострий гломерулонефрит Е. Цистит

Тест №353 В аптеку звернулася молода жінка з приводу мігрені. Який препарат Ви порекомендуєте для переривання приступу? А. Пірацетам В. Амітриптілін С.

Фуросемід D. Суматриптан Е. Феназепам

Тест №354 Хворий В., страждає ішемічною хворобою серця, хронічною серцевою недостатністю, періодично отримує сечогінні засоби та серцеві глікозиди. При черговому зверненні до лікаря скаржиться на м’язеву слабкість, сонливість, на ЕКГ – високі рівностегневі зубці Т. Яка побічна дія могла викликати така комбінація препаратів? А.

Гіперкаліємія В. Гіпокаліємія С. Гіпонатріємія D. Гіпернатріємія Е.
Гіпокальціємія

Тест №355 Вагітна жінка (ІІІ триместр), яка захворіла грипом протягом 3 діб з метою зменшення температури приймала ацетилсаліцилову кислоту по 0,5 двічі на день. Яку побічну дію може спричинити ацетилсаліцилова кислота на плід ? А. Порухення білкового обміну В. Ембріотоксичну С. Порухення вуглеводного обміну D.

Порухення жирового обміну Е. Тератогенну

Тест №356 Об’ясните врачу скорой помощи почему снижается антикоагулянтный эффект синкумара при одновременном его применении с фенобарбиталом? А. Фенобарбитал ингибирует микросомальные ферменты печени В. Развивается аллергия к синкумару С.

Фенобарбитал активирует микросомальные ферменты печени D. Проявляется антагонизм этих препаратов Е. Происходит взаимная инактивация Тест №357 До Вас в аптеку звернулася жінка з дитиною 5 років, яка випила флакон очних капель. Через 30 хв. після цього у неї виникли задишка, утруднене ковтання, хрипота, розширення зіниць, гіпертермія. Який із препаратів міг спричинити описані прояви? А. Адреналін В.

Мезатон С. Пілокарпін D. Атропін Е. Новокаїн

Тест №358 У хворого С., 64 років, який страждає на ІХС, атеросклеротичний кардіосклероз, гіпертонічну хворобу ІІ ст, розвинувся астено-депресивний синдром. Який із призначених йому антигіпертензивних засобів міг цьому сприяти? А. Клонідин В. Фуросемід С.

Спіронолактон D. Окспренолол Е. Усі вказані засоби

Тест №359 До Вас в аптеку звернувся хворий на виразкову хворобу шлунку з помірними клінічними проявами. З анамнезу відомо, що в нього виявлено *Helicobacter pylori*. Яка група ЛЗ має бути основою лікування? А. Антациди В. Антисекреторні ЛЗ С.

Коректори моторної функції D. Антимікробні ЛЗ Е. Седативні ЛЗ

Тест №360 Хворому в ділянці хірургічного розтину тканин ввели 0,25% розчин новокаїну. Зненацька пацієнт покритися червоними плямами, виникли інтенсивне потовиділення, тахікардія, набряк слизової носа, бронхоспазм. Яка причина цього ускладнення ? А.

Алергічна реакція негайного типу В. Алергічна реакція сповільненого типу С.

Місцевоподразнююча дія D. Тахіфілаксія Е. Синдром відміни

Тест №361 У хворого Н., 15 років, вперше виявлено цукровий діабет І типу. Який цукрознижуючий засіб необхідно призначити: А. Метформін В. Діабетон С.

Глюренорм D. Глібенкламід Е. Інсулін

Тест № 362 Препаратом вибору для терапії гострого пієлонефриту у вагітної жінки в І триместрі є: норфлоксацин

В. бісептол

С. гентаміцин

Д. амоксицилін

Е. хлорамфенікол

Тест № 36 У хворого В. після антибіотикотерапії з’явилися ознаки дискомфорту з боку шлунково-кишкового тракту (здуття живота, послаблення випорожнень, бурчання,

болючість при пальпації живота). Який найбільш раціональний препарат необхідно рекомендувати цьому хворому? А. активоване вугілля

В. еспумізан

З. мезим

Д. дротаверину гідрохлорид

Е. лінекс

Тест № 364 Хворому В., 65 років з ознаками передозування серцевими глікозидами показані всі перелічені заходи, крім:

А. Введення препаратів кальцію

В. введення препаратів калію

С. Скасування серцевих глікозидів

Д. введення унітіолу

Е. призначення антиаритмічних препаратів

Тест №365 У вагітної жінки Р., 38 років з цукровим діабетом II типу (інсуліннезалежним) препаратом вибору є: А. глібенкламід

В. інсулін

С. метформін

Д. толбутамід

Е. буформін

Тест № 366 Який проносний препарат із перерахованих протипоказаний хворому зі спастичними запорами? А. Гутталакс

В. лактулоза

З. сеннаде

Д. форлакс

Е. рицинова олія

Тест № 367 До напрямів симптоматичного лікування хворих зі скаргами на біль у горлі є всі перераховані, крім: А. системне застосування антибіотиків

У. ст. полоскання горла в'язкими засобами

С. полоскання горла антисептичними засобами

Д. застосування антисептичних пастилок, льодяників

Е. застосування аерозолів з антисептиками, ефірними оліями

Тест №368 Який найбільш раціональний препарат можна порекомендувати для лікування риніту при ГРВІ для дитини віком 7 місяців? А. нафтизін

У. галазолін

С. Піносол

Д. 0,9% розчин кухонної солі у теплій воді

Е. Мазь "Бороментол"

Тест № 369 Який із зазначених антибактеріальних препаратів нераціонально призначити хворому К., 56 років з цукровим діабетом II типу, що отримує глібенкламід? А. мідекаміцин

В. гентаміцин

С. бензилпеніцилін

Д. доксициклін

Е. бісептол

Тест №370 Для лікування позалікарняної пневмонії хворому К., 59 років з хронічним гепатитом протипоказані всі препарати, крім: А. доксициклін

В. амоксицилін

С. лінкоміцин

Д. левоміцетин

Е. тетрациклін

Тест № 371 Яка із зазначених фармакологічних груп препаратів антигіпертензивної дії протипоказана для хворих на бронхіальну астму? інгібітори АПФ

- В. антагоністи кальцію
- С. блокатори ангіотензинових рецепторів
- Д. 4бета-адреноблокатори
- Е. діуретики

Тест № 372 Прийом якого препарату може викликати розвиток запору у хворого С., який отримує комбіновану терапію артеріальної гіпертензії: верапаміл

- В. фуросемід
- С. триметазидин
- Д. панангін

Е. ацетилсаліцилова кислота в малих дозах

Тест № 373 Який препарат можна порекомендувати для симптоматичного лікування м'язового болю у дитини 5 років? ацетилсаліцилова кислота

- В. диклофенак натрію
- С. індометацин
- Д. целекоксиб
- Е. парацетамол

Тест № 374 До аптеки звернулася хвора жінка 50 років, у якій після прийому верапамілу в дозі 80 мг 4 рази на день з'являється почуття жару, почервоніння обличчя, занепокоєння. Як Ви розціните ці явища? Передозування препарату

- В. Прояв лікарської алергії
- С. Побічна дія препарату, потребує негайної відміни
- Д. Побічна дія препарату, яка не потребує корекції
- Е. Психологічна реакція хворого на прийом препарату

Тест № 375 Хворому К., 45 років, з діагнозом ревматоїдний артрит та пептична виразка шлунка, необхідно призначити НПЗП. Який препарат є найбільш доцільним? Діклофенак натрію

- В. Целекоксиб
- С. Ацетилсаліцилова кислота
- Д. Індометацин
- Е. Піроксикам

Тест № 376 Проконсультуйте лікаря-інтерна, які антигіпертензивні препарати слід з обережністю застосовувати при поєднанні бронхіальної астми і артеріальної гіпертензії?

- А. Каптоприл
- В. Амлодипин
- С. Фуросемід
- Д. Пропранолол
- Е. Лозартан

Тест № 377 Хворому К., 45 років, встановлено діагноз гіпертонічна хвороба II стадії, АТ 165/95, пульс 52 удари в хвилину. Який з наявних препаратів не доцільно призначати для зниження АТ даному хворому. Еналаприл

- В. Лозартан
- С. Ніфедипин
- Д. Фуросемід

Е. Метопролол Тест № 378 Хвора С., 36 років, з діагнозом хламідійний вагініт в комплексній терапії було призначено антибактеріальний препарат. Який з наявних є найбільш доцільний?

- А. Азітроміцин
- В. Ампіцилін
- С. Цефуроксим
- Д. Амоксицилін
- Е. Гентаміцин

Тест №379 У хворого на артеріальну гіпертензію при обстеженні виявлено ІХС, стенокардію напруги II ФК, надшлуночкова екстрасистолія. Виберіть найбільш оптимальний засіб для лікування: Ніфедипін

- В. Нітросорбід
- С. Еналаприл
- Д. Метопролол
- Е. Фуросемід

Тест №380 До фармацевта звернувся пацієнт, якому рекомендовано прийом ацетилсаліцилової кислоти в якості антиагреганта. Яку добову дозу слід рекомендувати для постійного прийому? 0,1—0,3 г

- В. 0,5-1,0 г
- С. 1,0-2,0 г
- Д. 2,0-3,0 г
- Е. Більше 4,0 г

Тест №381 Хворий, 56 років з артеріальною гіпертензією та подагрою. Яких груп лікарських засобів слід уникати при проведенні корекції артеріальної гіпертензії? Блокаторів

кальцієвих каналів

- В. Інгібіторів АПФ
- С. Тіазидних діуретиків
- Д. Блокаторів ангіотензинових рецепторів
- Е. Бета-адреноблокаторів

Тест №382 Жінка 50 років, із симптоматичною гіпертензією та супутнім хронічним обструктивним захворюванням легенів. Приймання якої групи лікарських засобів у хворої буде обмежено? Блокаторів кальцієвих каналів

- В. Інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту
- С. Блокаторів ангіотензинових рецепторів
- Д. Діуретиків
- Е. Бета-адреноблокаторів

Тест №383 У пацієнтки 40 років, яка з приводу позашпитальної пневмонії приймала ампіцилін протягом 10 днів, виникли загальна слабкість, здуття живота, періодичні проноси, які змінюються закрепамі. Який з наведених засобів слід рекомендувати для нормалізації даного стану? Церукал

- В. Лінекс
- С. Лоперамід
- Д. Гуталакс
- Е. Де-нол

А. Тест № 384 При фармакотерапії алергічних захворювань не застосовується наступна група лікарських препаратів: Антигістамінні препарати

- В. В. Стабілізатори мембран опасистих клітин
- С. С. Глюкокортикостероїди
- Д. Д. Бета-адреноблокатори
- Е. Е. Адреноміметики

Ф. Тест № 385 Який середній термін проведення ерадикаційної терапії інфекції *Helicobacter pylori* при виразці пептичної шлунка і дванадцятипалої кишки?

- Г. А. 7-10 днів
- Н. В. 1-2 дні
- І. С. 3-5 днів
- Ж. Д. 11-14 днів
- К. Е. 15-20 днів
- Л.

М. Тест № 386 Хворому К., з діагнозом: жовчнокам'яна хвороба, для розчинення холестеринових жовчних каменів показано застосування препарату:

- N. А. гамма-аміномасляна кислота
 О. В. ацетисаліцилова кислота
 Р. С. лимонна кислота
 Q. D. урсодезоксихолієва кислота
 R. Е. мефенамова кислота
 S. Тест № 387 З чого найбільш доцільно розпочинати лікування хворого, у якого вперше розвинувся напад бронхіальної астми?
 Т. А. Інгаляції глюкокортикостероїду
 U. В. Адреноміметики парентерально
 V. С. М-холінолітики
 W. D. H₂-гістаміноблокатори
 X. Е. Інгаляції бета₂-адреноміметика
 Y. Тест № 388 З якою метою хворому, який страждає на бронхіальну астму, призначається інтал (кромолін-натрій):
 Z. А. Для усунення астматичного статусу
 AA. В. Для усунення нападу бронхіальної астми
 BB. С. Для запобігання розвитку нападу бронхіальної астми
 CC. D. Для покращення відходження мокротиння
 DD. Е. Для придушення кашлю
 EE. Тест № 389 Який суглоб найчастіше уражається при подагрі? А. Плечовий суглоб
 FF. В. Перший плюснефаланговий суглоб
 GG. С. Ліктьовий суглоб
 HH. D. Дистальні міжфалангові суглоби
 II. Е. Тазостегновий та колінний
 JJ. Тест № 390 Непрямою ознакою алергічного характеру захворювання є наступний показник загального аналізу крові:
 KK. А. Еозинофілія
 LL. В. Лейкоцитоз
 MM. С. Анемія
 NN. D. Тромбоцитопенія
 OO. Е. Моноцитоз
 PP. Тест № 391 З наведених нижче виразкових засобів виберіть препарати, які входять до схем ерадикації *Helicobacter pylori*:
 QQ. А. Сукральфат
 RR. В. Мізопростол
 SS. С. Гастроцепін
 TT. D. Кларитроміцин
 UU. Е. Альмагель
 VV. Тест № 392 Для лікування пацієнта з виразкою шлунка показано застосування препарату з гастроцитопротекторною активністю. Виберіть цей препарат:
 WW. А. Альмагель
 XX. В. Сукральфат
 YY. С. Ранітідін
 ZZ. D. Метоклопрамід
 AAA. Е. Дротаверину гідрохлорид
 BBB. Тест № 393 Хворому П., 56 років з діагнозом хронічний гастрит типу А показана патогенетична терапія:
 CCC. А. Антибактеріальна терапія, спрямована проти хелікобактер пілорі та купірування запалення
 DDD. В. Застосування засобів, що знижують кислотність, інгібіторів ферментів
 EEE. С. Повна замісна терапія (вітаміни, соляна кислота, ферменти)
 FFF. D. Антиоксидантна терапія

- GGG. Е. Протизапальна терапія
- HHH. Тест № 394 Вкажіть больовий синдром, найбільш характерний для виразки 12-палої кишки: Ранні” болі в епігастрії
- III. В. Оперезують болі
- JJJ. С. Болі у правому підребер’ї
- KKK. D. Болі у лівому підребер’ї
- LLL. Е. "Голодні" болі в епігастрії
- MMM. Тест № 395 Який препарат вибору при лікуванні хворих з артеріальною гіпертензією та аденомою передміхурової залози? А. Доксазозін
- NNN. В. Еналаприл
- OOO. С. Каптоприл
- PPP. D. Верошпірон
- QQQ. Е. Верапаміл
- RRR. Тест № 396 Хворому з гіпертонічним кризом було введено гангліоблокатор – бензогексоній. Прояви якого побічного ефекту слід побоюватись після введення препарату?
- SSS. А. Синдрому скасування
- TTT. В. Гнітуючої дії на центральну нервову систему
- UUU. С. Порушення смакових відчуттів
- VVV. D. Діареї
- WWW. Е. Ортостатична гіпотензія
- Тест № 397 Хворому 62 років здійснюється фармакотерапія ІХС, стенокардія напруги ІІІ ф. кл.: бісопролол, нітросорбід, аспекард, тіотріазолін, АТФ-лонг. Під час лікування хворий поскаржився на нестерпний біль голови. Назвіть лікарський засіб, який наймовірніше спричинив ускладнення. Бісопролол
- В. Нітросорбід
- С. Аспекард
- D. Тіотріазолін
- Е. АТФ-лонг
- Тест № 398 Хвора Н., 68 років, тривалий час застосовує фуросемід для лікування серцевої недостатності. Зазначте лікарський засіб для профілактики гіпокаліємії при прийомі фуросемида: Оротат калію
- В. Мілдронат
- С. Панангін
- D. Триметазидин
- Е. Сустанг-форте
- Тест № 399 Під час відпуску в аптеці антибактеріальних препаратів для лікування позагоспітальної пневмонії, дайте додаткові рекомендації хворому з приводу профілактики у нього можливого кишкового дисбактеріозу. Лінекс
- В. Тавегіл
- С. Амброксол
- D. Карсил
- Е. Ко-тримоксазол
- Тест № 400 Хвора 52 років страждає підвищенням артеріального тиску протягом місяця. З анамнезу відомо, що останні 5 років хворіє бронхіальною астмою. Яка група гіпотензивних препаратів небажана для хворої? Антагоністи іонів кальцію
- В. Транквілізатори
- С. Антагоністи ангіотензинових рецепторів
- D. Блокатори бета-адренорецепторів
- Е. Діуретики
- Тест № 401 Відповідаючи на запитання лікаря-хірурга про можливість тривалого консервативного лікування та розсмоктування холестеринових каменів в жовчному міхурі, зазначте рекомендований лікарський засіб: Хофітол

- В. Урсодеоксихолієва кислота
- С. Алохол
- Д. Ліобіл
- Е. Легалон

Тест №402 Хворий Ш., 74 років, тривалий час застосовує для лікування серцевої недостатності дігосин. З'явилися скарги на нудоту, блювоту, пронос, погіршення зору. Лікар подумав про можливу інтоксикацію препаратом. Який антидот Ви порекомендуєте для призначення? Кальція хлорид

- В. Протаміну сульфат
- С. Прозерін
- Д. Атропіна сульфат

Е. Унітіол Тест №403 Хворому 58 років з ІХС призначили антиагрегант для комбінованої фармакотерапії. Проте стан хворого погіршився: почастишали напади стенокардії, з'явилась негативна динаміка ЕКГ. Був зроблений висновок, що препарат викликав синдром "обкрадання". Який лікарський засіб отримував хворий? Аспекард

- В. Діпірідамол
- С. Тиклід
- Д. Ацетилсаліцилова кислота
- Е. Плавікс

Тест №404 Хворому З., 46 років, з підвищеним рівнем холестерину, тригліцеридів, бета-ліпопротеїдів призначено аторвастатин по 10 мг на добу. Хворий звернувся до фармацевта з проханням дати пояснення про час прийому препарату. Ваші рекомендації: Вранці

- натщесерце
- В. Вранці після сніданку
- С. Під час обіду
- Д. Під час вечері
- Е. На ніч

Тест №405 При здійсненні фармацевтичної опіки хворих кардіологічного стаціонару зазначте, які антиангінальні лікарські засоби протипоказані при наявності ішемічної хвороби серця і глаукоми? Нітрати

- В. Антагоністи іонів кальцію
- С. Бета-адреноблокатори
- Д. Антиагреганти
- Е. Антикоагулянти

Тест №406 При наданні допомоги хворій К., 49 років, з гострим калькульозним холециститом, зазначте холекінетик протипоказаний при даному стані: Алохол

- В. Холензим
- С. Сорбіт
- Д. Легалон

Е. Хофітол Тест №407 Хворий поступив у приймальне відділення в коматозному стані. Рівень цукру в крові 25 ммоль/л. Який лікарський засіб є препаратом вибору при наданні невідкладної допомоги? Хумулін ультраленте

- В. Інсулін
- С. 40 % розчин глюкози
- Д. Розчин Рінгера
- Е. 10 % розчин глюкози

Тест №408 У хворого 18 років діагностовано: дисемінований туберкульоз легень. Який лікарський засіб необхідний для етіотропної фармакотерапії? Бензилпеніциліну натрієва сіль

- В. Триметоприм
- С. Лінкоміцин

D. Метронідазол Ізоніазид

Тест №409 У хворого з дисемінованою формою туберкульозу легень, який три дні приймає рифампіцин по 0,15 г 3 рази на добу та ізоніазид по 0,2 г 2 рази на добу, з'явилась червона сеча. З чим пов'язано виникнення такого явища? Наслідок прийому ізоніазида

- B. Ускладнення туберкульозу
- C. Передозування ізоніазида
- D. Наслідок прийому рифампіцина
- E. Передозування рифампіцина

Тест №410 Хворому з гострою кишковою непрохідністю перед оперативним втручанням необхідно очистити кишківник. З цією метою призначено: Форлак

- B. Бісакодил
- C. Касторове масло
- D. Гуталакс
- E. Регулак

Тест №411 У хворої П., 67 р., яка лікується з приводу бронхіальної астми, виникли тремор кінцівок, біль голови, безсоння, екстрасистолія. Що могло стати причиною виникнення таких симптомів? Преднізолон

- B. Тавегіл
- C. Теофілін
- D. Інтал
- E. Ацетилцистеїн

Тест №412 Вагітна жінка (ІІІ триместр) захворіла ГРВЗ з підвищенням температури тіла до 39 С. Який ЛЗ Ви зможете їй запропонувати? Целекоксиб

- B. Індометацин
- C. Ацетилсаліцилова кислота
- D. Диклофенак
- E. Парацетамол

Тест №413 Хворий з гострим пієлонефритом скаржиться на інтенсивний біль в попереку; температура тіла 39 С, біль при сечовиділенні. Який ЛЗ необхідно призначити з метою етіотропного лікування? Диклофенак

- B. Фуросемід
- C. Цефалексин
- D. Реополіглюкін
- E. Парацетамол

Тест №414 Хвора М., 40 р. хворіє бронхіальною астмою 2 роки. Напади ядухи виникають 2-3 рази на місяць, переважно в нічний час, а також на фоні респіраторних інфекцій, після фізичних навантажень. Виберіть ЛЗ для базисної терапії. Флутиказон

- B. Еуфілін
- C. Оксазилін
- D. Іпратропію бромід
- E. Бромгексин

Тест №415 В аптеку звернулася жінка похилого віку з проханням відпустити їй лікарський засіб для зняття болю в суглобах, в анамнезі - пептична виразка шлунка. Який з наведених ЛЗ найбільш безпечний в даному випадку? Ацетилсаліцилова кислота

- B. Індометацин
- C. Диклофенак натрію
- D. Целекоксиб
- E. Піроксикам

Тест №416 Хворому з хронічною серцевою недостатністю та хронічною нирковою недостатністю призначено дигоксин. Через тиждень виникла брадикардія, екстрасистолія,

погіршення гостроти зору, порушення колірного сприймання. Як Ви трактуватимете зміни в клінічній картині? Ускладнення ХСН

- В. Ускладнення ХНН
- С. Дигіталісна інтоксикація
- Д. Артеріальна гіпотензія
- Е. Іпохондричний синдром

Тест №417 У хворого з ревматизмом, комбінованою мітральною вадю серця, який вживав диклофенак, дигоксин і фуросемід, розвинулись явища дигіталісної інтоксикації. В чому полягає невідкладна допомога? Преднізолон + гіпотіазид

- В. Унітіол + препарати калію
- С. Строфантин + інгібітори АПФ
- Д. Гангліоблокатори + препарати кальцію
- Е. Відміна дигоксину + атенолол

Тест № 418 Хворим на хронічний гломерулонефрит не показані наступні лікарські засоби:

- А Курантіл
- В Преднізолон
- С Гепарин
- Д Пеніцилін
- Е Фуросемід

Тест №419

Яку групу лікарських засобів слід використовувати для лікування хворих на хронічний гломерулонефрит з високою активністю процесу та резистентністю до глюкокортикоїдів? А

- Імунодепресанти
- В Нестероїдні протизапальні засоби
- С Бета-адреноблокатори
- Д Антибіотики
- Е Антиагреганти

Тест № 420 Що не вивчає фармакокінетика?

- А Виведення ліків
- В Всмоктування ліків
- С Зв'язок ліків із білком
- Д Розподіл ліків в організмі
- Е Зв'язок ліків з рецептором

Тест № 421 Бета-адреноблокатори не показані при:

- А Артеріальної гіпертензії
- В Гіпотиреозі
- С Стенокардія напруги
- Д Стенокардії спокою
- Е Порушення серцевого ритму

Тест № 422 Справедливі такі твердження про лікування артеріальної гіпертензії:

- А Метою лікування є стабілізація АТ нижче 140/90 мм рт ст.
- В. Метою лікування є стабілізація артеріального тиску на рівні 160/95 мм рт ст.
- С Особливо терміново треба знижувати АТ людям похилого віку
- Д Лікування не проводять при безсимптомному перебігу
- Е Проводять курсами, скасовуючи препарат при зниженні артеріального тиску

Тест № 423 Які інструментальні методи можуть використовуватися для оцінки ефективності нітратів у хворих зі стенокардією?

- А Рентгенографія серця
- В Ехокардіографія
- С Електрокардіографія у спокої

D * Велоергометрія

E Вимірювання АТ

Тест № 424 Для патогенетичної терапії хронічного гломерулонефриту використовуються всі засоби, крім:

A Гіпотензивних

B Глюкокортикоїдів

C Нестероїдних протизапальних засобів

D Цитостатиків

E Антимікробні

Тест № 425 Максимальний клінічний ефект від призначення інгаляційних глюкокортикоїдів хворим на бронхіальну астму зазвичай відзначається через:

A 3-4 тижні

B 1-2 години

C 1-2 дні

D 4-6 місяців

E 12 місяців

Тест № 426 Який препарат показаний для лікування астматичного статусу?

A Преднізолон

B Атропін

C Сальбутамол

D Інтал

E Фенотерол

Тест № 427 Хворий К., 50 років, скаржиться на біль, припухлість та обмеження рухів в суглобах пальців рук, ніг і колін, ранкову скутість до 12 год., підвищення температури тіла до 38 °С, загальне нездужання. Хворіє біля 5 років. При обстеженні відмічається деформація китиць рук („ласти моржа“) та колін. Визначте попередній діагноз. А Ревматизм В

Системна склеродермія С Системний червоний вовчак D Ревматоїдний артрит Е

Вузликовий периартерит

Тест № 428 Хворий Д., 35 років, 2 тижні після перенесеної ангіни відмітив колючий біль в серці, серцебиття, задишку, припухлість і біль колінних та ліктьових суглобів, підвищення температури тіла до 37,5 °С. При обстеженні у пацієнта виявлено ваду мітрального клапана, припухлість та обмеження рухів колінних і ліктьових суглобів. Визначте попередній діагноз.

A Системна склеродермія B Ревматизм C Системний червоний вовчак D

Ревматоїдний артрит E Вузликовий периартерит

Тест № 429 Хвора С., 40 років, скаржиться на дратівливість, приступи серцебиття, перебої в роботі серця, пітливість, втрату маси тіла, безсоння, тремор рук, вип'ячування очей, відчуття жару. При обстеженні шкіра волога, еластична, гіперемована. Дифузне збільшення щитовидної залози; тахікардія, аритмія, екзофтальм. Визначте попередній діагноз. А

Ревматизм B Гіпотиреоз C Кардіоневроз D Тиреотоксикоз (гіпертиреоз) E

Вузликовий периартерит

Тест № 430 Хвора Н., 26 років, скаржиться на постійну спрагу, сухість в роті, частий сечопуск, свербіння, підвищення апетиту, слабкість, головний біль, втрату маси тіла, часте утворення фурункулів. Визначте попередній діагноз.

A Тиреотоксикоз (гіпертиреоз) B Гіпотиреоз C Кардіоневроз D Цукровий діабет I типу

E Цукровий діабет II типу

Тест № 431 Хвора Н., 50 років, скаржиться на біль голови, головокружіння, чорні „мушки“ перед очима, нудоту. Шкіра обличчя гіперемована. При обстеженні: частота серцевих скорочень 85 уд/хв., АТ 210/120 мм рт. ст. Вкажіть попередній діагноз хворої. А

Менінгококова інфекція B Напад стенокардії C Геморагічний інсульт D

Інфаркт міокарда E Гіпертонічний криз

Тест №432 Хвора К., 70 років, поступила в клініку зі скаргами на серцебиття відчуття перебоїв в роботі серця, задишку при незначному фізичному навантаженні, набряки на нижніх кінцівках. При обстеженні: ціаноз слизових, в легенях з обидвох сторін вислуховуються вологі хрипи, робота серця неритмічна. ЧСС 85 уд/хв., АТ 140/90 мм рт.ст. Печінка виступає на 4 см з-під краю реберної дуги, гомілки набряклі. Вкажіть попередній діагноз.

А Серцева недостатність В Гіпотиреоз С Міокардит D Пневмонія E Ревматизм

Тест №433 У Хворої Н., 73 років, на фоні успішного лікування серцевої недостатності з'явилася нудота, біль в животі, жовті кола перед очима, перебої в роботі серця. На ЕКГ: ритм синусовий, неправильний, шлуночкова екстрасистолія, коритоподібна депресія ST. Яка група препаратів могла зумовити дані клінічні симптоми? А Антагоністи кальцієвих каналів В Діуретики С Бетаадреноблокатори D Серцеві глікозиди E Нітрати

Тест №434 Хворий, 52 роки, скаржиться на підвищення АТ, задишку, наявність набряків на нижніх кінцівках. Об-но: ЧД-24, ЧСС-80/хв, АТ-160/105 мм рт.ст., ознаки застійної серцевої недостатності - серце збільшене у розмірах, тони серця приглушені, печінка +2 см, виражені набряки нижніх кінцівок. Яка комбінація гіпотензивних засобів є найбільш оптимальною для даного пацієнта? А Еналаприл+фуросемід В Ніфедипін+фуросемід С

Дибазол+фуросемід D Пропранолол+фуросемід E Метилдопа+фуросемід
Тест №435 Чоловік 54 років, хворіє на ревматичну хворобу серця із застійною серцевою недостатністю. До схеми лікування пацієнта увійшли дигоксин, еналаприл, гіпотіазид, фуросемід, аспірин, триметазидин, панангін, молсидомін. Проте достатнього діуретичного ефекту лікарем не було зафіксовано. Який із призначених препаратів зменшив ефективність дії діуретиків? А Аспірин В Дигоксин С Триметазидин D Нітросорбід E

Панангін

Тест №436 Хворий, 45 років, 3 міс тому переніс великовогнищевий інфаркт міокарда. Скарги відсутні. Об'єктивно: АТ – 150/90 мм рт.ст. ЧСС – 92 за 1 хв. Тони серця приглушені. ЕКГ: рубцеві зміни в ділянці задньої стінки лівого шлуночка. Яку комбінацію ліків можна призначити для найбільш ефективної профілактики повторного ІМ? А

Курантил+ніфедипін В Пентоксифілін+нітросорбід С Аспірин+нітроглицерин D

Аспірин+пропранолол E Тиклід+молсидомін

Тест №437 Хворий на ревматизм 48 р. тривало лікувався з приводу серцевої недостатності, через 14 діб з'явився сухий кашель. Об-но: ЧСС=102 уд/хв. АТ-160/90 мм рт.ст. Побічна дія якого з препаратів, найімовірніше, могла проявитись у хворого? А Гіпотіазиду В

Бісопрололу С Дигоксину D *Еналаприлу E Фуросеміду

Тест №438 У пацієнтки 40 років, що хворіє на тиреотоксичну хворобу серця, з'явилися напади надшлуночкової пароксизмальної тахікардії. Порадьте лікарю найбільш ефективний патогенетично обґрунтований антиаритмік для даної пацієнтки. А Пропранолол В

Дигоксин С Лідокаїн D Верапаміл E Пропафенон

Тест №439 Чоловік, 42 р., скаржиться на підвищення рівня АТ, що супроводжується нудотою, шумом у вухах, головним болем. Об-но: межі серця розширені вліво, тони приглушені, ЧСС 86 уд. за хв, АТ 160/100 мм рт.ст. Зафіксовано підвищення рівня реніну у плазму крові в 2,1 рази. Яку з наведених груп гіпотензивних засобів доцільно застосувати? А

Антагоністи кальцію В Діуретики С Периферичні вазодилататори D Альфа-адреноблокатори E Інгібітори АПФ

Тест №440 У хворого на артеріальну гіпертензію при обстеженні виявлено ІХС, стенокардію, ІІ ф.кл., надшлуночкові екстрасистолі. Виберіть засіб для лікування артеріальної гіпертензії.

А Ніфедипін В Пропранолол С Празозин D Гіпотіазид E Фуросемід

Тест №441 У хворого на гіпертонічну хворобу із супутньою ІХС, серцевою недостатністю І стадія, І ФК. АТ=140/100 мм рт. ст., ЧСС=54/хв. Виберіть оптимальний гіпотензивний засіб з числа наведених А Пропранолол В Верапаміл С Амлодипін D Резерпін E

Метилдопа

Тест №442 До фармацевта звернувся пацієнт, якому рекомендовано прийом ацетилсаліцилової кислоти як антиагреганта. Яку добову дозу у грамах слід рекомендувати для постійного прийому? А 0,1—0,3 В 0,5-1,0 С 1,0-2,0 D 2,0-3,0 Е

Більше 4,0

Тест №443 Хворому з гіпертонічною хворобою призначено гіпотензивний препарат. Через 20 днів прийому у хворого з'явилися депресія, нічні жахи, періодичне блювання, пронос, жовтяниця, біль у суглобах, підвищилась температура тіла. Назвіть його: А Анаприлін В

Клофелін С Метилдопа D Верапаміл Е Каптоприл

Тест №444 У хворого з артеріальною гіпертензією та хронічним бронхітом раптово виник сухий кашель, задишка, температура тіла не змінилась. Відомо, що хворий приймає каптоприл. Поясніть цей феномен при прийомі препарату: А Збільшене утворення брадикініну В Збільшене утворення ангіотензину I С Збільшене утворення реніну D

Зменшене утворення альдостерону Е Збільшення утворення Na-уретичного пептиду

Тест №445 У пацієнтки 40 років, яка з приводу загострення бронхіту приймала ампіцилін протягом 7 днів, виникли загальна слабкість, здуття живота, періодичні проноси, які змінюються закрепками. Який з наведених засобів слід рекомендувати для нормалізації даного стану? А Лінекс В Церукал С Лоперамід D Гуталакс Е Де-нол

Тест №446 У хворого на артеріальну гіпертензію виявлено ІХС, серцеву недостатність ІІБ, ІІІ ФК, цукровий діабет ІІ типу, субкомпенсований. Призначте оптимальний гіпотензивний засіб? А Гідралазін В Верапаміл С Пропранолол D Гіпотіазид Е Еналаприл

Тест № 447 Який із перелічених лікарських засобів може спровокувати периферичний ангіоспазм?

А клонідин

В лозартан

С ніфедипін

D амлодипін

Е пропранолол

Тест № 448 Протипоказанням для призначення калійзберігаючих діуретиків є:

А вагітність

В гіпонатріємія

С гостра ниркова недостатність

D хронічна ниркова недостатність

Е все перераховане

Тест № 449 Яка комбінація антигіпертензивних лікарських засобів є нераціональною?

А амлодипін + гіпотіазид

В еналаприл + фуросемід

С каптоприл + спіронолактон

D атенолол + фуросемід

Е ніфедипін + лозартан

Тест № 450 Яка комбінація антигіпертензивних лікарських засобів є нераціональною?

А ніфедипін + еналаприл

В еналаприл + гіпотіазид

С празозин + пропранолол

D пропранолол + гіпотіазид

Е пропранолол + верапаміл

Тест № 451 Назвіть показник терапевтичної ефективності при призначенні серцевих глікозидів:

А концентрація препарату у сироватці крові

В поява брадикардії

- С динаміка показників ЕКГ
 - D ступінь зменшення клінічних симптомів недостатності кровообігу
 - Е концентрація препарату у сечі
- Тест № 452 Терапевтичний ефект при застосуванні препаратів (або похідних) кромогліцієвої кислоти настає через:
- А 2-4 тижні
 - В 2-4 дні
 - З 1-2 тижні
 - D 2-3 місяці
 - Е 1 тиждень
- Тест № 453 Базова (протизапальна) терапія бронхіальної астми передбачає застосування:
- А антибактеріальних засобів
 - В атигістамінних засобів
 - С пролонгованих теofilinів
 - D глюкокортикоїдів
 - Е бета2-адреноміметиків
- Тест № 454 До антисекреторних препаратів відносяться всі, крім:
- А пірензепіну
 - В ранітидин
 - С омепразолу
 - D маалокса
 - Е фамотидину
- Тест № 455 Який із перерахованих препаратів може маскувати ознаки кровотечі з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (забарвлювати випорожнення в чорний колір)? А
- А пірензепін
 - В фамотидин
 - С сукральфат
 - D альмагель
 - Е вісмуту субцитрат колоїдний
- Тест № 456 Дайте визначення поняття "саліцилізм":
- А розвиток побічних ефектів при лікуванні саліцилатами (шум у вухах, нудота, блювання, лихоманка)
 - В розвиток побічних ефектів при лікуванні саліцилатами (кровотеча із шлунково-кишкового тракту, болі в епігастрії, блювання)
 - С непереносимість саліцилатів
 - D звикання до саліцилатів
 - Е розвиток залежності від саліцилатів
- Тест № 457 Хворим похилого та старечого віку небажане призначення антибіотиків групи:
- А карбапенемів
 - В пеніцилінів
 - С макролідів
 - D цефалоспоринів
 - Е аміноглікозидів
- Тест № 458 При застосуванні якого препарату спостерігається фотосенсибілізація?
- А доксицикліну
 - В амоксицилін
 - С ампіцилін
 - D ровамідин
 - Е цефтріаксон
- Тест № 459 До препаратів, що сприяють розвитку діареї відносяться всі, крім:
- А антибактеріальні засоби

- В магній містять антациди
- С препарати калію
- Д алюмінієвмісні антациди
- Е антикоагулянти

Тест № 460 До складу препаратів для симптоматичного лікування болю в горлі (таблетки, пастилки, льодяники) можуть входити всі перелічені компоненти, крім:

- А аскорбінова кислота
- В слабкі антисептики
- З місцевими анестетиками
- Д ефірні олії
- Е антибактеріальні засоби

Тест № 461 Які побічні ефекти характерні при застосуванні симпатоміметиків при лікуванні риніту?

- А підвищена дратівливість
- В порушення сну
- С підвищення АТ
- Д головний біль
- Е всі перераховані

Тест № 462 Препарати, що містять ацикловір, для місцевої терапії герпесу губ, наносяться:

- А кожні 4 години
- В 2 рази на день
- З 3 рази на день
- Д кожні 60 хвилин
- Е 8-10 разів на день

Тест № 463 До напрямів симптоматичного лікування діареї відносяться всі, крім:

- А застосування ентеросорбентів
- В застосування антиперистальтичних препаратів
- С застосування препаратів для пероральної регідрації
- Д застосування антибактеріальних препаратів
- Е застосування пре- та пробіотиків

Тест № 464 Проносний ефект при застосуванні препаратів, що містять антраглікозиди, розвивається через:

- А 8-12 годин після прийому
- В 20-24 години після прийому
- З 2-4 години після прийому
- Д 15-30 хв після прийому
- Е 24-36 годин після прийому

Тест № 465 Вкажіть проносний препарат з осмотичним типом дії:

- А гутталакс
- В рицинова олія
- С вазелінове масло
- Д форлакс
- Е бісакодил

Тест № 466 У 18-річної хворої з'явилися тонічні судоми кінцівок, які змінились на клонічні. Свідомість втрачена. З рота виділяється кров'яниста піна. Зіниці широкі, фотореакції відсутні. Обличчя червоне. ЧП-62 за хв., АТ-115/70 мм рт.ст. Вкажіть препарат вибору для зняття приступів. А Фінлепсин В Діазепам С Гексенал Д Закис азоту з киснем Е Оксидутират натрію

Тест №467 Під час епідемії грипу необхідно провести профілактику. Які методи екстреної профілактики застосовуються для цього? А Ремантадин В Оксолінова мазь С Живі вакцини D Аспірин Е Ацикловір

Тест №468 У хворого на гострий пієлонефрит інтенсивний біль в попереку, часті позиви до сечовипускання, температура тіла 39,0°C, АТ- 80/60 мм рт.ст., піурія. Які препарати показані хворому в першу чергу? А Цитостатики В Сульфаніламід С Аналгетики D Антибіотики Е Гормональні препарати

Тест №469

Хвора 46 років скаржиться на інтенсивний біль у правому підребер'ї, нудоту, блювоту, гіркоту в роті. В анамнезі – жовчнокам'яна хвороба. При пальпації живота – болісність в проекції жовчного міхура. На догоспітальному етапі необхідно призначити: А

Індометацин В Карсил С Магнію сульфат D Холестирамін Е Но-шпа
Тест №470 Який засіб є першочерговим при лікуванні анафілактичного шоку, щоб не припустити зупинки серця? А Адреналін в/в В Гідрокортизон в/в С Кортизон в/в D Антигістамінні засоби Е Кристалоїдні розчини в/в

Тест №471 Під час надання ургентної гіпотензивної допомоги хворому з неускладненим гіпертензивним кризом, було виявлено різке короточасне підвищення артеріального тиску. Який препарат отримував хворий? А Фуросемід В Діазепам С Дібазол D Клофелін Е Папаверину гідрохлорид

Тест №472 Під час лікування хронічної серцевої недостатності дигоксином у хворого виникла синусова брадикардія (ЧСС- 48 за хв.), нудота, блювота, погіршення зору. Який з препаратів є антидотом в цьому випадку? А Унітіол В Тетацин-кальцій С Дипіроксам D Амілінітріт Е Атропину сульфат

Тест №473 Хворому 40 років із скаргами на печію, дисфагію, біль в епігастральній ділянці натщесерце та через 2 години після їжи, проведене фіброскопічне дослідження. Виявлена дуоденальна виразка, гістологічний аналіз слизової оболонки шлунку – наявність *Helicobacter pylori*. Яку групу препаратів Ви порекомендуєте хворому? А Прокінетики В Вітаміни С Протимікробні D Ненаркотичні аналгетики Е Наркотичні аналгетики

Тест №474 У хворого 53 років дрібновузловий цироз печінки. Приймає гепатопротектори і глюкокортикостероїди. На протязі останніх 3 місяців скаржиться на наростаючі набряки нижніх кінцівок, збільшення живота, задишку. Яку комбінацію ліків доцільно додати до лікування, що вже здійснюється? А Ретаболіл + фуросемід В Альбумін + аскорутин С Верошпирон + аскорутин D Лідокаїн + гіпотіазид Е Верошпирон + фуросемід

Тест №475 Хворий 70 років перебуває на лікуванні у травматологічному відділенні з діагнозом: перелом шийки стегна. Який лікарський засіб слід призначити з метою профілактики тромбоемболічних ускладнень?

- А. Кордарон.
- В. Нітрогліцерин.
- С. Ацетилсаліцилова кислота.
- Д. Квадевіт.
- Е. Гепарин.

Тест №476 Хворому В. 34 років встановлено діагноз гострий пієлонефрит. Яка група лікарських засобів у лікуванні є на першому місці:

- А Спазмолітики
- В Урикозуричні засоби.
- С Антибіотики.
- Д Сечогінні.
- Е Нефропротектори

Тест №477 Хворому К. 55 років для посилення антиагрегантного ефекту при лікуванні дрібно вогнищового інфаркту міокарда необхідно призначити:

- А Клопідогрель.
- В Абсіксимаб.
- С Тиклопідин.
- Д Грудин.
- Е Дипіридамо́л

Тест №478 Хворий С. 47 років приймає преднізолон у дозі 30 мг на добу для лікування бронхіальної астми. Раптово біль в епігастральній ділянці. Яке ускладнення гормонотерапії найбільш ймовірно виникло?

- А Гострий панкреатит.
- В Пептична виразка шлунка.
- С Гострий коліт.
- Д Інфаркт міокарда.
- Е Гострий холецистит

Тест №479 Хворий А., 25 років, лікується з приводу дисемінованого туберкульозу легень. Який лікарський засіб міг спричинити гепатит, свербіж та червоне забарвлення сечі?

- А Рифампіцин
- В Ізоніазид.
- С Піразинамід.
- Д Амікацин.
- Е Стрептоміцин

Тест №480 Хворий В. 60 років з артеріальною гіпертензією та брадикардією госпіталізований в кардіологічне відділення. Який лікарський засіб доцільно йому призначити?

- А Ніфедипін.
- В Доксазозин.
- С Атенолол.
- Д Метилдофа.
- Е Еналаприл

Тест №481 Хворому Л. 70 років, встановлено діагноз: гіперацидний гастрит та супутній цукровий діабет 2 типу. Порекомендуйте лікарю антацидний лікарський засіб для даного хворого.

- А Гастал.
- В Вікалін.
- С Ріволокс.
- Д Гастерін.
- Е Альмагель

Тест №482 Хворий К., 46 років, з хронічним бронхітом звернувся в аптеку. Який лікарський засіб можна придбати в аптеці для полегшення відходження густого та в'язкого харкотиння

- А Лібексин.
- В Фалімінт.
- С Амброксол.
- Д Глаувент.
- Е Сальбутамол

Тест №483 Вагітна жінка 26 років (ІІІ триместр вагітності) скаржиться на підвищення температури тіла до 39,0°C. Який жарознижувачий лікарський засіб можна запропонувати в даній ситуації?

- A Анальгін.
- B Аспірин.
- C Диклофенак.
- D Панадол.
- E Індометацин

Тест №484 Дитина, 7 років, хворіє на бронхіальну астму 3 роки. Провокують напади, що виникають переважно в нічний час 2-3 рази на місяць, респіраторні інфекції та фізичні навантаження. Порекомендуйте молодому лікарю лікарський засіб для базисної терапії

- A Кромоглікат натрію.
- B Еуфілін.
- C Оксацилін
- D Астмопент.
- E Бромгексин

Тест №485 У хворого на виразкову хворобу під час комбінованої фармакотерапії випорожнення набули чорного забарвлення. Назвіть препарат, який міг спричинити таку зміну:

- A Омепразол;
- B Де-нол;
- C Актовегін;
- D Метронідазол;
- E Ранітидин

Тест №486 Хворому М., який місяць тому переніс гострий інфаркт міокарда, для профілактики тромбоутворення призначено ацетилсаліцилову кислоту. В якій дозі слід рекомендувати даний лікарський засіб у такій клінічній ситуації?

- A 100-300мг;
- B 500мг;
- C 3000мг;
- D 1000мг;
- E 750мг.

Тест №487 Хворий П., 67 років, знаходиться у терапевтичному відділенні з приводу прогресування серцевої недостатності. Через 3 тижні лікування стан пацієнта погіршився, що проявилось зниженням апетиту, нудотою, при погляді на джерело світла з'явилися райдужні кола. Який із лікарських засобів міг спричинити вказаний стан?

- A. Нітросорбід;
- B. Каптоприл;
- C. Дігосин;
- D. Гідрохлортіазид;
- E. Аспекард

Тест №488 Хворий 52 років, з метою купування нападу стенокардії прийняв таблетку нітрогліцерину після чого відчув сильний головний біль. Який лікарський засіб слід рекомендувати приймати одночасно з нітратами для зменшення інтенсивності головного болю?

- A Аспірин;
- B Кеторолак;

- C Суматриптан;
- D Валідол;
- E Кофеїн.

Тест №489 Хворий, яка страждає на бронхіальну астму встановлено діагноз гіпертонічної хвороби. Який гіпотензивний препарат протипоказаний даній пацієнтці?

- A Амлодипін;
- B Каптоприл;
- C Анаприлін;
- D Гіпотіазид;
- E Верапаміл.

Тест №490 У хворої В., 55 років, яка тривалий час приймає гідрохлортіазид з приводу лікування гіпертонічної хвороби, з'явилися м'язова слабкість, судом м'язів нижніх кінцівок, відчуття перебоїв у роботі серця. Яке ускладнення фармакотерапії найбільш ймовірно виникло у даної хворої?

- A Гіпокаліємія;
- B Гіпонатріємія;
- C Гіпокальціємія;
- D Гіпермагніємія;
- E Гіперкальціємія

Тест №491 Хворий Б., 35 років хворіє на виразкову хворобу асоційовану з *Helicobacter pylori*. Лікар призначив амоксицилін, омепразол, вентер, маалокс, квамател. Вкажіть який із перерахованих лікарських засобів володіє антимікробною дією?

- A. Вентер;
- B. Амоксицилін;
- C. Маалокс;
- D. Омепразол;
- E. Квамател

Тест №492 Хвора К., вагітність I триместр, встановлено діагноз гострого пієлонефриту. Який антибіотик є препаратом вибору для лікування даної пацієнтки?

- A Амікацин.
- B Норфлуксацин;
- C Гентаміцин;
- D Хлорамфенікол;
- E Амоксицилін;

Тест №493 Хвора М., 64 роки, приймає нітросорбід по 10 мг 4 р/д. Через три тижні від початку терапії збільшилась кількість та тривалість нападів стенокардії, що лікар пов'язав із розвитком толерантності до нітратів. Які рекомендації щодо подальшої фармакотерапії є раціональними у даному випадку?

- A Відмінити нітрати та призначити сідноніміни;
- B Зменшити дозу нітратів;
- C Збільшити дозу нітратів;
- D Додатково призначити серцеві глікозиди;
- E Припинити використання антиангінальних ЛЗ.

Тест №494 Хворий Н., 63 роки, регулярно приймає фуросемід 3 р/тиждень з приводу хронічної серцевої недостатності. Тиждень тому захворів на пневмонію, з приводу чого було призначено комбіновану фармакотерапію. На п'ятий день лікування у хворого погіршився

слух. Який лікарський засіб при одночасному застосуванні з фуросемідом міг спричинити таку побічну дію?

- A Бісептол;
- B Цефуроксим;
- C Ампіцилін;
- D Еритроміцин;
- E Тетрациклін

Тест №495 Хворий 52 роки, хворіє на хронічне обструктивне захворювання легень протягом 12-ти років, палить протягом 30 років. Після застосування бронхолітичного препарату виникла затримка сечопуску. Який бронхолітичний препарат міг спричинити таку побічну дію?

- A Атровент;
- B Сальбутамол;
- C Астмопент;
- D Еуфілін Н;
- E Фенотерол

Тест №496 Хвора 27 років, без шкідливих звичок страждає на бронхіальну астму персистуючого перебігу легкого ступеня. Останнім часом напади задухи почастишали до 8 разів на добу. Для купування нападу використовує інгаляції сальбутамолу. Якою групою лікарських засобів необхідно провести базисну терапію?

- A Холінолітики.
- B Антибіотики;
- C Системні глюкокортикостероїди;
- D Кромони;
- E Інгаляційні глюкокортикоїди;

Тест №497 Хворий М., лікується з приводу гострої ревматичної лихоманки. Після проведення індивідуальної проби на чутливість до пеніциліну виявлено ознаки гіперчутливості. Які з перерахованих груп протимікробних лікарських засобів є препаратами вибору для лікування?

- A Сульфаніламід;
- B Тетрацикліни;
- C Цефалоспорини;
- D Макроліди;
- E Фторхінолони

Тест №498 У хворого М., який тривалий час хворіє на хронічний гепатит, встановлено діагноз пневмонії. Який з антибактеріальних лікарських засобів можна використати у даній клінічній ситуації?

- A Амоксициліну;
- B Тетрациклін;
- C Бісептол;
- D Ріфампіцин;
- E Ванкоміцин

Тест №499 Хвора А., протягом 7 днів отримувала антибіотикотерапію, яка ускладнилась розвитком дисбактеріозу кишечника. Яку із груп лікарських засобів слід використати для лікування даного ускладнення?

- A Жовчогінні;
- B Спазмолітики;

- C Пробіотики;
- D Антациди;
- E Адаптогени.

Тест №500 У хворої П, яка приймала петльовий діуретик з'явилися м'язова слабкість, судороги м'язів нижніх кінцівок, відчуття перебоїв у роботі серця. Назвіть лікарські засоби для корекції даного ускладнення.

- A Аспаркам;
- B Маалокс;
- C Десферал;
- D Глобінон;
- E Магне-В-6.

Тест №501 У хворого Д., з підтвердженою УЗД картиною діагнозу жовчокам'яної хвороби з'явилась біль в правому підребер'ї, жовтушність шкіри та слизових оболонок. Який із наркотичних анальгетиків протипоказаний для купування больового синдрому?

- A Фентаніл;
- B Морфін;
- C Промедол;
- D Омнопон;
- E Трамадол

Тест № 502 Хворий В., 42р., перед проведенням оперативного втручання з приводу видалення жовчного міхура, тривожний, збуджений, відмовляється від будь-якого лікування. З метою корекції психоемоційного стану показана атарактанальгезія. Що є препаратом вибору?

- A Каліпсол.
- B Фентаніл;
- C Тіопентал;
- D Аміназин;
- E Сибазон;

Тест № 503 Хворий А., 72 роки призначено серцеві глікозиди з приводу прогресування серцевої недостатності. Зміна яких показників клінічного статусу хворої свідчить про терапевтичну ефективність?

- A Поява брадикардії, аритмії;
- B Зменшення ЧСС, набряків, задишки;
- C Підвищення артеріального тиску;
- D Збільшення розмірів печінки;
- E Зменшення діурезу.

Тест № 504 Хворий, 57 років, встановлено діагноз ревматоїдного артрит, в анамнезі виразкова хвороба. Який препарат із групи НПЗП можна рекомендувати даній хворій?

- A Целекоксиб;
- B Диклофенак;
- C Аспірин;
- D Індометацин;
- E Мефенамова кислота

Тест № 505 У хворого при обстеженні виявлено гнійний плеврит. Які групи препаратів та міроприємства призначають хворому із гнійним плевритом?

- A Діуретики та дренажний масаж.
- B Сульфаніламідні препарати.

- С** Нестероїдні протизапальні засоби.
- Д** Кортикостероїди.
- Е** Евакуація гнійного вмісту та введення антибіотиків.

Тест № 506 У хворої під час обстеження виявлена мікоплазмова пневмонія. Виберіть препарат першої черговості для лікування

- А** Гентаміцин
- В** Рифампіцин
- С** Тетрациклін
- Д** Левоміцетин
- Е** Еритроміцин

Тест № 507 У хворого вперше виник приступ бронхіальної астми. З якого препарату найдоцільніше починати

- А** Інгаляції бета-2-селективного стимулятора.
- В** Глюкокортикостероїди.
- С** Адреналін підшкірно 2 рази на добу.
- Д** М-холінолітики в таблетках.
- Е** Бета-блокатори в таблетках.

Тест № 508 У хворого приступи бронхіальної астми виникають вночі, виражена брадикардія і супроводжується появою спастичного болю у кишківнику. Виберіть найефективніший лікарський препарат в даній ситуації.

- А** Анаприлін
- В** Беротек у аерозолі.
- С** Атропіну сульфат.
- Д** Атропін + но-шпа.
- Е** Інтал.

Тест № 509 У хворої, яка хворіє бронхіальною астмою, під час обстеження у пульмологічному відділенні встановлена вагітність. Які із нище наведених лікарських засобів є протипоказаними для призначення?

- А** Бронхолітики
- В** Антигістамінні
- С** Кортикостероїди
- Д** Йодовмісні препарати
- Е** Бета – 2 селективні стимулятори

Тест № 510 У хворого вперше встановлено діагноз системного червоного вівчаку (СЧВ). З якого препарату необхідно розпочинати патогенетичне лікування?

- А** Ацетилсаліцилова кислота
- В** Пеніцилін
- С** Преднізолон
- Д** Метотрексат
- Е** Вольтарен

Тест № 511 У хворого гіпертонічною хворобою виявлено обструктивний бронхіт. Який із гіпотензивних препаратів йому протипоказаний?

- А** Раунатин
- В** Гіпотіазид
- С** Допегіт

- D Анаприлін
- E Клофелін

Тест № 512 Хворий перебуває на лікуванні у гематологічному відділенні. При якому захворюванні, що супроводжується підвищенням у сироватці крові вмісту заліза, показано застосування десфералу?

- A В-12 дефіцитна анемія
- B Таласемія
- C Геморагічна автоімунна анемія.
- D Симптоматична гемолітична анемія при системному червоному вівчаку.
- E Апластичні анемії

Тест № 513 Під час обстеження хворому встановлений діагноз: залізодефіцитна анемія. З якого рівня гемоглобіну призначається переливання крові?

- A 40 г/л
- B 50 г/л
- C 60 г/л
- D 70 г/л
- E 80 г/л

Тест № 514 У хворого під час огляду встановлено діагноз геморагічного васкуліту. Який із наведених препаратів не може бути використаним для лікування?

- A Трентал
- B Свіжозаморожена плазма.
- C Гепарин
- D Амінокапронова кислота.
- E Педнізолон

Тест № 515 Хворий 70 років перебуває на лікуванні у травматологічному відділенні з діагнозом: перелом шийки стегна. Який лікарський засіб слід призначити з метою профілактики тромбоемболічних ускладнень?

- A. Кордарон.
- B. Нітрогліцерин.
- C. Ацетилсаліцилова кислота.
- D. Квадевіт.
- E. Гепарин.

Тест № 516 Хворому В. 34 років встановлено діагноз гострий пієлонефрит. Яка група лікарських засобів у лікуванні є на першому місці:

- A Спазмолітики
- B Урикозуричні засоби.
- C Антибіотики.
- D Сечогінні.
- E Нефропротектори

Тест № 517

Хворому К. 55 років для посилення антиагрегантного ефекту при лікуванні дрібно вогнищового інфаркту міокарда необхідно призначити: А Клопідогрель.

- B Абсіксимаб.
- C Тиклопідин.
- D Грудин.
- E Дипіридамола

Тест № 518 Хворий С. 47 років приймає преднізолон у дозі 30 мг на добу для лікування бронхіальної астми. Раптово біль в епігастральній ділянці. Яке ускладнення гормонотерапії найбільш ймовірно виникло?

- А Гострий панкреатит.
- В Пептична виразка шлунка.
- С Гострий коліт.
- Д Інфаркт міокарда.
- Е Гострий холецистит

Тест № 519 Хворий А., 25 років, лікується з приводу дисемінованого туберкульозу легень. Який лікарський засіб міг спричинити гепатит, свербіж та червоне забарвлення сечі?

- А Рифампіцин
- В Ізоніазид.
- С Піразинамід.
- Д Амікацин.
- Е Стрептоміцин

Тест № 520 Хворий В. 60 років з артеріальною гіпертензією та брадикардією госпіталізований в кардіологічне відділення. Який лікарський засіб доцільно йому призначити?

- А Ніфедипін.
- В Доксазозин.
- С Атенолол.
- Д Метилдофа.
- Е Еналаприл

Тест № 521 Хворому Л. 70 років, встановлено діагноз: гіперацидний гастрит та супутній цукровий діабет 2 типу. Порекомендуйте лікарю антацидний лікарський засіб для даного хворого.

- А Гастал.
- В Вікалін.
- С Ріволокс.
- Д Гастерін.
- Е Альмагель

Тест № 522 Хворий К., 46 років, з хронічним бронхітом звернувся в аптеку. Який лікарський засіб можна придбати в аптеці для полегшення відходження густого та в'язкого харкотиння

- А Лібексин.
- В Фалімінт.
- С Амброксол.
- Д Глаувент.
- Е Сальбутамол

Тест № 523 Вагітна жінка 26 років (III триместр вагітності) скаржиться на підвищення температури тіла до 39,0°C. Який жарознижувачий лікарський засіб можна запропонувати в даній ситуації?

- А Анальгін.
- В Аспірин.
- С Диклофенак.
- Д Панадол.
- Е Індометацин

Тест№ 524 Дитина, 7 років, хворіє на бронхіальну астму 3 роки. Провокують напади, що виникають переважно в нічний час 2-3 рази на місяць, респіраторні інфекції та фізичні навантаження. Порекомендуйте молодому лікарю лікарський засіб для базисної терапії

- А Кромоглікат натрію.
- В Еуфілін.
- С Оксазилін
- Д Астмопент.
- Е Бромгексин

Тест№ 525 У хворого на виразкову хворобу під час комбінованої фармакотерапії випорожнення набули чорного забарвлення. Назвіть препарат, який міг спричинити таку зміну:

- А Омепразол;
- В Де-нол;
- С Актовегін;
- Д Метронідазол;
- Е Ранітидин

Тест№ 526 Хворому М., який місяць тому переніс гострий інфаркт міокарда, для профілактики тромбоутворення призначено ацетилсаліцилову кислоту. В якій дозі слід рекомендувати даний лікарський засіб у такій клінічній ситуації?

- А 100-300мг;
- В 500мг;
- С 3000мг;
- Д 1000мг;
- Е 750мг.

Тест№ 527 Хворий П., 67 років, знаходиться у терапевтичному відділенні з приводу прогресування серцевої недостатності. Через 3 тижні лікування стан пацієнта погіршився, що проявилось зниженням апетиту, нудотою, при погляді на джерело світла з'явилися райдужні кола. Який із лікарських засобів міг спричинити вказаний стан?

- А. Нітросорбід;
- В. Каптоприл;
- С. Дігосин;
- Д. Гідрохлортіазид;
- Е. Аспекард

Тест№ 528 Хворий 52 років, з метою купування нападу стенокардії прийняв таблетку нітрогліцерину після чого відчув сильний головний біль. Який лікарський засіб слід рекомендувати приймати одночасно з нітратами для зменшення інтенсивності головного болю?

- А Аспірин;
- В Кеторолак;
- С Суматриптан;
- Д Валідол;
- Е Кофеїн.

Тест№ 529 Хворій, яка страждає на бронхіальну астму встановлено діагноз гіпертонічної хвороби. Який гіпотензивний препарат протипоказаний даній пацієнтці?

- А Амлодипін;
- В Каптоприл;
- С Анаприлін;

- D** Гіпотіазид;
- E** Верапаміл.

Тест № 530 У хворої В., 55 років, яка тривалий час приймає гідрохлортіазид з приводу лікування гіпертонічної хвороби, з'явилися м'язова слабкість, судороги м'язів нижніх кінцівок, відчуття перебоїв у роботі серця. Яке ускладнення фармакотерапії найбільш ймовірно виникло у даної хворої?

- A** Гіпокаліємія;
- B** Гіпонатріємія;
- C** Гіпокальціємія;
- D** Гіпермагніємія;
- E** Гіперкальціємія

Тест № 531 Хворий Б., 35 років хворіє на виразкову хворобу асоційовану з *Helicobacter pylori*. Лікар призначив амоксицилін, омепразол, вентер, маалокс, квамател. Вкажіть який із перерахованих лікарських засобів володіє антимікробною дією?

- A.** Вентер;
- B.** Амоксицилін;
- C.** Маалокс;
- D.** Омепразол;
- E.** Квамател

Тест № 532 Хвора К., вагітність I триместр, встановлено діагноз гострого пієлонефриту. Який антибіотик є препаратом вибору для лікування даної пацієнтки?

- A** Амікацин.
- B** Норфлоксацин;
- C** Гентаміцин;
- D** Хлорамфенікол;
- E** Амоксицилін;

Тест № 533 Хвора М., 64 роки, приймає нітросорбід по 10 мг 4 р/д. Через три тижні від початку терапії збільшилась кількість та тривалість нападів стенокардії, що лікар пов'язав із розвитком толерантності до нітратів. Які рекомендації щодо подальшої фармакотерапії є раціональними у даному випадку?

- A** Відмінити нітрати та призначити сідноніміни;
- B** Зменшити дозу нітратів;
- C** Збільшити дозу нітратів;
- D** Додатково призначити серцеві глікозиди;
- E** Припинити використання антиангінальних ЛЗ.

Тест № 534 Хворий Н., 63 роки, регулярно приймає фуросемід 3 р/тиждень з приводу хронічної серцевої недостатності. Тиждень тому захворів на пневмонію, з приводу чого було призначено комбіновану фармакотерапію. На п'ятий день лікування у хворого погіршився слух. Який лікарський засіб при одночасному застосуванні з фуросемідом міг спричинити таку побічну дію?

- A** Бісептол;
- B** Цефуроксим;
- C** Ампіцилін;
- D** Еритроміцин;
- E** Тетрациклін

Тест№ 535Хворий 52 роки, хворіє на хронічне обструктивне захворювання легень протягом 12-ти років, палить протягом 30 років. Після застосування бронхолітичного препарату виникла затримка сечопуску. Який бронхолітичний препарат міг спричинити таку побічну дію?

- А Атровент;
- В Сальбутамол;
- С Астмопент;
- Д Еуфілін Н;
- Е Фенотерол

Тест№ 536Хвора 27 років, без шкідливих звичок страждає на бронхіальну астму персистуючого перебігу легкого ступеня. Останнім часом напади задухи почастишали до 8 разів на добу. Для купування нападу використовує інгаляції сальбутамолу. Якою групою лікарських засобів необхідно провести базисну терапію?

- А Холінолітики.
- В Антибіотики;
- С Системні глюкокортикостероїди;
- Д Кромони;
- Е Інгаляційні глюкокортикоїди;

Тест№ 537Хворий М., лікується з приводу гострої ревматичної лихоманки. Після проведення індивідуальної проби на чутливість до пеніциліну виявлено ознаки гіперчутливості. Які з перерахованих груп протимікробних лікарських засобів є препаратами вибору для лікування?

- А Сульфаніламід;
- В Тетрацикліни;
- С Цефалоспорини;
- Д Макроліди;
- Е Фторхінолони

Тест№ 538У хворого М., який тривалий час хворіє на хронічний гепатит, встановлено діагноз пневмонії. Який з антибактеріальних лікарських засобів можна використати у даній клінічній ситуації?

- А Амоксициліну;
- В Тетрациклін;
- С Бісептол;
- Д Ріфампіцин;
- Е Ванкоміцин

Тест№ 539Хвора А., протягом 7 днів отримувала антибіотикотерапію, яка ускладнилась розвитком дисбактеріозу кишечника. Яку із груп лікарських засобів слід використати для лікування даного ускладнення?

- А Жовчогінні;
- В Спазмолітики;
- С Пробіотики;
- Д Антациди;
- Е Адаптогени.

Тест№ 540У хворої П, яка приймала петльовий діуретик з'явилися м'язова слабкість, судоми м'язів нижніх кінцівок, відчуття перебоїв у роботі серця. Назвіть лікарські засоби для корекції даного ускладнення.

- A** Аспаркам;
- B** Маалокс;
- C** Десферал;
- D** Глобірон;
- E** Магне-В-6.

Тест № 54 У хворого Д., з підтвердженою УЗД картиною діагнозу жовчокам'яної хвороби з'явилась біль в правому підребер'ї, жовтушність шкіри та слизових оболонок. Який із наркотичних анальгетиків протипоказаний для купування больового синдрому?

- A** Фентаніл;
- B** Морфін;
- C** Промедол;
- D** Омнопон;
- E** Трамадол

Тест № 542 Хворий В., 42р., перед проведенням оперативного втручання з приводу видалення жовчного міхура, тривожний, збуджений, відмовляється від будь-якого лікування. З метою корекції психоемоційного стану показана атарактанальгезія. Що є препаратом вибору?

- A** Каліпсол.
- B** Фентаніл;
- C** Тіопентал;
- D** Аміназин;
- E** Сибазон;

Тест № 543 Хворий А., 72 роки призначено серцеві глікозиди з приводу прогресування серцевої недостатності. Зміна яких показників клінічного статусу хворої свідчить про терапевтичну ефективність?

- A** Поява брадикардії, аритмії;
- B** Зменшення ЧСС, набряків, задишки;
- C** Підвищення артеріального тиску;
- D** Збільшення розмірів печінки;
- E** Зменшення діурезу.

Тест № 544 Хворий, 57 років, встановлено діагноз ревматоїдного артрити, в анамнезі виразкова хвороба. Який препарат із групи НПЗП можна рекомендувати даній хворій?

- A** Целекоксиб;
- B** Диклофенак;
- C** Аспірин;
- D** Індометацин;
- E** Мефенамова кислота

Тест № 545 У хворого при обстеженні виявлено гнійний плеврит. Які групи препаратів та міроприємства призначають хворому із гнійним плевритом?

- A** Діуретики та дренажний масаж.
- B** Сульфаніламідні препарати.
- C** Нестероїдні протизапальні засоби.
- D** Кортикостероїди.
- E** Евакуація гнійного вмісту та введення антибіотиків.

Тест № 546 У хворої під час обстеження виявлена мікоплазмова пневмонія. Виберіть препарат першої черговості для лікування

- A** Гентаміцин

- В** Рифампіцин
- С** Тетрациклін
- Д** Левоміцетин
- Е** Еритроміцин

Тест№ 547 У хворого вперше виник приступ бронхіальної астми. З якого препарату найдоцільніше починати лікування хворого?

- А** Інгаляції бета-2-селективного стимулятора.
- В** Глюкокортикостероїди.
- С** Адреналін підшкірно 2 рази на добу.
- Д** М-холінолітики в таблетках.
- Е** Бета-блокатори в таблетках.

Тест№ 548 У хворого приступи бронхіальної астми виникають вночі, виражена брадикардія і супроводжується появою спастичного болю у кишківнику. Виберіть найефективніший лікарський препарат в даній ситуації.

- А** Анаприлін
- В** Беротек у аерозолі.
- С** Атропіну сульфат.
- Д** Атропін + нош-па.
- Е** Інтал.

Тест№ 549 У хворої, яка хворіє бронхіальною астмою, під час обстеження у пульмологічному відділенні встановлена вагітність. Які із нище наведених лікарських засобів є протипоказаним для призначення?

- А** Бронхолітики
- В** Антигістамінні
- С** Кортикостероїди
- Д** Йодовмісні препарати
- Е** Бета – 2 селективні стимулятори

Тест№ 550 У хворого вперше встановлено діагноз системного червоного вівчаку (СЧВ). З якого препарату необхідно розпочинати патогенетичне лікування?

- А** Ацетилсаліцилова кислота
- В** Пеніцилін
- С** Преднізолон
- Д** Метотрексат
- Е** Вольтарен

Тест№ 551 У хворого гіпертонічною хворобою виявлено обструктивний бронхіт. Який із гіпотензивних препаратів йому протипоказаний?

- А** Раунатин
- В** Гіпотіазид
- С** Допегіт
- Д** Анаприлін
- Е** Клофелін

Тест№ 552 Хворий перебуває на лікуванні у гематологічному відділенні. При якому захворюванні, що супроводжується підвищенням у сироватці крові вмісту заліза, показано застосування десфералу?

- А** В-12 дефіцитна анемія
- В** Таласемія

- С Геморагічна автоімунна анемія.
- Д Симптоматична гемолітична анемія при системному червоному вівчаку.
- Е Апластичні анемії

Тест № 553 Під час обстеження хворому встановлений діагноз: залізодефіцитна анемія. З якого рівня гемоглобіну призначається переливання крові?

- А 40 г/л
- В 50 г/л
- С 60 г/л
- Д 70 г/л
- Е 80 г/л

Тест № 554 У хворого під час огляду встановлено діагноз геморагічного васкуліту. Який із нищенаведених препаратів не може бути використаним для лікування?

- А Трентал
- В Свіжозаморожена плазма.
- С Гепарин
- Д Амінокапронова кислота.
- Е Педнізолон

Тест № 555

Який антибактеріальний лікарський засіб найефективніший при хронічному гастриті, асоційованому з хелікобактерною інфекцією?

- А. **Кларитроміцин**
- В. Ко-тримоксазол
- С. Левоміцетин
- Д. Лінкоміцин
- Е. Цефтріаксон

Тест № 556

Вагітна жінка у терміні вагітності 32 тижні захворіла на пневмонію. Лікар призначив засіб із групи фторхінолонів. Який негативний ефект на плід можна очікувати?

- А. Нефротоксичний
- В. Нейротоксичний
- С. Гематотоксичний
- Д. Гепатотоксичний
- Е. Хондротоксичний

Тест № 557

У пацієнтки, яка хворіє на діабет першого типу, після ін'єкції інсуліну спостерігаються перші ознаки гіпоглікемії. Вкажіть заходи невідкладної допомоги в цьому разі.

- А. Ввести адреналін підшкірно
- В. Ввести кофеїн внутрішньом'язово
- С. Запропонувати випити теплого солодкого чаю
- Д. Виконати ін'єкцію інсуліну
- Е. Прийняти нітрогліцерин сублінгвально

Тест № 558

Яка ймовірна причина неефективності ізосорбиду мононітрату, що виникла у пацієнта зі стенокардією напруги після двомісячного курсу перорального застосування

- A. Сенсibilізація
- B. Толерантність
- C. Психічна залежність
- D. Фізична залежність
- E. Кумуляція

Тест №559

До фармацевта звернувся відвідувач аптеки зі скаргами на стискаючий біль за грудиною з іррадіацією під ліву лопатку, що виник після фізичного навантаження і триває орієнтовно 5 хвилин. Який з наведених лікарських засобів доречно порекомендувати чоловіку для усунення больового нападу?

- A. Диклофенак натрію
- B. Дротаверин
- C. Бісопролол
- D. Каптоприл
- E. Нітрогліцерин

Тест №560

Пацієнту віком 65 років з діагнозом ішемічна хвороба серця призначено як антиагрегант ацетилсаліцилову кислоту. Яка добова доза цього препарату чинитиме антиагрегантну дію?

- A. 300 мг
- B. 100 мг
- C. 200 мг
- D. 400 мг
- E. 500 мг

Тест №561

Гастродуоденопатії є одними з найчастіших ускладнень фармакотерапії нестероїдними протизапальними лікарськими засобами. Яка із вказаних властивостей пояснює причину їх виникнення

- A. Порушення проведення больового імпульсу
- B. Гальмування перекисного окислення ліпідів
- C. Гальмування синтезу простагландинів у слизовій оболонці
- D. Гальмування агрегації нейтрофілів
- E. Гальмування адгезії і агрегації тромбоцитів

Тест №562

Після підйому вантажу у чоловіка з'явився різкий біль в попереку, який посилюється при рухах, іррадіює в ліву нижню кінцівку. У пацієнта діагностовано попереково-крижовий радикуліт. Який препарат можна порекомендувати в цьому разі?

- A. Атропіну сульфат
- B. Дротаверину гідрохлорид
- C. Бендазолу гідрохлорид
- D. Ціанокобаламін
- E. Диклофенак натрію

Тест №563

Лікар призначив пацієнту амоксицилін для лікування бронхіту. Який муколітик виявляє синергізм з цим антибіотиком?

- A. Еуфілін
- B. Ілауцин

- C. Кодеїн
- D. Амброксол
- E. Декстрометорфан

Тест №564

Який із наведених препаратів є препаратом вибору для лікування артеріальної гіпертензії під час вагітності?

- A. Амлодипін
- B. Метилдопа
- C. Каптоприл
- D. Пропранолол
- E. Фуросемід

Тест №565

Поясніть відвідувачу аптеки, якого періодично турбує стискаючий біль за грудиною, що є протипоказом до прийому нітрогліцерину.

- A. Виразкова хвороба
- B. Серцева недостатність
- C. Легеневий фіброз
- D. Ниркова недостатність
- E. Закритокутова глаукома

Тест №566

Пацієнту з Н. рулогі-позитивною виразкою дванадцятипалої кишки треба призначити ерадикаційну терапію. Який антисекреторний засіб необхідно включити в схему терапії?

- A. Фосфалюгель
- B. Алмагель
- C. Омепразол
- D. Фамотидин
- E. Ранітидин

Тест №567

У пацієнта віком 36 років розвинувся гострий пієлонефрит. Який з наведених антибактеріальних засобів має нефротоксичну дію?

- A. Ампіцилін
- B. Пеніцилін
- C. Еритроміцин
- D. Гентаміцин
- E. Тетрациклін

Тест №568

У пацієнта діагноз: ішемічна хвороба серця з хронічною недостатністю кровообігу. Після тривалого застосування одного з наведених лікарських засобів у нього виникла гіпокаліємія, що призвело до порушення серцевого ритму та м'язової слабкості. Побічною дією якого препарату є це ускладнення?

- A. Спіронолактону
- B. Ніфедипіну
- C. Фуросеміду
- D. Лізіноприлу

Е. Пропранололу

Тест №569

Десятирічній дитині для лікування пневмонії був призначений антибіотик, після прийому якого мати помітила погіршення слуху у дитини. Яка група антибіотиків могла викликати таке ускладнення?

- А. Аміноглікозиди
- В. Фторхінолони
- С. Цефалоспорини
- Д. Пеніциліни
- Е. Макроліди

Тест №570

Яку групу антибіотиків доцільно призначити при хламідійній інфекції?

- А. Цефалосприни
- В. Карбапенеми
- С. Аміноглікозиди
- Д. Пеніциліни
- Е. Макроліди

Тест №571

З препаратами якої фармакологічної групи заборонено поєднувати відхаркувальні засоби?

- А. Муколітики
- В. Полівітаміни
- С. Деконгестанти
- Д. Протикашльові препарати
- Е. Антибактеріальні препарати

Тест №572

Яка побічна дія спостерігається при тривалому застосуванні дигоксину?

- А. Брадикардія
- В. Гіпокаліємія
- С. Гіпертонія
- Д. Закреп
- Е. Гіпотонія

Тест №573

У пацієнта віком 60 років із діагнозом ішемічна хвороба серця виникла брадикардія 50/хв. Який з наведених препаратів буде протипоказаний у цьому випадку?

- А. Нітрогліцерин
- В. Ніфедипін
- С. Гепарин
- Д. Нітросорбід
- Е. Пропранолол

Тест №574

До фармацевта звернулась відвідувачка аптеки з проханням порекомендувати антигельмінтний засіб, ефективний для усунення аскарид. Вкажіть цей препарат.

- А. Піперазин
- В. Кальцитонін

- С. Рибофлавін
- Д. Рибавірин
- Е. Піразинамід

Тест №575

Під час стаціонарного лікування бронхіальної астми пацієнту призначено внутрішньовенне введення еуфіліну. Який побічний ефект препарату треба контролювати першочергово?

- А. Хондротоксичність
- В. Кардіотоксичність
- С. Гематотоксичність
- Д. Нефротоксичність
- Е. Гепатотоксичність

Тест №576

Пацієнту, що тривалий час приймає варфарин, у зв'язку з підвищенням температури тіла на тлі ГРВІ рекомендовано ацетилсаліцилову кислоту. Ризик якого ускладнення ймовірний при такій комбінації лікарських засобів?

- А. Гіпокаліємія
- В. Дисбактеріоз
- С. Кровотечі
- Д. Гіперкаліємія
- Е. Тромбоутворення

Тест №577

Пацієнту з артеріальною гіпертензією був призначений препарат еналаприл, але через два тижні лікування цим препаратом в дозі 10 мг 2 рази на добу у пацієнта з'явився сухий кашель без виділення мокротиння. Чим це може бути зумовлене?

- А. Підвищенням тонуусу кашльового центру
- В. Гастроезофагальним рефлюксом
- С. Загостренням хронічного бронхіту
- Д. Накопиченням у крові залишку брадикініну
- Е. Пригніченням синтезу гістаміну

Тест №578

У пацієнтки, яка хворіє на цукровий діабет 1-го типу, після введення інсуліну виникли перші ознаки гіпоглікемії. Укажіть заходи невідкладної допомоги в цьому разі.

- А. Увести адреналін підшкірно
- В. Застосувати нітрогліцерин сублінгвально
- С. Запропонувати випити теплий солодкий чай
- Д. Увести кофеїн внутрішньом'язово
- Е. Увести інсулін підшкірно

Тест №579

Пацієнтка віком 58 років, яка хворіє на персистуючу бронхіальну астму, довгий час отримує інгаляційну терапію. Упродовж тижня в порожнині рота з'явилися симптоми кандидозу. Які лікарські засоби могли спричинити цей побічний ефект?

- А. Муколітики
- В. Інгаляційні глюкокортикостероїди
- С. Інгаляційні М-холіноблокатори

- D. Інгаляційні бета2-адреноміметики
- E. Рослинні антисептики

Тест №580

Чоловіку віком 65 років, який хворіє на негоспітальну пневмонію, було призначено антибіотик амікацин. Про який побічний ефект амікацину необхідно пам'ятати?

- A. Зниження артеріального тиску
- B. Підвищення артеріального тиску
- C. Блювання
- D. Забарвлення сечі в червоний колір
- E. Ототоксичість

Тест №581

У пацієнта віком 52 роки на тлі застосування гепарину виникли ознаки передозування препарату. Який антидот треба застосувати в цьому разі?

- A. Калію хлорид
- B. Ацетилцистеїн
- C. Налоксон
- D. Протаміну сульфат
- E. Унітіол

Тест №582

Пацієнт, який хворіє на ішемічну хворобу серця, після фізичного навантаження відчув гострий біль у ділянці серця. Який препарат можна призначити для швидкого усунення больового синдрому?

- A. Еналаприл
- B. Нітрогліцерин
- C. Каптоприл
- D. Празозин
- E. Корглікон

Тест №583

У пацієнта з діагнозом: артеріальна гіпертензія та бронхіальна астма, на тлі терапії стався напад бронхоспазму. Який лікарський засіб, найімовірніше, спричинив це ускладнення?

- A. Пропранолол
- B. Нітрогліцерин
- C. Фенотерол
- D. Верапаміл
- E. Амлодипін

Тест №584

Пацієнтка звернулася до лікаря зі скаргами на печію. Протягом тривалого часу приймає диклофенак натрію у зв'язку з діагностованим ревматоїдним артритом. Який лікарський засіб для профілактики гастропатії призначив лікар?

- A. Омепразол

- В. Папаверину гідрохлорид
- С. Ацетилсаліцилову кислоту
- Д. Кларитроміцин
- Е. Метоклопрамід

Тест №585

Пацієнт, який хворіє на артеріальну гіпертензію, тривалий час приймав бетаадреноблокатор (бісопролол). У зв'язку з покращенням стану раптово припинив застосування препарату, що викликало різке підвищення артеріального тиску. Як називається таке ускладнення терапії?

- А. Бронхоспазм
- В. Брадикардія
- С. Синдром відміни
- Д. Дисбактеріоз
- Е. Знижена чутливість

Тест №586

Для якої групи лікарських засобів властивий такий побічний ефект, як порушення кольоросприйняття навколишніх предметів у жовто-зеленому кольорі?

- А. Серцевих глікозидів
- В. Інгаляційних глюкокортикоїдів
- С. Антибіотиків
- Д. Нестероїдних протизапальних засобів
- Е. Муколітиків

Тест №587

Який пероральний цукрознижувальний засіб потрібно призначити пацієнту віком 47 років із надмірною масою тіла та цукровим діабетом 2-го типу за неефективності дієтотерапії?

- А. Метопролол
- В. Метоклопрамід
- С. Метронідазол
- Д. Мелоксикам
- Е. Метформін

Тест №588

У дівчинки дванадцяти років діагностовано гострий пієлонефрит. Який антибактеріальний засіб має вікові обмеження до призначення для пацієнтки?

- А. Бензилпеніциліну натрієва сіль
- В. Левофлоксацин
- С. Амоксицилін
- Д. Кларитроміцин
- Е. Цефуроксим

Тест №589

Під час відпуску препарату заліза для перорального вживання фармацевту потрібно попередити пацієнта, що цей препарат не можна запивати молоком і вживати разом із ним молочні продукти. Яка причина цієї рекомендації?

- A. Прискорюється виведення препарату
- B. Пролонгується дія препаратів заліза
- C. Утворюються малорозчинні хелатні комплекси
- D. Швидше всмоктується препарат
- E. Підсилюється активність препарату

Тест №590

Пацієнт віком 53 роки перебуває на стаціонарному лікуванні з діагнозом: артеріальна гіпертензія. Після проведених обстежень урологом діагностована аденома передміхурової залози. Який із лікарських засобів може бути препаратом вибору в цьому разі?

- A. Пропранолол
- B. Бісопролол
- C. Доксазозин
- D. Верапаміл
- E. Еналаприл

Тест №591

Який термін застосування судинозвужувальних засобів для симптоматичного лікування риніту?

- A. 5-7 днів
- B. 3 тижні
- C. 1 місяць
- D. 2 тижні
- E. 5 тижнів

Тест №592

Який лікарський засіб використовують для полегшення м'язового болю у пацієнта віком 10 років?

- A. Диклофенак
- B. Німесулід
- C. Ацетилсаліцилову кислоту
- D. Напроксен
- E. Ібупрофен

Тест №593

Який препарат із групи нестероїдних протизапальних засобів має найбільшу гематотоксичність та може стати причиною агранулоцитозу?

- A. Метамізол натрію
- B. Ібупрофен
- C. Індометацин
- D. Німесулід

Е. Ацетилсаліцилова кислота

Тест №594

Пацієнтка віком 50 років скаржиться на головний біль, головокружіння, мерехтіння «мушок» перед очима, нудоту. Шкіра обличчя гіперемована. Об'єктивно спостерігається: частота серцевих скорочень 85/хв, АТ -210/120 мм рт. ст. Який попередній діагноз?

- А. Напад стенокардії
- В. Менінгококова інфекція
- С. Геморагічний інсульт
- Д. Гіпертонічний криз
- Е. Інфаркт міокарда

Тест №595

Який із нижченаведених лікарських засобів є препаратом вибору для лікування артеріальної гіпертензії під час вагітності?

- А. Каптоприл
- В. Пропранолол
- С. Метилдопа
- Д. Фуросемід
- Е. Амлодипін

Тест №596

Пацієнту віком 44 роки встановлено діагноз: хронічний гастрит із підвищеною кислотоутворювальною функцією. Препарати якої фармакологічної групи раціонально використовувати в цьому разі?

- А. Глюкокортикостероїди
- В. Блокатори бета-рецепторів
- С. Інгібітори протеолітичних ферментів
- Д. Інгібітори протонної помпи
- Е. Блокатори альфа-рецепторів

Тест №597

Який із нижченаведених лікарських засобів одночасно є муколітиком та антидотом у разі передозування парацетамолом?

- А. Ацетилцистеїн
- В. Трипсин
- С. Бромгексин
- Д. Карбоцистеїн
- Е. Амброксол

Код правильних відповідей

№ тесту	Код відпо- віді	№ тесту	Код відпо- віді	№ тесту	Код відпо- віді	№ тесту	Код відпо- віді	№ тесту	Код відпо- віді
1	A	45	D	89	C	133	C	177	D
2	B	46	E	90	E	134		178	A
3	E	47	A	91	A	135	B	179	A
4	C	48	E	92	C	136	C	180	E
5	A	49	B	93	E	137	E	181	B
6	E	50	E	94	C	138	D	182	C
7	C	51	C	95	D	139	A	183	D
8	E	52	C	96	D	140	B	184	B
9	A	53	A	97	D	141	D	185	A
10	B	54	C	98	A	142	C	186	D
11	B	55	E	99	C	143	D	187	E
12	C	56	D	100	E	144	A	188	B
13	E	57	A	101	B	145	B	189	A
14	B	58	D	102	D	146	E	190	C
15	A	59	A	103	A	147	D	191	B
16	E	60	C	104	C	148	C	192	A
17	D	61	E	105	E	149	D	193	C
18	B	62	B	106	C	150	B	194	D
19	E	63	E	107	E	151	D	195	C
20	A	64	A	108	D	152	C	196	A
21	D	65	C	109	B	153	E	197	B
22	E	66	A	110	C	154	C	198	B
23	A	67	C	111	D	155	B	199	A
24	B	68	D	112	C	156	E	200	C
25	B	69	E	113	D	157	C	201	E
26	C	70	C	114	E	158	C	202	C
27	E	71	A	115	E	159	B	203	E
28	D	72	B	116	B	160	D	204	B
29	A	73	D	117	D	161	A	205	D
30	B	74	A	118	A	162	B	206	D
31	D	75	C	119	D	163	C	207	A
32	B	76	C	120	C	164	E	208	E
33	A	77	E	121	B	165	B	209	B
34	D	78	A	122	E	166	A	210	C
35	E	79	D	123	B	167	A	211	D
36	B	80	E	124	A	168	C	212	D
37	C	81	E	125	A	169	B	213	B
38	E	82	B	126	C	170	D	214	E
39	C	83	C	127	B	171	D	215	D
40	A	84	D	128	C	172	A	216	C
41	E	85	A	129	C	173	B	217	A
42	D	86	B	130	B	174	E	218	B
43	D	87	D	131	A	175	D	219	C

44	B	88	E	132	C	176	C	220	D
221	B	268	D	315	D	362	D	409	D
222	A	269	B	316	E	363	E	410	A
223	C	270	A	317	A	364	A	411	C
224	E	271	E	318	B	365	B	412	E
225	B	272	C	319	D	366	C	413	C
226	D	273	B	320	C	367	A	414	A
227	A	274	A	321	C	368	D	415	D
228	B	275	D	322	E	369	E	416	C
229	D	276	E	323	D	370	B	417	B
230	B	277	D	324	D	371	D	418	D
231	E	278	E	325	D	372	A	419	A
232	B	279	B	326	C	373	E	420	E
233	D	280	A	327	D	374	D	421	B
234	B	281	C	328	C	375	B	422	B
235	C	282	D	329	C	376	D	423	D
236	C	283	A	330	D	377	E	424	E
237	A	284	D	331	C	378	A	425	A
238	C	285	C	332	C	379	D	426	A
239	C	286	E	333	A	380	A	427	D
240	D	287	B	334	C	381	C	428	B
241	D	288	E	335	C	382	E	429	D
242	D	289	C	336	B	383	B	430	D
243	D	290	D	337	E	384	D	431	E
244	B	291	A	338	C	385	A	432	A
245	A	292	D	339	E	386	D	433	D
246	B	293	E	340	E	387	E	434	A
247	C	294	D	341	D	388	C	435	A
248	B	295	D	342	D	389	B	436	D
249	E	296	E	343	C	390	A	437	D
250	A	297	B	344	C	391	D	438	A
251	C	298	B	345	D	392	B	439	E
252	D	299	C	346	B	393	C	440	B
253	B	300	B	347	E	394	D	441	C
254	C	301	D	348	C	395	A	442	A
255	A	302	A	349	A	396	E	443	C
256	E	303	C	350	B	397	B	444	A
257	D	304	C	351	A	398	C	445	A
258	B	305	D	352	D	399	A	446	E
259	E	306	B	353	D	400	D	447	E
260	E	307	D	354	B	401	B	448	E
261	B	308	A	355	E	402	E	449	C
262	A	309	B	356	C	403	-	450	E
263	C	310	C	357	D	404	E	451	D
264	B	311	D	358	A	405	A	452	A
265	D	312	E	359	D	406	C	453	D
266	-	313	C	360	A	407	B	454	D
267	A	314	A	361	E	408	E	455	E
456	A	477	A	498	A	519	A	540	A

457	E	478	B	499	C	520	A	541	B
458	A	479	A	500	A	521	E	542	E
459	D	480	A	501	B	522	C	543	B
460	E	481	E	502	E	523	D	544	A
461	E	482	C	503	B	524	A	545	E
462	A	483	D	504	A	525	B	546	C
463	D	484	A	505	E	526	A	547	A
464	A	485	B	506	C	527	C	548	D
465	D	486	A	507	A	528	D	549	D
466	B	487	C	508	D	529	C	550	C
467	A	488	D	509	D	530	A	551	D
468	D	489	C	510	C	531	B	552	B
469	E	490	A	511	D	532	E	553	B
470	A	491	B	512	B	533	A	554	D
471	D	492	E	513	A	534	B	555	A
472	A	493	A	514	D	535	A	556	E
473	C	494	B	515	E	536	E	557	C
474	E	495	A	516	C	537	D	558	B
475	E	496	E	517	A	538	A	559	E
476	C	497	D	518	B	539	C	560	B
561	C	562	E	563	D	564	B	565	E
566	C	567	D	568	C	569	A	570	E
571	D	572	A	573	E	574	A	575	B
576	C	577	D	578	C	579	B	580	E
581	D	582	B	583	A	584	A	585	C
586	A	587	E	588	B	589	C	590	C
591	A	592	E	593	A	594	D	595	C
596	D	597	A						

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Актуальні питання гастроентерології: навч.-метод. посіб. / за ред. О. М. Біловола. – Вінниця : Нова книга, 2021. – 168 с.
2. Актуальні питання кардіології : навч.-метод. посіб. / за ред. О. М. Біловола. – Харків, 2021. –158 с.
3. Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Частина 1. Розділи 1-8: підручник/Л.В. Глушко, С.В. Федоров, І.М. Скрипник та ін. за редакцією Л.В. Глушка.–К.: ВСП «Медицина», 2019.-680 с.
4. Захворювання органів дихання в сімейній медицині: навчальний посібник / Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Л.В. Андріюк.–Київ : ВСП «Медицина», 2019. - 312 с.
5. Клінічна фармакологія : підручник / за ред. О. М. Біловола. – Вінниця : Нова Книга, 2021. – 544 с.
6. Клінічна фармація в пульмонології : навч. посіб. до практ. занять студентів 5 курсу фармац. ф-тів спец. «226 Фармація» / О. В. Крайдашенко, О. О. Свинтозельський, О. М. Главацький. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2021. – 164 с.
7. Клінічна фармація в кардіології та ревматології : навч. посіб. до практ. занять студентів 5 курсу фармац. ф-тів спец. «226 Фармація» / О. В. Крайдашенко, О. О. Свинтозельський. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2021. - 163 с.
8. Клінічна фармація в нефрології, гастроентерології, гепатології та алергології : навч. посіб. до практ. занять студентів 5 курсу фармац. ф-тів спец. «226 Фармація» / О. В. Крайдашенко, О. О. Свинтозельський. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2021. - 142 с.
9. Колот Е. Г. Лікарські засоби, що впливають на нервову та серцево-судинну системи: навч.-метод. Посіб. / Е. Г.Колот, Н. М. Дев'яткіна, Т.О.Дев'яткіна. – Полтава, 2019. – 155 с.
10. Методи діагностики в клініці внутрішньої медицини: навчальний посібник / А. С. Свінціцький [та ін.]. – Київ : ВСВ «Медицина», 2019.- 1008 с.
11. Неврологія: підручник / І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін.; а редакцією І.А. Григорової, Л.І. Соколової за ред.— 3-є (перероблене і доповнене) .–К.: ВСП «Медицина», 2020.-640 с.
12. Основні положення клінічної фармації та клінічної фармакології: навч. посіб. до практ. занять студентів 5 курсу фармац. ф-тів спец. «226 Фармація» / О. В. Крайдашенко, О. О. Свинтозельський, О. М. Главацький. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2021. – 187с.
13. Ревматологія: навчально-методичний посібник / за ред. О. М. Біловола. Харків : ТОВ “Планета-Прінт”, 2019. - 350 с.

14. Фармацевтична опіка під час відпуску безрецептурних лікарських препаратів загальні положення. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ЛП для симптоматичного лікування порушень діяльності нервової системи : навч. посіб. до практ. занять студентів 5 курсу фармац. ф-тів спец. «226 Фармація» / О. В. Крайдашенко, О. О. Свинтозельський. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2021. – 175 с.

15. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ЛП для симптоматичного лікування уражень шкіри, пацієнтів з місцевими розладами кровообігу: навч. посіб. до практ. занять студентів 5 курсу фармац. ф-тів спец. «226 Фармація» / О. В. Крайдашенко, О. О. Свинтозельський. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2021. – 125 с.

16. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ЛП для симптоматичного лікування розладів травлення та усунення вітамінної недостатності. Взаємодія ЛП з їжею та алкоголем: навч. посіб. до практ. занять студентів 5 курсу фармац. ф-тів спец. «226 Фармація» / О. В. Крайдашенко, О. О. Свинтозельський. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2021. – 139 с.

17. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ЛП для симптоматичного лікування застуди, суглобового та м'язового болю, болю голови: навч. посіб. до практ. занять студентів 5 курсу фармац. ф-тів спец. «226 Фармація» / О. В. Крайдашенко, О. О. Свинтозельський. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2021. – 167 с.

Додаткова

1. Rx index - Довідник еквівалентності лікарських засобів: спеціалізоване медичне видання для фахівців / за загальн. редакцією І.А. Зупанця, В.П. Черниха. – 2-ге вид. К.: Фармацевт Практик, 2018. – 848 с.

1. Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти /за редакцією акад. НАМН України Вороненка Ю. В. – К.: Видавець Заславський О. Ю., 2015. – 530 с.

2. Біологія тривалості життя і старіння / Голубев А. Г.// Видав. Н-Л, 2015. – 384 с.

2. Клінічна фармакологія невідкладних станів у практиці стоматолога: навчальний посібник (IV р. а.)/О.М. Біловол, Л.Р. Боброннікова, І.І. Вакалюк та ін.; за ред. О.М. Біловола. «Медицина» 2018, 296 с.

3. Клінічна фармакологія: навчальний посібник для практичних занять студентів 1 курсу медичних факультетів для підготовки магістрів галузі знань спеціальності «224 Технологія методів діагностики і лікування». О.В. Крайдашенко, Кремзер О.О. // Запоріжжя, ЗДМУ, 2021- 212 с.

4. Клінічні дослідження. Терміни та визначення : довідник / за заг. ред. В. М. Коваленка, І. А. Зупанця. — Харків : Золоті сторінки, 2016. — 340 с. (Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-18238 від 16.12.2015)

5. Пропедевтика внутрішньої медицини : підручник / Ю.І. Децик, О.Г. Яворський, Є.М. Нейко та ін. ; за ред. О.Г. Яворського. — 6-е вид. — К. : ВСВ «Медицина», 2020. — 552 с. + 12 с. кольор. вкл.

3. Фармакологія: підручник / І.В. Нековаль, Т.В. Казанюк. — 8-е вид. — К. : ВСВ «Медицина», 2018. — 552 с.

4. Фармакологія: підручник для студ.мед.ф-тів / Чекман І.С., Горчакова Н.О., Казак Л.І. [та ін.]; за ред. проф. І.С. Чекмана. Вид.4-те. Вінниця: Нова Книга, 2017. 784 с.

5. Фармакологія: практикум. Бобирьов В.М., Важнича О.М., Дев'яткіна Т.О. [та ін.]. Вінниця: Нова Книга, 2017. 352 с.

6. Фармакотерапія: підручник для студентів фарм. факультетів / Під ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба. — Вінниця: Нова книга, 2014. — 644 с.

7. Фармацевтична опіка: практичний посібник / І. Зупанець, В. Черних, С. Попов та ін.; за ред. І. Зупанця та В. Черниха. — Київ : Фармацевт Практик, 2018. — 232 с.

8. Goodman and Gilman's. The Pharmacological Basis of Therapeutics Medical; - McGraw-Hill Education.: 13 edition, 2017 - 1440 p.

Інформаційні ресурси

1. Державний реєстр лікарських засобів <https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-18042019--892-pro-zatverdzhennja-odinadcjatogo-vipusku-derzhavnogo-formuljara-likarskih-zasobiv-ta-zabezpechennja-jogo-dostupnosti>

2. Уніфіковані протоколи ведення хворих <https://guidelines.moz.gov.ua/>

3. www.Med-books.by

4. Австралійський бюлетень небажаних лікарських реакцій. <http://www.tga.health.gov.au/adr/aadrb.htm>.

5. Британський щомісячний бюлетень з безпечності застосування лікарських засобів. <http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.htm>.

6. Лекції для післядипломної освіти «Принципи клінічної фармакології» Клінічного центру Національного інституту здоров'я США. <http://www.cc.nih.gov/researchers/training/principles.shtml>.

7. Міжрегіональне товариство спеціалістів доказової медицини: <http://www.osdm.org/index.php>

8. Європейське товариство клінічних фармакологів і

фармакотерапевтів: <http://www.eacpt.org>

9. Ресурс з фармакогенетики. <http://www.pharmgkb.org/>.

10. On-line реєстрація небажаних лікарських реакцій на сайті FDA.
<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/medwatch-online.htm>.

11. Ресурс по взаємодії лікарських засобів:
<http://medicine.iupui.edu/flockart/>

12. Робоча група з фармакотерапії Європейського товариства кардіологів <https://www.escardio.org/>.