



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

«Запорізький фармацевтичний форум – 2025:

***Фармація майбутнього –
від сучасного стану до глобальних викликів»***

20–21 листопада 2025 р.



***Запоріжжя
2025***

Створення ефективного цифрового маркетингового шляху, що включає контент для самодіагностики, інтерактивні опитувальники та можливість дискретного придбання (онлайн-замовлення з доставкою), є ключовим для охоплення цільової аудиторії та переведення її з фази пошуку до фази лікування. Це також вимагає підготовки фармацевтів до надання кваліфікованої консультації як в онлайн, так і в очному режимах.

Висновки. Фармацевтичний маркетинг сучасних топічних протигрибкових препаратів має відійти від традиційної конкуренції виключно за діючою речовиною. Успішна стратегія диференціації будується на трьох взаємопов'язаних векторах:

1. Клініко-економічна перевага за рахунок підвищення комплаєнсу через короткі курси терапії та інноваційну технологію доставки.
2. Поведінкова перевага, що досягається завдяки підкресленню естетичних переваг та швидкого покращення якості життя пацієнта.
3. Стратегічна комунікація через використання дискретних цифрових каналів та посилення експертної ролі фармацевта.

Такі підходи дозволяють не тільки збільшити ринкову частку інноваційних продуктів, але й сприяють раціональному використанню протигрибкових засобів та зниженню ризику рецидивів у хворих.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ КОМБІНОВАНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ТЕРАПІЇ ВАГІНАЛЬНИХ КАНДИДОЗІВ

І. Пухальська¹, Г. Лисянська², Д. Сафронова³

*^{1,2,3}Запорізький державний медико-фармацевтичний університет (Запоріжжя, Україна)
wellirin@gmail.com¹, lyska1210@gmail.com²*

Вступ. Вульвовагінальний кандидоз є поширеним інфекційним ураженням слизової оболонки вульви та піхви, яке спричиняють гриби роду *Candida*. Мета роботи – обґрунтувати доцільність розробки комбінованих вагінальних м'яких засобів, які містять окрім протигрибкового компонента екстракційний фітозасіб.

Матеріали та методи. Проводили аналіз літературних даних щодо асортименту та складу засобів для вагінального застосування, які показані для терапії вагінальних кандидозів.

Результати. На сучасному фармацевтичному ринку лікарські препарати із групи G01 «Протимікробні і антисептичні засоби, що використовуються у гінекології» для місцевого застосування представлені, переважно, препаратами на основі клотримазолу, натаміцину, еконазолу, тріазолу, міконазолу, поліміксину, хлорхіналдолу, ністатину, кетоконазолу. Лікарські форми характеризуються певним різноманіттям і включають креми, гелі, вагінальні таблетки, супозиторії. При цьому за призначенням лікаря місцеве лікування може поєднуватися з пероральним прийомом ефірних олій, які перешкоджають розвитку інфекції, а також застосуванням фітотерапевтичних засобів вагінально.

Слід зазначити, що на ринку асортимент препаратів, які містять синтетичні антигрибкові компоненти та інгредієнти рослинного походження, дуже малочисельні. Прикладом можна навести Фоліаль супозиторії вагінальні, які містять полісахариди з алое вера, ефірні олії шавлії, чайного дерева, екстракт насіння грейпфрута, молочну кислоту, (виробник Biodue S.p.A., Італія) або Вагікаль супозиторії вагінальні, що містять *Calendula officinalis* 150 мг (виробник ФАРМІНА Лтд., Польща). В цілому, серед фітоскладових вагінальних препаратів можна відзначити ефірні олії чайного дерева, чабрецю, екстракти шавлії, чабрецю, календули, ромашки, евкаліпту, алое вера. Перспективним у терапії запальних захворювань можна зазначити препарати сосни, наприклад, у формі екстракту як натуральний засіб для підвищення захисних сил організму, який характеризується імуномодуляторним та антиоксидантним ефектами, має спазмолітичну і бактерицидну дію на патогенні грампозитивні мікроорганізми.

Висновки. Препарати для місцевого використання, що застосовуються у терапії вагінальних кандидозів, представлені переважно синтетичними лікарськими засобами, а препарати рослинного походження та комбіновані препарати дуже малочисельні, що створює чіткі перспективи для розробки нових засобів із фітоскладовою.

Література:

1. Гаспарян К. А. Бактеріальний вагіноз та вульвовагінальний кандидоз у жінок репродуктивного віку з надлишковою масою тіла та ожирінням (огляд літератури). Перинатологія і Педіатрія. 2021. 3 (87). С. 70-76.

2. Пучкан Л. А., Фуклева Л. А. Дослідження ринку та пошук нових фітопрепаратів вагінальної терапії в Україні. Science and Life. 2017. №81. С. 623-630.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

С. Рижкова¹, Н. Ткаченко²

*^{1,2}Запорізький державний медико-фармацевтичний університет (Запоріжжя, Україна)
seta.rigkova@gmail.com¹, tkachenkonat2@gmail.com²*

Розсіяний склероз (РС) становить одне з найпоширеніших хронічних неврологічних захворювань, яке переважно вражає осіб молодого працездатного віку. За глобальними оцінками, з цим патологічним станом співіснує понад 2,9 млн осіб. Захворювання характеризується аутоімунним генезом, супроводжується прогресивним ушкодженням мієлінової оболонки нервових волокон і зумовлює розвиток широкого спектра клінічних проявів - від сенсорних дисфункцій та зорових порушень до моторних, когнітивних і психоемоційних розладів.

Сучасні терапевтичні стратегії забезпечують ефективний контроль перебігу РС, проте не гарантують повної ремісії, що акцентує необхідність безперервної медичної та фармацевтичної підтримки. У цьому контексті особливо актуальним є долучення фармацевтів до постійного супроводу пацієнтів із хронічними захворюваннями, зокрема РС, а також інтеграція в аптечну практику спеціалізованої фармацевтичної послуги, включаючи фармацевтичний супровід хворих на РС, задля оптимізації терапевтичної адгезії, моніторингу побічних ефектів та підвищення якості життя таких пацієнтів.

Метою дослідження став аналіз сучасного стану фармацевтичної допомоги (ФД) пацієнтам із РС в Україні, ідентифікація проблемних аспектів та окреслення перспектив її вдосконалення.

Матеріалами дослідження слугували результати соціологічного опитування 121 пацієнта з РС. У дослідженні використовувалися методи наукового інформаційного пошуку, наративний підхід, узагальнення, опитування, статистичний аналіз та інші.

За результатами опитування визначено, що пацієнти з розсіяним склерозом усвідомлюють потребу у ФД, проте демонструють недостатній рівень інформованості щодо її потенційних можливостей. Більшість респондентів (64,5%) висловили бажання отримувати додаткову підтримку від фармацевтів, тоді як майже 25 % вагалися, не розуміючи повною мірою потенціалу ФД. Ці дані підкреслюють необхідність інтенсифікації просвітницької діяльності серед пацієнтів та медичної спільноти, а також актуальність розширення ролі фармацевтів у системі охорони здоров'я, зокрема в межах мультидисциплінарного підходу.

Аналіз прихильності пацієнтів із РС до ФД (лише 11 % відмовилися від її отримання) не виявив статистично значущого впливу таких факторів, як вік, стать, місце проживання, статус тимчасово переміщеної особи, обмеження працездатності чи тривалість від моменту встановлення діагнозу, на їхню впевненість у необхідності ФД, а також на преференції щодо формату взаємодії з фармацевтом (живе консультування, змішаний формат, телефармація). Водночас працюючі респонденти виявили більшу стриманість у сприйнятті ФД, а студенти та

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КІЛЬКІСНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ВВЕДЕНИХ КОМПОНЕНТІВ ДО СКЛАДУ АЕРОЗОЛЮ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАНОВИХ ІНФЕКЦІЙ	113
<i>М. Попова, О. Салій, В. Страшний</i>	
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ	114
<i>О. Посилкіна, М. Дабіжса</i>	
СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ ПЕРСОНАЛУ, ЯК ОСНОВА КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ	115
<i>О. Посилкіна, А. Лісна</i>	
КЛІНІКО-МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СУЧАСНИХ ТОПІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ МІКОЗУ СТОП НА ОТС-РИНКУ	116
<i>Р. Притула, І. Бушуєва</i>	
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ КОМБІНОВАНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ТЕРАПІЇ ВАГІНАЛЬНИХ КАНДИДОЗІВ	117
<i>І. Пухальська, Г. Лисянська, Д. Сафронова</i>	
ФАРМАЦЕВТИЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.....	118
<i>С. Рижкова, Н. Ткаченко</i>	
ІШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА КОГНІТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ДО ІНТЕГРОВАНОГО ТЕСТОВОГО ІСПИТУ КРОК СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ФАРМАЦІЯ»	119
<i>О. Рижов</i>	
МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ФЕКСОФЕНАДИНУ В ОБ'ЄКТАХ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ	121
<i>С. Романова, М. Михалків, І. Івануса, Я. Яцюк</i>	
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІСАХАРИДІВ ТРАВИ ВІВСУ ПОСІВНОГО СОРТІВ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ	122
<i>А. Рудник, О. Хворост, Ю. Федченкова</i>	
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ.....	123
<i>З. Рябоконт, С. Соловійов</i>	
ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА УФ-ФІЛЬТРІВ У СКЛАДІ СОНЦЕЗАХИСНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ШКІРИ, СХИЛЬНОЇ ДО АКНЕ	124
<i>Т. Савицька</i>	
IN SILICO АНАЛІЗ ТОКСИЧНОСТІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ 3- (АЛКІЛТІО)-N-(4-ФТОРБЕНЗИЛ)-5-(ТІОФЕН-2-ІЛМЕТИЛ)-4Н-1,2,4-ТІАЗОЛ-4-АМІНІВ	125
<i>А. Сафонов, В. Шульга</i>	
ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ АПТЕК <u>3</u> УРАХУВАННЯМ ВИКЛИКІВ ВОЄННОГО ЧАСУ	126
<i>О. Севрюков</i>	
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ.....	127
<i>О. Семенов, О. Заліська</i>	
АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ І НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ НА ПРЕДМЕТ АКТУАЛЬНОГО СКЛАДУ РЕЦЕПТІВ.....	128
<i>О. Серебрякова</i>	
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ТОПІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ	129
<i>І. Скупий, О. Литвиненко, С. Гладішева</i>	
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ЖИРНИХ КИСЛОТ У ТРАВІ ПОРТУЛАКУ ВЕЛИКОКВІТКОВОГО .	130
<i>Л. Слободянюк, Н. Оленюк</i>	