



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

**IV Всеукраїнської науково-практичної конференції
«МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ,
ГІНЕКОЛОГІЇ, КОСМЕТОЛОГІЇ ТА ЕСТЕТИЧНІЙ МЕДИЦИНІ»**

27 листопада 2025 р.



**Запоріжжя
2025**

ЗМІСТ

Макуріна Г.І., Чорненька А.С.	6
ФОТОДИНАМІЧНА ТЕРАПІЯ В КОРЕКЦІЇ ВІКОВИХ ЗМІН ШКІРИ У ЖІНОК	
Сюсюка В. Г., Макуріна Г.І., Синах О.К.	9
КЛІМАКТЕРИЧНА КЕРАТОДЕРМІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ КОРЕКЦІЇ	
Дузенко В.В., Москаленко О.М.	12
ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК ЯК ІМІТАТОР ЗАПАЛЬНИХ ДЕРМАТОЗІВ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)	
Городокіна Л.О.	15
ПОРУШЕННЯ СЛУХУ ПРИ ПСОРИАЗІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ: ПРУРИГІНОЗНА ЧИ ПСИХОСОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА	
Городокін А.Д.	18
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВ'ЯЗКУ АПЕТИТУ ТА ВІСЦЕРАЛЬНОЇ СЕНСИТИВНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ З СИНДРОМОМ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКА	
Яценко А.Р., Міхневич О.В.	21
ЛІКУВАННЯ РУБЦІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КРЕМУ НАТРІЄВА СІЛЬ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ 0,2%	
Ганжий І. Ю., Шаповал О. С.	23
КОНТРАЦЕПЦІЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ	
Лакно І. В., Коровай С. В., Дьоміна О. В., Сикал І. М., Ромаєва В. П., Шаповал Д. М., Пак С. О.	27
МОЖЛИВОСТІ ПРЕНАТАЛЬНОГО СКРИНІНГУ ВАГІТНИХ	

ЛІКУВАННЯ РУБЦІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КРЕМУ НАТРІЄВА СІЛЬ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ 0,2%

Яценко А. Р.

викладач-стажист кафедри дерматовенерологія та естетичної медицини,
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Міхневич О. В.

заступник директора клініки з поліклінічної роботи,
ННМЦ «Університетська клініка» ЗДМФУ

Актуальність Формування рубців є природним етапом репаративного процесу шкіри після травм, хірургічних втручань, опіків чи дерматологічних захворювань. Проте надмірна проліферація фібробластів і нерегульований синтез колагену можуть призводити до утворення гіпертрофічних та келоїдних рубців, що мають естетичні та функціональні наслідки. Своєчасне й адекватне місцеве лікування сприяє оптимізації процесу загоєння та профілактиці патологічного рубцювання.

Матеріалит та методи У дослідження було включено 22 пацієнтів віком від 20 до 60 років, які мали післяопераційні, посттравматичні рубці. Крем з вмістом натрієвої солі гіалуронової кислоти 0,2%, наносили 2 рази на добу на чисту поверхню рубця протягом 8 тижнів. Оцінювали динаміку загоєння, суб'єктивні відчуття (свербіж, стягнутість, гіперчутливість) та зовнішній вигляд рубців за шкалою Vancouver Scar Scale (VSS).

Результати Вже через 2–3 тижні регулярного застосування спостерігалось зменшення еритеми, покращення еластичності шкіри та зниження суб'єктивних скарг. У 80-90 % пацієнтів відзначено значне пом'якшення рубців та вирівнювання поверхні. Крем добре переносився, випадків подразнення чи алергічних реакцій не зафіксовано.

Висновки Крем з вмістом натрієвої солі гіалуронової кислоти 0,2% є ефективним засобом у лікуванні рубців завдяки вмісту гіалуронової кислоти та допоміжних компонентів, які звожують шкіру, стимулюють регенерацію та покращують якість формування рубцевої тканини. Засіб доцільно застосовувати як на етапі раннього загоєння, так і при догляді за сформованими рубцями в рамках комплексної терапії.