

Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Національна академія медичних наук України
Державний експертний центр МОЗ України
Державна служба України з лікарських засобів
Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України
Харківська обласна державна адміністрація
Харківська міська рада
Національний фармацевтичний університет
Аптечна професійна асоціація України
Міжнародний благодійний фонд сприяння розвитку медичної
та фармацевтичної науки і освіти «Ланцет»
Європейський директорат з якості ліків та медичної допомоги
Європейське товариство клінічної фармації

Клінічна фармація: 20 років в Україні

МАТЕРІАЛИ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ

(Харків, 21–22 березня 2013 року)

Харків
2013

**ФАРМАКОЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
АНТИДЕПРЕСАНТІВ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ,
ЗАЛЕЖНИХ ВІД ОПІОЇДІВ**

О.С. ЯКОВЛЕВА

Запорізький державний медичний університет,
м. Запоріжжя, Україна

Мета роботи: фармакоекономічна оцінка схем лікування хворих, залежних від опіоїдів.

Методи дослідження: Об'єктами дослідження були схеми лікування, які передбачали призначення комплексної терапії хворим, залежним від опіоїдів (схема № 1) та у її складі застосування амітриптиліну (схема № 2) або ципрамілу (схема № 3). При проведенні дослідження використовувався метод фармакоекономічного аналізу «вартість-ефективність». В якості показника ефективності лікування нами було обрано тривалість міжгоспітального періоду. Зазначений показник та схеми лікування були взяті з результатів клінічного дослідження, яке проводилось українськими вченими Самойловою О.С. та Лінським І.В. на базі відділу профілактики і лікування наркоманій Інституту неврології, психіатрії та наркології Академії медичних наук України (2008 р.).

Результати: Згідно клінічних протоколів надання медичної допомоги нами були проаналізовані витрати, які пов'язані з перебуванням на стаціонарному лікуванні хворих, залежних від опіоїдів. При застосуванні схеми № 1 витрати на надання допомоги складають 4853,33 грн., схеми № 2 – 4866,06 грн., схеми № 3 – 5023,20 грн. Необхідно відзначити, що при застосуванні схеми № 1 тривалість міжгоспітального періоду склалася 168 днів, схеми № 2 – 228 днів, схеми № 3 – 420 днів. За

результатами розрахунків встановлено, що меншою вартістю одиниці ефективності характеризується схема № 3, показник витратної ефективності якої складає 11,96 грн./ *Ef* .

Висновки: Враховуючи соціальну значущість наркоманії призначення антидепресантів у складі комплексної терапії хворих, залежних від опіоїдів є фармакоекономічно обґрунтованим.

Анализ распространенности хронического и неуточненного бронхита, эмфиземы по регионам республики Узбекистан <i>Н.Д. Суюнов, М.Б. Амирова</i>	446
Прогноз динамики распространенности хронического и неуточненного бронхита, эмфиземы по регионам республики Узбекистан <i>Н.Д. Суюнов, М.Б. Амирова, Н. Мاستибек</i>	448
Поширеність герпесвірусних інфекцій у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки <i>Т.В. Трезуб, С.Б. Стречень, Г.Г. Відавська, А.П. Жебречук</i>	450
Оцінка якості фармакотерапії в процедурі акредитації закладів охорони здоров'я <i>А.Л. Федущак</i>	451
Локальні протоколи медичної допомоги у стаціонарному лікуванні хірургічних хворих <i>О.А. Федущак</i>	453
Проблеми законодавчого регулювання організації медичної та фармацевтичної допомоги хворим на гемобластози в Україні <i>О.В. Цурікова, Г.Л. Панфілова, М.Г. Чигринова</i>	455
Брендові та генеричні препарати натрію лікосульфату на фармацевтичному ринку України <i>В.К. Яковенко, М.С. Вишневецька</i>	457
Аналіз споживання антибіотиків групи карбапенемів в Україні <i>Л.В. Яковлева, Н.В. Бездітко, Н.О. Матяшова</i>	458
Частотний/VEN-аналіз фармакотерапії позалікарняної пневмонії у дітей <i>Л.В. Яковлева, О.О. Герасимова, І.Е. Кузнєцов, Т.П. Кривопуск</i>	460
Клинико-экономическая оценка применения препарата, созданного на основе эпидермального фактора роста человека, у больных синдромом диабетической стопы <i>Л.В. Яковлева, О.Н. Кириченко</i>	462
Фармакоеконімічні дослідження лікування хворих на шизофренію у психоневрологічному диспансері м. Києва <i>Л.В. Яковлева, І.С. Мукомел, А.О. Васильєва</i>	463
Фармакоеконімічні дослідження ефективності використання антидепресантів у лікуванні хворих, залежних від опіоїдів <i>О.С. Яковлева</i>	465