

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
АСОЦІАЦІЯ ІНФЕКЦІОНІСТІВ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ім. І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

ПРИРОДНО-ОСЕРЕДКОВІ ІНФЕКЦІЇ

**Матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції
інфекціоністів**

(17-18 травня 2012 року, м. Ужгород)

Тернопіль
ТДМУ
Укрмедкнига
2012

другого місяця особливої різниці у кількості захворілих не зареєстровано – 80 і 77 хворих, але на третій місяць кількість захворілих в основній групі була меншою, ніж у контрольній – 17 і 29 осіб. Протягом двох перших місяців спостереження в структурі осіб, які захворіли, переважали ті, хто до призову хворів по 1-2 рази, на 3-ій місяць захворіли ті, хто хворів 3 рази і більше. Ці молоді люди були призвані з Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

О.В. Усачова

**ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРЕКЦІЇ НЕСПРИЯТЛИВОГО ВПЛИВУ
ГОСТРИХ ФОРМ ГЕРПЕСВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ
І НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ**

Медичний університет, м. Запоріжжя

З інфікуванням цитомегаловірусами (ЦМВ) та іншими герпесвірусами (ГВ), хронічним перебігом цих інфекцій або їх реактивацією та реінфекцією пов'язують патологічний перебіг вагітності, пологів й неонатального періоду, що обумовлено ураженням як окремих структур плаценти, так і самого плоду.

Мета роботи: оцінити ефективність лікування вагітних з гострими формами герпесвірусних інфекцій на підставі аналізу впливу цих хвороб на перебіг вагітності, пологів і неонатального періоду в інфікованих ГВ 1-го, 2-го типів і ЦМВ на тлі проведеної комбінованої терапії специфічними імуноглобулінами і хофітолом.

Для реалізації мети проаналізовано медичну документацію 79 вагітних, які спостерігалися в медичних закладах м. Запоріжжя і вагітність яких завершилася пологами. Усі жінки були обстежені клініко-лабораторно у динаміці згідно з протоколами спостереження за вагітними, в їх крові за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) визначали рівні специфічних до ЦМВ та ГВ 1-го і 2-го типів IgM. Спостереженню підлягали й діти, народжені ними, впродовж перебування в пологовому будинку. Було також проаналізовано результати морфологічного дослідження усіх плацент.

За результатами специфічного імунологічного дослідження у 56 жінок встановлено наявність гострої первинної чи реактивованої форми герпесвірусних захворювань. 35 вагітним проведено лікування специфічним імуноглобуліном для внутрішньом'язового введення і хофітолом, згідно з інструкцією для застосування препаратів (1-ша група). Інші 21 вагітна комбінованого лікування не отримували (2-га група). Ще 23 пацієнтки без клініко-лабораторних ознак гострого перебігу герпесвірусних захворювань склали контрольну групу.

Аналіз отриманих статистичних даних показав, що наявність гострої форми інфекції, спричиненої ГВ 1-го, 2-го типів чи ЦМВ, асоціюється з високою частотою сонографічних маркерів ураження не лише плаценти, але й плоду, а також з розвитком проявів передчасного переривання вагітності – третина малюків (33,3%), народжених жінками, які мали гострі форми герпесвірусних інфекцій, були недоношеними ($p < 0,05$ щодо контролю та 1-ї групи). Найбільш частим морфологічним проявом ураження плаценти був децидуїт, який поширювався не лише на базальну і децидуальну пластини, але й мав дифузний характер. Про залучення до патологічного процесу судин плаценти свідчила висока частота реєстрації ангіопатичних змін з боку її оболонок. Тільки у 6 з 21 обстеженої вагітної цієї групи були винятково закономірні інволюційні змін морфологічної структури плаценти – проти 17 з 23 у контролі ($p < 0,05$).

Також відмічено, що діти матерів, які в період вагітності перенесли гострі форми зазначених герпетичних інфекцій, частіше народжувалися в стані дезадаптації, у них з перших днів життя з'являлась жовтяниця, яка часто мала тяжкий перебіг. Патологічні стани періоду новонародженості суттєво впливали на тривалість перебування дитини у пологовому будинку і більше половини дітей – 13 з 21 проти 5 з 35 у 1-ій групі і 6 з 23 – у контролі ($p < 0,05$) були виписані з пологового будинку після 5-ї доби життя.

Проведення комплексної терапії специфічними імуноглобулінами і хофітолом вагітним з гострими формами герпесвірусних інфекцій позитивно відбивалося як на перебігу вагітності, так і на стані плаценти, а також нівелювало дезадаптивні зміни у новонароджених – частота відповідних станів у цій групі статистично не відрізнялася від контролю.

<i>Н.О. Тімко, І.І. Мартинюк</i> ОПИС ВИПАДКУ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ГЕПАТИТ Е У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2011 р.	304
<i>В.О. Терьошин, Н.І. Хомулянська, О.В. Круглова, І.В. Декалюк</i> ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНТЕРОСОРБЦІЇ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ГОСТРІ КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ, СПРИЧИНЕНІ УМОВНО-ПАТОГЕННИМИ ЗБУДНИКАМИ.....	306
<i>Л.В. Тимофеева, Л.О. Українець, Л.П. Іващенко, А.І. Невпряга</i> КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ХВОРОБИ ВІД УКУСУ ЩУРА (СТРЕПТОБАЦИЛЯРНА ГАРЯЧКА)	308
<i>С.О. Ткаченко, М.С. Зіміна</i> ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕРЛЕЙКІНОГЕНЕЗУ ПРИ ЕШЕРИХІОЗІ В ДІТЕЙ З ФОНОВИМ ІНФІКУВАННЯМ <i>H. PYLORI</i> І БЕЗ НЬОГО.....	310
<i>В.І. Трихліб, В.Ф. Сморгунова, Л.В. Козаченко, О.В. Радченко, Я.Б. Савченко</i> ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТЕФЛАЗИДУ З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ВІЙСЬКОВО- СЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ	311
<i>О.В. Усачова</i> ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРЕКЦІЇ НЕСПРИЯТЛИВОГО ВПЛИВУ ГОСТРИХ ФОРМ ГЕРПЕСВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ І НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ.....	313
<i>О.В. Усачова, І.Б. Іванова, Н.І. Волошина</i> СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ І МОДИФІКАЦІЇ СПЕЦИФІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТОКСОПЛАЗМОВОГО ТА ГЕРПЕСВІРУСНОГО УРАЖЕННЯ ОРГАНУ ЗОРУ	315
<i>О.В. Усачова, Т.М. Пахольчук, Є.А. Сіліна, Т.Б. Матвєєва, І.В. Берестова, А.В. Штіблер, В.А. Турлюн</i> КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРИХ КИШКОВИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ З ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ	316
<i>Л.О. Ушеніна, В.О. Туманський, А.В. Абрамов, О.В. Рябоконт</i> ЗМІНИ ІМУНО-ЕНДОКРИННИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С З ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ ПРИ РІЗНИХ СТУПЕНЯХ ФІБРОЗУ І СТЕАТОЗУ ПЕЧІНКИ	318
<i>В.М. Фролов, М.О. Пересадин, Л.П. Антонова, Д.В. Тищенко</i> ОЦІНКА ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНТЕРОСОРБЦІЇ У ХВОРИХ З ТЯЖКИМ ПЕРЕБІГОМ ГОСТРОГО ТОНЗИЛІТУ БАКТЕРІЙНОЇ ЕТІОЛОГІЇ.....	320