

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДУ "ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ Л.Т. МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ"
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Матеріали
науково-практичної конференції
з міжнародною участю

**ЩОРІЧНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ:
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ ТЕРАПІЇ,**

присвяченої пам'яті академіка Л.Т. Малої

25-26 квітня 2013 року

Харків
2013

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С ПРИЗНАКАМИ НЕКЛАССИФИЦИРУЕМОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Доценко Н.Я., Боев С.С., Шехунова И.А.

*ГЗ “Запорожская медицинская академия последипломного образования
МЗ Украины”*

Цель исследования: сравнить уровень качества жизни (КЖ) у взрослых пациентов с АГ с фенотипическими и висцеральными признаками некласифицируемой дисплазией соединительной ткани (НДСТ).

Материалы и методы. Обследовано 38 больных с АГ 2-3 степени, (средний возраст – $(46,35 \pm 0,9)$ лет). НДСТ диагностировано у 18 пациентов. Длительность АГ в среднем составила $(8,61 \pm 0,76)$ года. Пациенты получали сопоставимое антигипертензивное лечение. КЖ оценивали с помощью обновленного опросника EuroQol-5D до и спустя 3 месяца после лечения.

Результаты. Получены различия показателей КЖ в зависимости от наличия признаков НДСТ. Так, выраженная степень ощущения боли/дискомфорта регистрируется только у больных с АГ без признаков НДСТ. И наоборот: ощущения тревоги/депрессии выраженной степени наблюдались только у лиц с АГ и признаками НДСТ. По шкале ВАШ пациенты без признаков НДСТ оценили свое состояние здоровья более высоко – на $(75,0 \pm 2,3)$ баллов, а при наличии признаков НДСТ – на $(68,0 \pm 2,5)$ баллов ($p < 0,05$). Спустя 3 месяца пациенты с АГ без признаков НДСТ отметили улучшение КЖ по сравнению с исходными данными. Параметры шкалы «самообслуживание» не изменились (остались на уровне «0»). Зарегистрирована положительная динамика по всем шкалам, в наибольшей степени по шкале «боль/дискомфорт», поскольку в ней исчезли выраженные проявления ($p < 0,05$ для обеих групп). Отмечается положительная динамика по шкале «тревога/депрессия», хотя умеренные симптомы все равно отмечались более чем у половины исследуемых. Исключение составила шкала «боль/дискомфорт», показатели которой не изменились по сравнению с исходными. И наоборот, показатели шкалы «тревога/депрессия» существенно снизились ($p < 0,05$) за счет того, что исчезли выраженные проявления. По шкале ВАШ оценили свое состояние на $(84,0 \pm 2,1)$ балла (различия относительно исходных данных $p < 0,05$, между группами разница недостоверна) пациенты без НДСТ, а пациенты с НДСТ на $(73,0 \pm 2,2)$ балла ($p < 0,05$ относительно исходного уровня, относительно пациентов без НДСТ после лечения – $p < 0,05$).

Выводы. 1. Среди лиц с АГ и НДСТ пониженное восприятие здоровья, встречалось чаще, чем у больных с АГ без признаков НДСТ. Наибольшее влияние на снижение КЖ оказывало ощущение тревоги/депрессии. И, наоборот, по сравнению с пациентами без признаков НДСТ у них меньше выражено ощущение боли/дискомфорта. 2. Через три месяца после стационарного лечения зафиксировано улучшение показателей КЖ, наиболее выраженное в группе больных без НДСТ.

**ФОСФОЛИПИДНЫЙ СПЕКТР МЕМБРАН ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
РЕНОКАРДИАЛЬНОМ СИНДРОМЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕРАПИИ**

Демихова Н.В.

Сумский государственный университет, Украина 98

**СТАН ГЕМОДИНАМІКИ ТА ФУНКЦІЇ НИРОК У ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ
НЕФРОПАТІЮ ТА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З НАДЛИШКОВОЮ
МАСОЮ ТІЛА**

Денисенко В.П., Топчий І.І., Кірієнко О.М., Дунаєвська М.М., Мазій В.В.

ДУ “Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, м. Харків..... 99

**ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ПАРАМЕТРІВ У ХВОРИХ
З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК**

Деркач З.В.

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна..... 100

**ПОКАЗНИКИ ЛІВИХ ВІДДІЛІВ СЕРЦЯ У ПАЦІЄНТІВ З ПЕРСИСТУЮЧОЮ
ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ ДО ТА ПІСЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ КАРДІОВЕРСІЇ**

Дзяк Г.В., Васильєва Л.І., Сапожниченко Л.В., Калашникова О.С.,

Писаревська К.О.

ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України” 101

**КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С
ПРИЗНАКАМИ НЕКЛАССИФИЦИРУЕМОЙ ДИСПЛАЗИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ**

Доценко Н.Я., Боев С.С., Шехунова И.А.

ГЗ “Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины”... 102

**ЦИТОМОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПІТЕЛІЇ СЛИЗОВОЇ
ОБОЛОНКИ ЯСЕН У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ**

Ємельянова Н.Ю., Гальчінська В.Ю., *Назарян Р.С.,

Єфімова Н.В., Шапкін А.С.

ДУ “Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, м. Харків,

*Харківський національний медичний університет..... 103

**ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗИСТЕНТНОСТІ ВИДІЛЕНИХ ШТАМІВ
M.TUBERCULOSIS НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ**

Єременчук І.В.

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна..... 104

**ВМІСТ ЛІПІДІВ КРОВІ ЗА УМОВ РІЗНОЇ ВИРАЖЕНОСТІ РЕАКТИВНОЇ ТА
ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБАМИ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ**

Жакун В.М., *Жакун І.Б.

Комунальний заклад “Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня”,

*Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна..... 105

**ЗМІНИ БІОХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБАМИ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ ПІД ВПЛИВОМ РІЗНИХ МЕТОДІВ ТЕРАПІЇ**

Жакун І.Б.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна..... 106