

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДУ "ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ Л.Т. МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ"
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Матеріали
науково-практичної конференції
з міжнародною участю

**ЩОРІЧНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ:
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ ТЕРАПІЇ,**

присвяченої пам'яті академіка Л.Т. Малої

25-26 квітня 2013 року

Харків
2013

ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Голдовский Б.М., Сериков К.В., Лёвкин О.А., Юрчак Ю.В.,
Филимонова И.В., Кива Е.В.

*ГЗ “Запорожская медицинская академия последипломного образования
МЗ Украины”*

Цель тромболитической терапии (ТЛТ) – быстрое восстановление перфузии крови в окклюзированном сосуде.

Общее признание необходимости проведения ТЛТ при остром инфаркте миокарда (ОИМ) произошло лишь после 1989 года, когда было достоверно доказано, что в основе этого заболевания в 80-95 % случаев лежит коронарный тромбоз.

В целом тромболизис наиболее эффективен в первые 1-3 ч. (ранний тромболизис), а выполненный через 3-6 ч. дает уже меньший прирост выживаемости, но и через 6-12 ч. после окклюзии тромболизис небесполезен, особенно если сохраняются **боль в груди** и подъем **сегмента ST** в тех отведениях, где еще нет патологических **зубцов Q**. Проведение тромболизиса при остром коронарном синдроме (ОКС) без стойкого подъема сегмента ST (или с инверсией зубца T, или с отсутствием изменений на ЭКГ) не показано. Тромболизис, проведенный в первый час после **окклюзии**, может снизить больничную летальность почти вдвое и существенно уменьшить смертность в течение года. Это достигается за счет ограничения зоны инфаркта и уменьшения числа осложнений: разрыва межжелудочковой перегородки, кардиогенного шока и угрожающих жизни желудочковых аритмий. Эффективность ТЛТ при ОИМ обусловлена ранним восстановлением проходимости инфаркт обусловившей коронарной артерии. Это так называемая гипотеза открытой артерии.

На догоспитальном этапе в г. Запорожье ТЛТ проведена впервые в 2009 р. с использованием препарата «Метализе» при содействии представительства фармакологической компании “Берингер Ингельхайм”.

Таким образом, тромболитическая терапия способна уменьшить летальность среди пациентов с ОКС или развивающемся инфаркте миокарда приблизительно на 20-25 % по сравнению с другими консервативными методами лечения, а также должна стать стандартом терапии больных с ОКС со стойкой элевацией сегмента ST на догоспитальном этапе.

ЛІКАРСЬКО-ІНДУКОВАНІ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ. СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ Глушко Л.В., Кулаєць В.М. ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”, Україна.....	80
ВОЗДЕЙСТВИЕ АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА Глушко А.С., Цветков В.А. ГУ “Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского”, г. Симферополь, Украина.....	81
SIRS У ХВОРИХ З ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ Голдовський Б.М., Сідь Є.В., Поталов С.О., Юрчак Ю.В., *Ткаліч І.В., **Ратушняк Н.П. ДЗ “Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України”, *Запорізький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер, **Запорізька міська клінічна багато профільна лікарня № 9.....	82
АНАЛІЗ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ. НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ В ПРАКТИЧНІЙ МЕДИЦИНІ У ХВОРИХ З ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ Голдовський Б.М., Сідь Є.В., Поталов С.О., Юрчак Ю.В., *Ткаліч І.В., **Ратушняк Н.П. ³ ДЗ “Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України”, *Запорізький обласний лікарсько-фізкультурний диспансер, **Запорізька міська клінічна багато профільна лікарня № 9.....	83
РОЛЬ АНАЛИЗА ВАРІАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ Голдовский Б.М., Сериков К.В., Лёвкин О.А., Юрчак Ю.В., Филимонова И.В., Настека Н.В. ГЗ “Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины”...	84
ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ Голдовский Б.М., Сериков К.В., Лёвкин О.А., Юрчак Ю.В., Филимонова И.В., Кива Е.В. ГЗ “Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины”...	85
ВЛИЯНИЕ L-АРГИНИНА И ДИПЕПТИДА ЛИЗИН-ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА НА КОРРЕЛЯЦИЮ СЛОЯ ПЕРИПАПИЛЛЯРНЫХ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН В НИЖНЕМ КВАДРАНТЕ И В СЕКТОРЕ 19/17 ЧАСОВ У БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ Гончарь Е.Н., Панченко Н.В. Харьковский национальный медицинский университет, Украина.....	86
МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З ОЖИРІННЯМ Гопцій О.В., Степанова О.В., *Ситник К.О. Харківський національний медичний університет, *ДУ “Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”, м. Харків.....	87