



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

**КООРДИНАЦІЙНА РАДА З НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ,
ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
СТУДЕНТСЬКА РАДА**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**86 ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

**«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ - 2026»**

14-15 травня 2026 року



ЗАПОРІЖЖЯ – 2026

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ: ВПЛИВ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ (ЗА AF-QoL)	59
<i>Литвиненко Р.В.</i>	
КОМБІНОВАНА ТЕРАПІЯ ІТОПРИДОМ ТА ІПП ЗМЕНШУЄ КАРДІОРЕСПІРАТОРНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ПОКРАЩУЄ ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПРИ ГЕРХ	61
<i>Петріщев В.В.</i>	
РАННЯ АМБУЛАТОРНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА	62
<i>Сеник А.Р.</i>	
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ ХРОНІЧНОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ У ЖІНОК МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВІКУ	63
<i>Солдатов Я.С.</i>	
ОЦІНКА РИЗИКУ СИНДРОМУ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЕ СНУ ТА РІВНЯ ДЕННОЇ СОНЛИВОСТІ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ЕКСТРЕННИХ СЛУЖБ	64
<i>Бейреш Є.В. , Супрун Т.І.</i>	
ОФТАЛЬМОЛОГІЯ	66
ХРОНІЧНИЙ ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТРЕС У СТУДЕНТІВ – МЕДИКІВ ЯК ТРИГЕР ПОРУШЕННЯ ЦИРКАДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЗОРОВОЇ СИСТЕМИ	66
<i>Матлюк М. П., Антонець М.М.</i>	
ВИКОРИСТАННЯ СИРОВАТОК ДЛЯ РОСТУ ВІЙ З ПРОСТАГЛАНДИНАМИ І ЇХ ВПЛИВ НА ОЧІ	67
<i>Корнута М.А.</i>	
НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ, МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ.....	69
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕЖИВАННЯ ВТРАТ ПІД ЧАС ВІЙНИ: МЕХАНІЗМИ ГОРЮВАННЯ ТА ОСОБИСТІСНОЇ АДАПТАЦІЇ.....	69
<i>Стахоряк Н.М.</i>	
ASSESSMENT OF PERCEIVED STRESS LEVELS AMONG MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS DURING THE EXAMINATION PERIOD	69
<i>Radlovska Y.V., Tarasova E.V.</i>	
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДИТЯЧОМУ ВІСІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ ТА NMOSD	71
<i>Ростикус З.В.</i>	
НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ ТА ПРЕДИКТОРИ КОГНІТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЮ ЕПІЛЕПСІЄЮ	72
<i>Петлюк А.В., Кайданович Є.І.</i>	
НОВІ СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ЛІКУВАННІ МНОЖИННОГО СКЛЕРОЗУ	73
<i>Гаманіна А. О., Співавтор: Голян Н. В.</i>	
КЛІНІКО-ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАС З РАННІМ БУЛЬБАРНИМ ДЕБЮТОМ	74
<i>Рунчева К.А., Рейда А.І.</i>	
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ДИСКАГЕННИХ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИХ РАДИКУЛОПАТІЙ	75
<i>Рунчева К.А.</i>	
ОСОБЛИВОСТІ ТРИВОЖНО-ДЕПРИСИВНИХ РОЗЛАДІВ У ПАЦІЄНТІВ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ	76
<i>Філенко Д.С., Рунчева К.А.</i>	
СИНДРОМ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ЛІКАРІВ	77
<i>Скомаха О. О.</i>	
ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БІОМАРКЕРІВ ТА ПАРАМЕТРІВ МІКРООТОЧЕННЯ ПУХЛИНИ ПРИ ГЛІОБЛАСТОМІ.....	78
<i>Коломієць Н.В.</i>	
ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ОСІБ З ТРИВОЖНО-ФОБІЧНИМИ ТА СОМАТОФОРМНИМИ РОЗЛАДАМИ ПРИ ЗНИЖЕННІ КРИТИЧНОГО УСВІДОМЛЕННЯ ВЛАСНОГО ПСИХІЧНОГО СТАНУ	79
<i>Кондратенко М.Ю.</i>	
ПОВЕДІНКОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДОРОВ'Я МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК ІЗ СИНДРОМОМ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ	80
<i>Черняк М.О.</i>	

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ДИСКОГЕННИХ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИХ РАДИКУЛОПАТІЙ

Рунчева К.А.

Науковий керівник: зав. кафедрою, д. мед.н., проф. Козьолкін О.А.

Кафедра неврології

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Актуальність: Біль у попереку є значущою глобальною проблемою громадського здоров'я, що уражає близько 619 мільйонів осіб різних вікових груп. Протягом життя симптоми відчувають у середньому 3-5% дорослого населення. Найпоширенішою причиною радикулопатії поперекового відділу хребта є стиснення нервових корінців. Радикулопатія L5 є найпоширенішою поперековою радикулопатією. До 72% пацієнтів з поперековою радикулопатією відчувають парестезію, 35% відчувають іррадіацію болю в нижні кінцівки, а 27% пацієнтів повідомляють про оніміння.

Мета дослідження: Оцінити сучасні методи діагностики дискогенних попереково-крижових радикулопатій на основі аналізу актуальної літератури.

Матеріали та методи: Проведено огляд сучасних наукових публікацій (2015-2025) у базах PubMed, Scopus, Web of Science. Включено клінічні дослідження, метааналізи та міжнародні рекомендації (NICE, EFNS, AAN). Застосовано методи порівняльного аналізу та критичної оцінки доказів.

Результати: У результаті аналізу сучасних досліджень встановлено, що рівень узгодженості між магнітно-резонансною томографією (МРТ) та електронейроміографією (ЕНМГ) у діагностиці дискогенних попереково-крижових радикулопатій є помірним і становить близько 59,6% . При цьому частота виявлення патології за даними МРТ досягає 71%, тоді як за ЕНМГ — 58%. Показано, що ЕНМГ забезпечує об'єктивну оцінку функціонального стану нервових корінців, дозволяючи виявляти ознаки денервації (фібриляційні потенціали, позитивні гострі хвилі), зміни рекрутування та параметри моторних одиниць, що відображають ступінь аксонального ураження . Встановлено, що ЕНМГ є більш специфічним методом порівняно з МРТ, проте характеризується нижчою чутливістю, що обмежує його використання як скринінгового інструменту. Водночас МРТ, маючи високу чутливість (до 75%) і низьку специфічність (близько 25%), не дозволяє оцінити функціональну значущість виявлених змін . Не виявлено статистично значущого зв'язку між результатами ЕНМГ, МРТ та клінічними проявами при їх ізольованому застосуванні ($p < 0,05$).

Висновки: Аналіз сучасної літератури показує, що МРТ ефективна для виявлення структурних змін у корінцях, але не дозволяє оцінити тяжкість аксонального ураження і прогноз функціонального відновлення. ЕНМГ надає дані про нервову провідність, дає змогу кількісно оцінити ураження нервів та відстежувати прогресування стану пацієнта з часом. Комбіноване використання МРТ і ЕНМГ підвищує діагностичну цінність і дозволяє формувати більш точний прогноз перебігу захворювання, що є ключовим для планування лікування і подальших досліджень. Обмеження попередніх ретроспективних досліджень (неповна вибірка, дані з анамнезу) підкреслюють необхідність проспективних досліджень, які враховують обидва методи одночасно.