МЗ УКРАИНЫ
ЗАПОРОЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ -1

В.Д.СЫВОЛАП

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
В НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ

Учебное пособие

Запорожье – 2015

УДК 616.12-083.98-073.432.19(075.8)

ББК 54.101я73

С 34

Утверждено на заседании Центрального методического совета
Запорожского государственного медицинского университета в качестве
учебного пособия
Протокол № 1 от 25.09 2014 г

Автор:

Сыволап В.Д., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней 1

Рецензенты:

Сыволап В.В., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней с уходом за больными ЗГМУ

Доценко С.Я., профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней-
3 ЗГМУ

Учебное пособие по электрокардиографической диагностике
нарушений ритма и проводимости в неотложной кардиологии составлено для
студентов VI курса медицинского университета, обучающихся по
специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия», с целью оптимизации
учебного процесса и контроля знаний при изучении дисциплины
«Внутренняя медицина», Модуль 5.

© Запорожский государственный
медицинский университет, 2015

Оглавление

Электрокардиографическая диагностика аритмий	
Классификация нарушений ритма и проводимости сердца	
Классификация нарушения ритма и проводимости сердца в зависимости от необходимости проведения неотложной терапии.....	
ЭКГ-критерии диагностики нарушений сердечного ритма, требующих неотложной терапии.....	
Жизнеугрожающие нарушения ритма сердца.....	
Тесты по электрокардиографической диагностике нарушений ритма и проводимости.....	
Ситуационные задачи.....	
Литература.....	

Электрокардиографическая диагностика аритмий

Аритмии сердца - нарушения частоты, ритмичности и (или) последовательности сердечных сокращений: учащение (тахикардия) либо урежение (брадикардия) ритма, преждевременные сокращения (экстрасистолия), дезорганизация ритмической деятельности (фибрилляция предсердий и т.д.)

Причины аритмий: заболевания сердечно-сосудистой системы (все формы ишемической болезни сердца, включая инфаркт миокарда и постинфарктный кардиосклероз, гипертоническую болезнь, пороки сердца, кардиомиопатии, пролапс митрального клапана), врожденные аномалии проводящей системы сердца (дополнительные атриовентрикулярные соединения у больных с синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта – WPW, двойные пути проведения в АВ соединении у больных с реципрокной АВ узловой тахикардией), врожденные и приобретенные нарушения процесса реполяризации миокарда желудочков сердца (синдромы удлиненного интервала Q – T: синдромы Джервелла-Ланга-Нильсена, синдром Романо-Уорда; синдром Бругада), электролитные расстройства (гипокалиемия, гипокальциемия, гипомагниемия), прием некоторых лекарственных средств, алкоголя, наркотиков и галлюциногенов (кокаин, амфетамины и т.д.) или избыточное употребление кофеин содержащих напитков.

Электрофизиологические механизмы аритмий: включают нарушения автоматизма (ускоренный нормальный автоматизм, патологический автоматизм), циркуляцию волны возбуждения (микро и макро re-entry) в анатомических структурах миокарда (трепетание предсердий, синдром WPW, двойные пути проведения в АВ соединении, некоторые варианты желудочковой тахикардии) и в функционально обусловленных структурах миокарда (фибрилляция предсердий, некоторые виды желудочковой тахикардии, фибрилляция желудочков), триггерную

активность в виде ранних и поздних постдеполяризации (torsades de pointes, экстрасистолия).

Классификация нарушений ритма и проводимости сердца

Нарушение образования импульса

I49.8 — нарушения синусового ритма

- синусовая тахикардия (более 90 комплексов в минуту)
- синусовая брадикардия (менее 60 комплексов в минуту);
- синусовая аритмия.

I45.5 — остановка (отказ) синусного узла

I49.8 — выскальзывающие комплексы и ритмы:

- предсердные:
 - медленные;
 - ускоренные;
- из AV-соединения:
 - медленные;
 - ускоренные;
- желудочковые:
 - медленные;
 - ускоренные.

I45.8 — AV-диссоциации

I49.8 — миграция наджелудочкового водителя ритма

Экстрасистолия

I49.1 — предсердная;

I49.2 — предсердно-желудочковая (AV);

I49.3 — желудочковая;

- одиночная (до 30 эктопических комплексов в час);
- частая (30 и более эктопических комплексов в час);
- аллоритмия (би-, три -, квадригеминия);
- полиморфная;

- парная;
- ранняя (R на T)

I47.1 — тахикардии

- реципрокные:
 - хронические;
 - пароксизмальные;
- очаговые (эктопические):
 - хронические;
 - пароксизмальные.

Наджелудочковые тахикардии:

- сино-предсердная (синоатриальная);
- предсердная (атриальная);
- предсердно-желудочковая (AV);
- узловая:
 - обычного типа;
 - необычного типа;
- с дополнительными путями проведения:
 - ортодромная;
 - антидромная.

Желудочковые тахикардии:

- I47.2 — нестойкая (от 3 желудочковых комплексов до 30 с):
 - мономорфная;
 - полиморфная;
- I47.2 — стойкая (более 30 с):
 - мономорфная;
 - полиморфная;
- I47.0 — постоянно-возвратная:
 - мономорфная;
 - полиморфная.

I48 — фибрилляция и трепетание предсердий:

- впервые возникший пароксизм:
 - брадисистолический вариант (частота желудочковых сокращений менее 60 уд./мин);
 - тахисистолический вариант (частота желудочковых сокращений более 90 уд./мин);
- пароксизмальная (ритм восстанавливается самостоятельно в пределах 48 ч):
 - брадисистолический вариант (частота желудочковых сокращений менее 60 уд./мин);
 - тахисистолический вариант (частота желудочковых сокращений более 90 уд./мин);
- персистирующая (когда для восстановления синусового ритма необходимо вмешательство):
 - брадисистолический вариант (частота желудочковых сокращений менее 60 уд./мин);
 - тахисистолический вариант (частота желудочковых сокращений более 90 уд./мин);
- постоянная (когда синусовый ритм восстановить невозможно или нецелесообразно):
 - брадисистолический вариант (частота желудочковых сокращений менее 60 уд./мин);
 - тахисистолический вариант (частота желудочковых сокращений более 90 уд./мин).

I49.0 — фибрилляция и трепетание желудочков.

I45.5 — нарушения проведения импульса

• Синоаурикулярные блокады;

• AV-блокады:

- I44.0 — I степени;
- I44.1 — II степени:
 - I типа;
 - II типа

- I44.2 — III степени.

• Внутривентрикулярные блокады

Однопучковые блокады:

- I45.0 — блокада правой ножки пучка Гиса;
- I44.4 — блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса;
- I44.5 — блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса:
 - постоянная;
 - переходящая.

I45.2 Двухпучковые блокады:

- блокада левой ножки пучка Гиса;
- блокада правой ножки пучка Гиса и передневерхнего разветвления левой ножки пучка Гиса;
- блокада правой ножки пучка Гиса и задне нижнего разветвления левой ножки пучка Гиса.

I45.3 Трехпучковые блокады

Комбинированные нарушения образования и проведения импульса.

I49.4 — парасистолия:

- предсердная;
- из АВ-соединения;
- желудочковая.

Заболевания синдрома и феномены

I49.8 — идиопатические формы аритмий;

- синдромы и ЭКГ-феномены преждевременного возбуждения желудочков:
 - WPW-синдром;
 - синдром укороченного интервала P–R (Лауна — Ганонга — Ливайна).
- Синдром ранней реполяризации желудочков
- Синдром удлиненного интервала Q–T:
 - врожденный;
 - приобретенный.
- Аритмогенная дисплазия ПЖ

- Синдром Бругада

I49.5 — синдром слабости синусного узла

I46.9 — синдром Морганьи — Адамса — Стокса

I49.0 — синдром Фредерика

I46.1 — внезапная сердечная смерть (аритмическая) (смерть, наступившая на протяжении 1 часа после появления первых симптомов заболевания, или существенного ухудшения состояния больного на фоне стабильного хронического течения заболевания):

- с восстановлением сердечной деятельности:

- фибрилляция желудочков;
- асистолия;
- электромеханическая диссоциация (указывается по возможности).

- внезапная сердечная смерть (необратимая):

- фибрилляция желудочков;
- асистолия;
- электромеханическая диссоциация (указывается по возможности);
- остановка сердца (смерть, наступившая более чем через 1 час после появления или увеличения выраженности симптомов заболевания):

- 146.0 — с восстановлением сердечной деятельности;

- 146.9 — остановка сердца необратимая.

Аритмии при нормальной или нарушенной функции кардиостимуляторов различного типа

В диагнозе нужно указать кардиохирургическое вмешательство и устройства, использованные для лечения аритмий и нарушений проводимости сердца (с указанием метода и даты вмешательства) — катетерные (радиочастотные и прочие) деструкции, имплантации водителей ритма и кардиовертеров-дефибрилляторов, проведение кардиоверсии или дефибрилляции (отмечается дата последней) и прочее.

Классификация нарушения ритма и проводимости сердца в зависимости от необходимости проведения неотложной терапии

Нарушения ритма и проводимости, требующие проведения неотложной терапии	Нарушения ритма и проводимости, не требующие проведения неотложной терапии
Наджелудочковые аритмии	Наджелудочковые аритмии
<p>-Пароксизмальная реципрокная АВ узловая тахикардия.</p> <p>-Пароксизмальная реципрокная АВ тахикардия с участием дополнительных предсердно-желудочковых соединений (синдром WPW и другие варианты синдромов преждевременного возбуждения желудочков).</p> <p>- Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий длительностью менее 48 часов вне зависимости от наличия признаков острой левожелудочковой недостаточности или ишемии миокарда</p> <p>-Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий длительностью более 48 часов, сопровождающаяся тахисистолией желудочков и клинической картиной острой левожелудочковой недостаточности (артериальная</p>	<p>- Синусовая тахикардия.</p> <p>- Наджелудочковая (в т. ч. предсердная) экстрасистолия.</p> <p>-Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий длительностью более 48 часов, не сопровождающаяся тахисистолией желудочков и клинической картиной острой левожелудочковой (артериальная гипотония, отек легких) или коронарной недостаточности (ангинозные боли, признаки ишемии миокарда на ЭКГ).</p> <p>-Устойчивая (персистирующая) форма фибрилляции предсердий, не сопровождающаяся тахисистолией желудочков и клинической картиной острой левожелудочковой (артериальная гипотония, отек легких) или коронарной недостаточности (ангинозные боли, признаки ишемии миокарда на</p>

<p>гипотония, отек легких) или коронарной недостаточности (ангинозные боли, признаки ишемии миокарда на ЭКГ).</p> <p>- Устойчивая (персистирующая) форма фибрилляции предсердий, сопровождающаяся тахисистолией желудочков и клинической картиной острой левожелудочковой (артериальная гипотония, отек легких) или коронарной недостаточности (ангинозные боли, признаки ишемии миокарда на ЭКГ).</p> <p>- Постоянная форма фибрилляции предсердий, сопровождающаяся тахисистолией желудочков и клинической картиной острой левожелудочковой (артериальная гипотония, отек легких) или коронарной недостаточности (ангинозные боли, признаки ишемии миокарда на ЭКГ).</p> <p>- Пароксизмальная форма трепетания предсердий длительностью менее 48 часов.</p> <p>- Пароксизмальная форма трепетания предсердий длительностью более 48 часов, сопровождающаяся тахисистолией желудочков и клинической картиной острой</p>	<p>ЭКГ).</p> <p>-Постоянная форма фибрилляции предсердий, не сопровождающаяся тахисистолией желудочков и клинической картиной острой левожелудочковой (артериальная гипотония, отек легких) или коронарной недостаточности (ангинозные боли, признаки ишемии миокарда на ЭКГ).</p> <p>-Пароксизмальная форма трепетания предсердий длительностью более 48 часов, не сопровождающаяся тахисистолией желудочков и клинической картиной острой левожелудочковой (артериальная гипотония, отек легких) или коронарной недостаточности (ангинозные боли, признаки ишемии миокарда на ЭКГ).</p>
--	---

<p>левожелудочковой (артериальная гипотония, отек легких) или коронарной недостаточности (ангинозные боли, признаки ишемии миокарда на ЭКГ).</p>	
Желудочковые аритмии	Желудочковые аритмии
<p>-Фибрилляция желудочков. -Устойчивая мономорфная желудочковая тахикардия. -Устойчивая полиморфная желудочковая тахикардия (в т.ч. torsades de pointes, типа «пируэт») -Неустойчивая желудочковая тахикардия у больных с инфарктом миокарда. - Частая, парная, политопная, желудочковая экстрасистолия у больных с инфарктом миокарда.</p>	<p>-Желудочковая экстрасистолия. -Замещающие ритмы (ускоренный идиовентрикулярный ритм, ритм из АВ-соединения) с ЧСС > 50 ударов в 1 минуту и не сопровождающиеся серьезными нарушениями гемодинамики. -Реперфузионные аритмии после успешной тромболитической терапии у больных с инфарктом миокарда (медленная желудочковая тахикардия, ускоренный идиовентрикулярный ритм), не сопровождающиеся серьезными нарушениями гемодинамики.</p>
Нарушения проводимости	Нарушения проводимости
<p>-Дисфункция синусового узла (синдром слабости синусового узла) с синкопальными состояниями, приступами Морганьи-Эдемса-Стокса либо с ЧСС < 40 ударов в 1 минуту. -АВ блокада II степени с синкопальными состояниями,</p>	<p>-Дисфункция синусового узла без синкопальных состояний и приступов Морганьи-Эдемса-Стокса -АВ блокада I степени -АВ блокада II степени без синкопальных состояний и приступов Морганьи-Эдемса-</p>

приступами Стокса либо с ЧСС < 40 ударов в 1 минуту.	Морганьи-Эдемса- Полная АВ-блокада с синкопальными состояниями, приступами Стокса либо с ЧСС < 40 ударов в 1 минуту.	Стокса -Полная АВ-блокада с ЧСС > 40 ударов в 1 минуту без синкопальных состояний и приступов Стокса. - Моно-, би-, и трифасцикулярные блокады ножек пучка Гиса.
---	--	---

Нарушения ритма и проводимости могут протекать как бессимптомно, так и манифестировать яркой симптоматикой, начиная от ощущений сердцебиения, перебоев в работе сердца, “переворачивания” и “кувыркания” сердца и заканчивая развитием выраженной артериальной гипотензии, стенокардии, синкопальных состояний и проявлений острой сердечной недостаточности.

Окончательный диагноз характера нарушений ритма и проводимости сердца устанавливается на основании ЭКГ.

ЭКГ-критерии диагностики нарушений сердечного ритма, требующих неотложной терапии.

Аритмия	Характеристика ЭКГ
Пароксизмальные тахикардии с узкими комплексами QRS:	
Пароксизмальная реципрокная АВ узловая тахикардия.	Ритм правильный, ЧСС 120-250 в минуту, комплексы QRS узкие (менее 0,12 с), на стандартной ЭКГ зубцы Р не идентифицируются, они сливаются с желудочковым комплексом, располагаясь внутри него. Зубцы Р могут быть выявлены при регистрации чрезпищеводной ЭКГ, при этом интервал R-P не превышает 0,1 с.

<p>Ортодромная пароксизмальная реципрокная АВ тахикардия с участием дополнительных предсердно-желудочковых путей проведения (различные варианты синдрома WPW).</p>	<p>Ритм правильный, ЧСС 120-250 в минуту, комплексы QRS узкие (менее 0,12 с). Возможность идентификации зубцов Р на стандартной ЭКГ зависит от частоты ритма. При ЧСС < 180 ударов в 1 минуту зубцы Р чаще всего могут быть идентифицированы на стандартной ЭКГ, при этом они располагаются позади комплекса QRS с интервалом R-P более 0,1 с. При более частых ритмах идентификация зубцов Р на стандартной ЭКГ затруднительна, однако они хорошо выявляются при регистрации чреспищеводной ЭКГ с интервалом R-P более 0,1 с.</p>
<p>Пароксизмальная форма трепетания предсердий.</p>	<p>Комплексы QRS узкие (менее 0,12 с). Отсутствуют зубцы Р, вместо них на изолинии выявляются пилообразные «волны трепетания предсердий» (зубцы F), наиболее отчетливые в отведениях II, III, aVF и V₁ с частотой 250-450 в минуту. Желудочковые комплексы узкие (менее 0,12 с). Ритм сердца может быть как правильным (при AV-проведении от 1:1 до 4:1 и более) или неправильным, если AV-проведение постоянно меняется. Частота желудочковых сокращений зависит от степени AV-проведения (чаще всего 2:1) и обычно составляет 90-150 в 1 мин.</p>
<p>Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий</p>	<p>Ритм неправильный, комплексы QRS узкие (менее 0,12 с.) Отсутствуют зубцы Р, выявляются "волны фибрилляции предсердий" - крупно- или мелковолновые колебания изолинии, частота предсердных волн - 350-600 в минуту, интервалы</p>

	RR различны.
Пароксизмальные тахикардии с широким комплексом QRS	
Пароксизмальная реципрокная АВ узловая тахикардия с абберрантным проведением по ножкам пучка Гиса	Ритм правильный, ЧСС 120-250 в минуту, комплексы QRS широкие, деформированные (более 0,12 с), на стандартной ЭКГ зубцы Р не идентифицируются, они сливаются с желудочковым комплексом, располагаясь внутри него. Зубцы Р могут быть выявлены при регистрации чреспищеводной ЭКГ, при этом интервал R-P не превышает 0,1 с.
Антидромная пароксизмальная реципрокная АВ тахикардия с участием дополнительных предсердно-желудочковых путей проведения (синдром WPW).	Ритм правильный, ЧСС 120-250 в минуту, комплексы QRS широкие, деформированные (более 0,12 с). На стандартной ЭКГ зубцы Р не идентифицируются, они сливаются с желудочковым комплексом. Однако они могут выявляться при регистрации чреспищеводной ЭКГ с интервалом R-P более 0,1 с.
Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий на фоне манифестирующего синдрома WPW	Ритм неправильный, ЧСС может достигать 250 – 280 в минуту, комплексы QRS широкие, деформированные (более 0,12 с). На стандартной ЭКГ, также как и на чреспищеводной ЭКГ, зубцы Р не идентифицируются. На чреспищеводной ЭКГ могут регистрироваться «волны фибрилляции предсердий».
Пароксизмальная	Ритм правильный, ЧСС может достигать 300 в

<p>форма трепетания предсердий на фоне манифестирующего синдрома WPW</p>	<p>минуту, комплексы QRS широкие, деформированные (более 0,12 с). На стандартной ЭКГ зубцы P не идентифицируются. При регистрации чреспищеводной ЭКГ могут регистрироваться «волны трепетания предсердий» (волны F) перед комплексами QRS в отношении 1:1 с интервалом P-R менее 0,1 с.</p>
<p>Устойчивая пароксизмальная мономорфная желудочковая тахикардия</p>	<p>Аритмия, длительностью более 30 секунд, возникающая в желудочках сердца. Ритм может быть как правильным, так и неправильным с ЧСС от 100 до 250 в минуту. На стандартной ЭКГ комплексы QRS широкие (более 0,12 с), имеющие одинаковую морфологию. Характерным признаком являются «захваты», т.е. проскакивающие «нормальные синусовые» комплексы QRS и «сливные комплексы» QRS, формирующиеся вследствие распространения возбуждения одновременно как из синусового узла, так и из источника возбуждения, располагающегося в желудочках.</p>
<p>Устойчивая пароксизмальная полиморфная желудочковая тахикардия (в т. ч. типа «пируэт», torsades de pointes)</p>	<p>Аритмия, длительностью более 30 секунд, возникающая в желудочках сердца. Ритм может быть как правильным, так и неправильным с ЧСС от 100 до 250 в минуту. На стандартной ЭКГ комплексы QRS широкие (более 0,12 с), постоянно меняющие свою морфологию. Возникает чаще всего при синдроме удлинения интервала QT. Характерна синусоидальная картина - группы из двух и более желудочковых комплексов с одним направлением сменяются</p>

	группами желудочковых комплексов с противоположным направлением.
Неустойчивая желудочковая тахикардия в острой фазе инфаркта миокарда	Аритмия, возникающая в желудочках сердца, при которой на стандартной ЭКГ выявляются три и более последовательных широких (более 0,12 с) комплекса QRS с частотой 100-250 в минуту, длительностью не более 30 секунд.
Желудочковая экстрасистолия -частая, парная, политопная в острой фазе инфаркта миокарда	Аритмия, возникающая в желудочках сердца, при которой на стандартной ЭКГ регистрируются внеочередные комплексы QRS, которые расширены (более 0,12 с), деформированны, и имеют дискордантное смещение сегмента ST и зубца T. Компенсаторная пауза (как полная, так и неполная) может присутствовать либо отсутствовать.
Нарушения проводимости Дисфункция синусового узла (синдром слабости синусового узла) с синкопальными состояниями, приступами Морганьи-Эдемса-Стокса	На стандартной ЭКГ характеризуется появлением выраженной синусовой брадикардии (менее 50 в минуту) или эпизодами остановки синусового узла длительностью более 3 секунд с периодами замещающего ритма в виде различных брадиаритмий либо тахиаритмий (синдром брадикардии-тахикардии).
АВ блокада II степени с синкопальными состояниями, приступами Морганьи-Эдемса-Стокса	Тип Мобитц I с периодами Венкебаха-Самойлова характеризуется прогрессирующим удлинением интервала PR с каждым последующим сердечным циклом перед тем, как очередное предсердное возбуждение не проводится на желудочки.

	<p>Тип Мобитц II характеризуется отсутствием изменений длительности интервала PR перед тем, как один или несколько зубцов P внезапно не проводятся на желудочки. Наиболее частым вариантом является АВ блокада 2:1.</p>
<p>Полная AV-блокада с синкопальными состояниями, приступами Морганьи-Эдемса-Стокса</p>	<p>Характеризуется полным разобщение предсердного и желудочкового ритмов, при котором ни одно предсердное возбуждение не достигает желудочков сердца. Как правило сопровождается выраженной брадикардией.</p>

Жизнеугрожающие нарушения ритма сердца

Пароксизмальная желудочковая тахикардия.

Это частый (120- 220 в минуту) ритм, при котором центр возбуждения желудочков находится ниже общего ствола Гиса.

Причины:

- Тяжелое органическое поражение миокарда (инфаркт миокарда, аневризма левого желудочка, кардиомиопатии дилатационная и гипертрофическая, пороки сердца)
- Тяжелые миокардиты
- Аритмогенная дисплазия правого желудочка
- Провокация внешними причинами: проаритмогенный эффект антиаритмических средств (новокаинамид, кордарон), ингаляционные анестетики, операции на сердце
- Низкобелковая диета, голодание.

Механизм возникновения:

- Круговое движение импульса re- entry
- Патологический автоматизм
- «Триггерный»

Клиника:

Клинические проявления гемодинамических нарушений различной степени выраженности - от головокружений, слабости, адинамии, артериальной гипотензии до картины острой левожелудочковой недостаточности (сердечная астма, отек легких), синдром Морганьи-Адамса- Стокса с полной потерей сознания. При отсутствии тяжелой органической патологии может быть только тахикардия.

ЭКГ:

- Внезапно начинающийся и так же внезапно заканчивающийся приступ учащения сердечных сокращений до 140-220 в минуту, при сохранении в большинстве случаев правильного ритма.

- Деформация и расширение комплекса QRS более 0,12 сек с дискордантным расположением сегмента RS-T и зубца T
- Наличие АВ-диссоциации (полного разобщения частоты ритма желудочков и нормального ритма предсердий с изредка регистрирующимися одиночными нормальными неизменными комплексами QRST синусового происхождения)

Полиморфная желудочковая пароксизмальная тахикардия типа «пируэт» torsades de pointes

Это разновидность полиморфной желудочковой тахикардии при замедлении реполяризации желудочков.

Причины:

- Антиаритмические препараты (соталол, амиодарон, хинидин)
- Электролитные нарушения (снижение K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+})
- Брадикардия (СССУ, полная AV- блокада)

Клиника:

Клинически протекает в виде обмороков (за счет нарушения мозговой перфузии).

ЭКГ:

- Появлению приступа тахикардии типа пируэт часто предшествует феномен «каскада»- чередование внезапного укорочения и удлинения интервала R-R, постэкстрасистолической компенсаторной паузы (интервал R-R длинный) и повторной желудочковой экстрасистолы (интервал R-R короткий).
- Частота сердечного ритма во время приступа 150- 250 в минуту, колебания длительности интервала R-R во время приступа 0,20-0,30- 0,40 сек
- Комплексы QRS высокоамплитудные, расширены ($\geq 0,12$ сек), высота и полярность меняются- они направлены то вверх, то вниз

- Пароксизмальная желудочковая тахикардия обычно неустойчивая- общее количество комплексов QRS во время приступов колеблется от 6- 10 до 25- 100.
- Приступ может прекратиться спонтанно, и может неоднократно рецидивировать.
- Может трансформироваться в фибрилляцию желудочков.

Синдром Бругада - идиопатическая рецидивирующая полиморфная пароксизмальная желудочковая тахикардия с блокадой правой ножки пучка Гиса и подъемом сегмента S-T в правых грудных отведениях.

Наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена SCN5A и патологией Na⁺ канала кардиомиоцитов, характеризующееся наличием преходящей полной или неполной блокады правой ножки пучка Гиса, подъемом сегмента S-T в правых грудных отведениях, рецидивирующей пароксизмальной полиморфной желудочковой тахикардией и высоким риском внезапной сердечной смерти.

Аутосомно - доминантный тип наследования.

Клиника: Обморочные состояния

ЭКГ:

- Косонисходящее повышение сегмента S-T над изолинией на 1мм и больше в отведениях V1 -V 3
- Блокада правой ножки пучка Гиса:
- В правых грудных отведениях V1, V2(реже в III, aVF) комплексовQRS типа rSR или rsR , имеющих M- образный вид, причем R>r,
- Наличие в левых грудных отведениях V5, V6 и в отведениях I, aVL уширенного, нередко зазубренного зубца S
- Увеличение ширины QRS более 0,12 сек
- Наличие в отведении V1(реже в III) депрессии сегмента RS-T с выпуклостью, обращенной вверх, и отрицательного или двухфазного ассиметричного зубца T
- Возможно укорочение интервала Q-T и удлинение P-Q

- Пароксизмы полиморфной желудочковой тахикардии, часто рецидивирующие

Трепетание и мерцание (фибрилляция) желудочков.

Трепетание желудочков - это частое (до 200- 300 в минуту), ритмичное их возбуждение, обусловленное устойчивым круговым движением импульса, локализованного в желудочках. Трепетание желудочков, как правило, переходит в мерцание желудочков, отличающееся столь же частым (до 200-500 в минуту), но беспорядочным, нерегулярным возбуждением и сокращением отдельных мышечных волокон желудочков.

Причины:

- Острый инфаркт миокарда, особенно первые 6- 12 часов от его начала
- Гипертрофическая кардиомиопатия
- Дилатационная кардиомиопатия
- Аритмогенная дисплазия правого желудочка
- Пороки сердца (стеноз устья аорты)
- Электротравма
- Гипертермия

Клиника:

Остановка кровообращения с потерей сознания, отсутствие пульса, дыхания, расширение зрачков с отсутствием реакции на свет.

ЭКГ:

Частые до 200- 300 в минуту регулярные и одинаковые по форме и амплитуде волны трепетания, напоминающие синусоидальную кривую

При мерцании желудочков регистрируются частые, но нерегулярные волны, отличающиеся друг от друга различной формой и амплитудой

Желудочковые экстрасистолы.

Это преждевременные сокращения сердца, возникающие под влиянием эктопических импульсов, исходящих из различных участков проводящей системы желудочков.

Механизм возникновения:

Повторный вход возбуждения «re- entry» и постдеполяризация.

Возбуждение вначале охватывает тот желудочек, в котором оно преждевременно возникло, а затем с опозданием распространяется на второй желудочек. Это ведет к появлению ЭКГ - признака желудочковых экстрасистол - расширение и деформация комплекса QRS.

Классификация желудочковых экстрасистол (по В.Lown, M.Wolf, M.Ryan):

I. Редкие, одиночные, монотопные экстрасистолы (менее 30 в 1 час).

II. Частые, одиночные, монотопные экстрасистолы (более 30 в 1 час)

III. Политопные желудочковые экстрасистолы.

IV. А - парные желудочковые экстрасистолы (2 экстрасистолы, следующие непосредственно друг за другом).

IV.Б – групповые «залповые» желудочковые экстрасистолы (следующие друг за другом 3-5 экстрасистолы) и короткие эпизоды желудочковой тахикардии(подряд регистрируются 6 и более эктопических комплексов).

V.- ранние желудочковые экстрасистолы вскоре после зубца Т предыдущего комплекса (экстрасистолы типа «R на Т»)

Клиника:

Перебои в работе сердца, чувство замирания сердца, волнение, слабость. При осмотре- нерегулярный пульс, «выпадение пульса». При аускультации- громкий Iтон.

К угрожающим желудочковым экстрасистолам относятся:

- Частые экстрасистолы (более 30 в час)
- Политопные желудочковые экстрасистолы
- Парные желудочковые экстрасистолы (по 2 сразу)
- Ранние желудочковые экстрасистолы типа «R наТ»

ЭКГ- признаки:

- Преждевременное внеочередное появление измененного желудочкового комплекса QRS;

- Значительное расширение и деформация экстрасистолического комплекса QRS’;
- Расположение сегмента RS- T и зубца T’ экстрасистолы дискордантно направлению основного зубца комплекса QRS;
- Отсутствие перед желудочковой экстрасистолой зубца P;
- Наличие в большинстве случаев после желудочковой экстрасистолы полной компенсаторной паузы.

Синдром слабости синусового узла (СССУ) включает различные нарушения ритма и проводимости:

- Синусовая брадикардия - это ритм с ЧСС < 60уд/мин
- Остановка синусового узла
- Синоатриальная блокада
- Чередование периодов синусовой брадикардии с пароксизмами наджелудочковых тахикардий (синдром брадикардии-тахикардии).
- Замедление восстановления синусового ритма после подавляющей ЭКС.

Причины СССУ:

- Ишемическая болезнь сердца,
- Фиброзные и склеротические и дегенеративные изменения в миокарде и тканях синусового узла, вследствие заболеваний сердца воспалительного, обменного, аутоиммунного характера.
- Артериальная гипертония.

Клинические проявления:

- Обморок, головокружение, слабость, одышка(в результате нарушения перфузии головного мозга)
- «Провалы в памяти», дезориентация, беспокойства- чаще у пожилых людей
- Очаговые неврологические знаки
- Жалобы со стороны внутренних органов, обусловленных нарушением кровообращения в них

- Критериями угрозы жизни для больного с СССУ является продолжительная асистолия более 3- 5 сек, у большинства больных развивается приступ Морганьи - Адамса- Стокса.

Необходим дифференциальный диагноз с лекарственными, или нейрогенными (вазовагальными) синусовыми брадиаритмиями.

Для этих целей наиболее доступна проба с атропином. Больному вводится внутривенно раствор атропина сульфата в дозе 0,025 мг/кг массы тела больного. Прирост ЧСС более чем на 10% от исходного уровня после введения атропина и исчезновение клинических симптомов, говорят в пользу вегетативной дисфункции синусового узла.

Синдром Морганьи - Адамса- Стокса

В основе этого синдрома лежит ишемия центральной нервной системы вследствие асистолии желудочков или внезапно возникшего уменьшения ЧСС.

Развивается:

В момент перехода неполной АВ- блокады II в полную,

При полной АВ- блокаде, когда происходит уменьшение частоты импульсов, генерируемых центром автоматизма.

Клиника:

- Первые 3-5 сек предобморочное состояние, внезапное сильное головокружение, слабость, шум в ушах , мелькание мушек перед глазами, нарушение координации, дезориентация;
- Следующие 10- 20 сек потеря сознания, клонические подергивая мышц лица и туловища, ослабевает дыхание. При осмотре: бледность кожных покровов, акроцианоз.
- Далее развиваются эпилептиформные судороги, непроизвольное мочеиспускание, расширение зрачков.
- Если ритм сердца не участится или не будет произведена ЭКС, наступит клиническая смерть.

- В большинстве случаев приступы длятся 10- 20 сек иногда до 1 мин и заканчиваются благоприятно, благодаря спонтанному учащению желудочкового ритма.

Атриовентрикулярная блокада

АВ-блокада 2-й степени типа Мобитц II проявляется периодическим выпадением желудочковых комплексов без предшествующего замедления АВ-проведения.

Уровень блокады — пучок Гиса или его ножки.

Причины: ИБС (часто — передний инфаркт миокарда), повышение парасимпатического тонуса, болезнь Ленегра, побочное действие антиаритмических средств.

Часто переходит в полную АВ-блокаду, особенно при блокадах ножек пучка Гиса.

Клиника: перебои в сердце, дурнота, обмороки, одышка, слабость, головокружение.

ЭКГ:

- Неправильный ритм сердца,
- Постоянный интервала PQ,
- Наличие периодов Самойлова- Венкебаха без предшествующего удлинения интервалов PQ. Выпадения могут повторяться через определенное число проведенных комплексов,
- Паузы (периоды Самойлова - Венкебаха) по своей продолжительности равны удвоенному интервалу P-P

Атриовентрикулярная блокада III степени (полная атриовентрикулярная блокада).

Атриовентрикулярная блокада III степени - полное прекращение проведения импульса от предсердий к желудочкам, в результате чего предсердия и желудочки возбуждаются и сокращаются независимо друг от друга.

Причины: ИБС (в том числе — инфаркт миокарда), побочное действие лекарственных средств, болезнь Ленегра, реже-инфильтративные (амилоидоз, саркоидоз, метастазы в сердце), ревматические (полимиозит, системная склеродермия, ревматоидный артрит) и инфекционные болезни (болезнь Чагаса, лаймская болезнь), аортальный стеноз с выраженным обызвествлением клапана, инфекционный эндокардит.

Клиника:

Головокружение, обмороки, ощущение «перебоев» в сердце, одышка, слабость. Наиболее тяжелой формой является синдром Морганьи - Адамса-Стокса.

На ЭКГ при атриовентрикулярной блокаде III степени определяется полное разобщение деятельности предсердий и желудочков:

- Зубцы Р могут регистрироваться в самые различные моменты систолы и диастолы желудочков, иногда наслаиваясь на комплекс QRS или зубцы Т и деформируя их.
- Нет закономерной взаимосвязи комплексов QRS и всегда предшествующего им зубца Р. Это является главным признаком полной атриовентрикулярной блокады.
- В большинстве случаев интервалы Р—Р и R — R постоянны, но R — R больше, чем Р—Р.
- Если имеется проксимальная атриовентрикулярная блокада III степени, водитель ритма желудочков обычно расположен в АВ-соединении ниже места блокады. Поэтому возбуждение распространяется по проводящей системе желудочков обычным путем и комплексы QRS не изменены. Число желудочковых сокращений обычно не ниже 40—60 в минуту.
- Если имеется полная дистальная (трифасцикулярная) атриовентрикулярная блокада, источник ритма желудочков расположен в одной из ветвей пучка Гиса. Ход возбуждения желудочков резко нарушен, и комплексы QRS уширены и деформированы, а число желудочковых сокращений не превышает 40—45 в минуту.

ТЕСТЫ ПО ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ

01. Определите нарушение ритма.

- А. Желудочковая пароксизмальная тахикардия.
- Б. Трепетание желудочков.
- В. Фибрилляция предсердий с блокадой левой ножки пучка Гиса.
- Г. Фибрилляция предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Д. Фибрилляция желудочков.*

02. Определите нарушение ритма.

- А. Желудочковая бигеминия.
- Б. Желудочковая политопная экстрасистолия.
- В. Предсердая экстрасистолия.
- Г. Желудочковая тригеминия.*
- Д. Вставочная желудочковая экстрасистолия.

03. Какие нарушения имеются на ЭКГ? .

- А. Блокада правой ножки пучка Гиса.
- Б. Блокада левой ножки пучка Гиса.
- В. Гипертрофия левого желудочка.
- Г. Гипертрофия правого желудочка и правого предсердия.*
- Д. Гипертрофия левого предсердия.

04. Определите нарушение ритма.

- А. Желудочковая тригеминия.
- Б. Желудочковая политопная экстрасистолии.
- В. Предсердая экстрасистолия.
- Г. Желудочковая тригеминия.
- Д. Вставочная желудочковая экстрасистолия.*

05. Определите тип аритмии.

- А. Фибрилляция предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Б. Трепетание желудочков.
- В. Фибрилляция предсердий с блокадой левой ножки пучка Гиса.
- Г. Возвратная желудочковая пароксизмальная тахикардия.*
- Д. Фибрилляция желудочков.

06. Какие нарушения представлены на ЭКГ? ЧСС 75 в минуту.

- А. Полная блокада правой ножки пучка Гиса.
- Б. Полная блокада левой ножки пучка Гиса.
- В. Блокада правой ножки и передней ветви левой ножки пучка Гиса, инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка.*
- Г. Блокада правой ножки и задней ветви левой ножки пучка Гиса
- Д. Пароксизмальная желудочковая тахикардия.

07. Определите нарушение ритма. ЧСС 150 в мин.

- А. Правожелудочковая пароксизмальная тахикардия.*
- Б. Трепетание желудочков.
- В. Фибрилляция предсердий с блокадой левой ножки пучка Гиса.
- Г. Фибрилляция предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Д. Фибрилляция желудочков.

08. Определите тип нарушения проводимости. ЧСС 60 в мин.

- А. Полная блокада правой ножки пучка Гиса.
- Б. Полная блокада левой ножки пучка Гиса.
- В. Блокада правой ножки и передней ветви левой ножки пучка Гиса.*
- Г. Блокада правой ножки и задней ветви левой ножки пучка Гиса.
- Д. Межпредсердная блокада.

09. Определите вид аритмии. Частота предсердных волн 300 в мин, желудочковых комплексов 150 в мин.

- А. Желудочковая пароксизмальная тахикардия.
- Б. Трепетание предсердий 2:1.*
- В. Фибрилляция предсердий.
- Г. Предсердная пароксизмальная тахикардия.
- Д. Фибрилляция желудочков.

10. Определите вид нарушения проводимости.

- А. Полная блокада правой ножки пучка Гиса.
- Б. Полная блокада левой ножки пучка Гиса.
- В. Блокада правой ножки и передней ветви левой ножки пучка Гиса.*
- Г. Блокада правой ножки и задней ветви левой ножки пучка Гиса.
- Д. Межпредсердная блокада.

11. Какая аритмия представлена на ЭКГ ? ЧСС 150 в мин.

- А. Трепетание желудочков.
- Б. Фибрилляция предсердий с блокадой левой ножки пучка Гиса.
- В. Левожелудочковая пароксизмальная тахикардия.*
- Г. Фибрилляция предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Д. Фибрилляция желудочков.

12. Какая аритмия представлена на ЭКГ? ЧСС 150 в минуту.

- А. Пароксизмальная предсердная тахикардия.*
- Б. Синусовая тахикардия.
- В. Непароксизмальная узловая тахикардия.
- Г. Желудочковая тахикардия.
- Д. Пароксизмальная тахикардия из АВ соединения.

13. Какая аритмия представлена на ЭКГ?

- А. Желудочковая тригеминия.
- Б. Желудочковое выскакивающее сокращение.*
- В. Предсердая экстрасистола.
- Г. Экстрасистола из АВ – соединения.
- Д. Вставочная желудочковая экстрасистолия.

14. Какая аритмия представлена на ЭКГ?

- А. Синусовая аритмия.
- Б. Синоатриальная блокада.
- В. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.
- Г. Синусовая аритмия.
- Д. Ритм из АВ соединения с одновременным возбуждением предсердий и желудочковых.*

15. Определите нарушение ритма.

- А. Желудочковая тригеминия.
- Б. Желудочковая политопная экстрасистолия.
- В. Предсердая экстрасистолия.
- Г. Желудочковая групповая экстрасистолия*
- Д. Вставочная желудочковая экстрасистолия.

16. Определите угол альфа.

- А. Угол альфа 0°
- Б. Угол альфа -60°
- В. Угол альфа $+60^\circ$
- Г. Угол альфа $+90^\circ$ *
- Д. Угол альфа -30°

17. Определите угол альфа.

- А. Угол альфа $+75^\circ$ *
- Б. Угол альфа -60°
- В. Угол альфа $+60^\circ$
- Г. Угол альфа $+90^\circ$
- Д. Угол альфа -30°

18. Определите угол альфа.

- А. Угол альфа 0°
- Б. Угол альфа -60°
- В. Угол альфа $+50^\circ$ *
- Г. Угол альфа $+90^\circ$
- Д. Угол альфа -30°

19. Определите угол альфа.

- А. Угол альфа 0°
- Б. Угол альфа -60°
- В. Угол альфа $+60^{\circ}$
- Г. Угол альфа $+150^{\circ}$ *
- Д. Угол альфа -30°

20. Определите угол альфа.

- А. Угол альфа 0°
- Б. Угол альфа -60°
- В. Угол альфа $+60^{\circ}$
- Г. Угол альфа $+90^{\circ}$
- Д. Угол альфа $+30^{\circ}$ *

21. Определите угол альфа.

- А. Угол альфа 0°
- Б. Угол альфа -60°
- В. Угол альфа $+60^{\circ}$
- Г. Угол альфа $+15^{\circ}$ *
- Д. Угол альфа -30°

22. Определите угол альфа.

- А. Угол альфа 0° *
- Б. Угол альфа -60°
- В. Угол альфа $+60^{\circ}$
- Г. Угол альфа $+90^{\circ}$
- Д. Угол альфа -30°

23. Определите угол альфа.

- А. Угол альфа 0°
- Б. Угол альфа -15° *
- В. Угол альфа $+60^{\circ}$
- Г. Угол альфа $+90^{\circ}$
- Д. Угол альфа -30°

24. Определите угол альфа.

- А. Угол альфа 0°
- Б. Угол альфа -45° *
- В. Угол альфа $+60^{\circ}$
- Г. Угол альфа $+90^{\circ}$
- Д. Угол альфа -30°

25. Определите угол альфа.

- А. Угол альфа 0°
- Б. Угол альфа -60° *
- В. Угол альфа $+60^{\circ}$
- Г. Угол альфа $+90^{\circ}$
- Д. Угол альфа -30°

26. Определите положение ЭОС.

- А. Нормальное положение ЭОС.
- Б. Отклонение ЭОС влево.
- В. Отклонение ЭОС вправо.
- Г. Неопределенное положение ЭОС.*
- Д. Отклонение ЭОС влево и вверх.

27. Определите положение ЭОС.

- А. Нормальное положение ЭОС.
- Б. Отклонение ЭОС влево.
- В. Отклонение ЭОС вправо.*
- Г. Неопределенное положение ЭОС.
- Д. Отклонение ЭОС влево и вверх.

28. Определите положение ЭОС.

- А. Нормальное положение ЭОС.
- Б. Отклонение ЭОС влево.
- В. Отклонение ЭОС вправо.
- Г. Неопределенное положение ЭОС.
- Д. Отклонение ЭОС влево и вверх.*

29. Какое нарушение проводимости представлено на ЭКГ? QRS<0,12с.
Угол альфа -60.

- А. Полная блокада правой ножки пучка Гиса.
- Б. Полная блокада левой ножки пучка Гиса.
- В. Блокада правой ножки и передней ветви левой ножки пучка Гиса.
- Г. Блокада правой ножки и задней ветви левой ножки пучка Гиса.
- Д. Блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса.*

30. Какое нарушение проводимости представлено на ЭКГ? QRS>0,12с.

- А. Полная блокада правой ножки пучка Гиса.
- Б. Полная блокада левой ножки пучка Гиса.*
- В. Блокада правой ножки и передней ветви левой ножки пучка Гиса.
- Г. Блокада правой ножки и задней ветви левой ножки пучка Гиса.
- Д. Межпредсердная блокада.

31. Какое нарушение проводимости представлено на ЭКГ? Угол альфа +120.

- А. Полная блокада правой ножки пучка Гиса.
- Б. Полная блокада левой ножки пучка Гиса.
- В. Блокада правой ножки и передней ветви левой ножки пучка Гиса.
- Г. Блокада правой ножки и задней ветви левой ножки пучка Гиса.*
- Д. Межпредсердная блокада.

32. Определите вид аритмии.

- А. Синусовая аритмия.
- Б. Синоатриальная блокада.
- В. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.
- Г. Синусовая аритмия.
- Д. АВ блокада 2 степени 1 тип с периодической Венкебаха–Самойлова.*

33. Определите вид аритмии.

- А. АВ блокада 2 степени.*
- Б. Синусовая аритмия.
- В. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.
- Г. Синусовая аритмия.
- Д. Синоатриальная блокада.

34. Определите вид аритмии.

- А. Предсердная экстрасистолия
- Б. Синусовая аритмия.
- В. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.*
- Г. Синусовая аритмия.
- Д. Синусовая брадикардия

35. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ?

- А. Предсердная пароксизмальная тахикардия с АВ блокадой и межпредсердной блокадой.*
- Б. Синусовая аритмия.
- В. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.
- Г. Синусовая аритмия.
- Д. Синусовая брадикардия.

36. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ?

- А. Предсердная экстрасистолия.
- Б. Синусовая аритмия.
- В. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.
- Г. Синоартиальная блокада.
- Д. Атриовентрикулярная блокада 2 степени 1 тип с периодической Венкебаха-Самойлова.*

37. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ? ЧСС 100 в мин.

- А. Непароксизмальная АВ тахикардия.
- Б. Синусовая аритмия.
- В. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.

- Г. Синусовая тахикардия.*
- Д. Синусовая брадикардия.

38. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ? ЧСС 150 в мин.

- А. Предсердная пароксизмальная тахикардия.*
- Б. Синусовая аритмия.
- В. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.
- Г. Синусовая тахикардия.
- Д. Синусовая брадикардия.

39. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ?

- А. Предсердная экстрасистолия.
- Б. Синусовая аритмия.
- В. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.
- Г. Предсердная возвратная пароксизмальная тахикардия.*
- Д. Синусовая брадиаритмия.

40. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ?

- А. Правожелудочковая пароксизмальная тахикардия.
- Б. Трепетание желудочков.*
- В. Фибрилляция предсердий с блокадой левой ножки пучка Гиса.
- Г. Фибрилляция предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Д. Фибрилляция желудочков.

41. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ, отведение V1?

- А. Правожелудочковая пароксизмальная тахикардия.
- Б. Желудочковая политопная экстрасистолия.*
- В. Фибрилляция предсердий.
- Г. Фибрилляция предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Д. Фибрилляция желудочков.

42. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ? 11 стандартное отведение.

- А. Выскакивающее сокращения из АВ соединения.
- Б. Желудочковая экстрасистола.
- В. Предсердная экстрасистола.
- Г. Вставочная нижнепредсердная экстрасистола.
- Д. Вставочная желудочковая экстрасистола.*

43. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ? 11 стандартное отведение.

- А. Желудочковая пароксизмальная тахикардия.
- Б. Трепетание желудочков.
- В. Фибрилляция предсердий с блокадой левой ножки пучка Гиса.
- Г. Фибрилляция предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Д. Нижнепредсердная пароксизмальная тахикардия с блокадой передней ветви левой ножки пучка Гиса.*

44. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ?

- А. Предсердная экстрасистолия.
- Б. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.*
- В. Синусовая тахикардия.
- Г. Синусовая брадикардия.
- Д. Синусовая аритмия.

45. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ?

- А. Предсердная экстрасистолия.
- Б. Миграция суправентрикулярного водителя ритма, полная АВ диссоциация.*
- В. Синусовая тахикардия.
- Г. Синусовая брадикардия.
- Д. Синусовая аритмия.

46. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ? Частота синусового ритма 66 в мин. ЧСС в пароксизме 150 в мин.

- А. Возвратная желудочковая пароксизмальная тахикардия.*
- Б. Трепетание желудочков.
- В. Фибрилляция предсердий с блокадой левой ножки пучка Гиса.
- Г. Фибрилляция предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Д. Фибрилляция желудочков.

47. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ?

- А. Предсердная экстрасистолия.
- Б. Синусовая аритмия.
- В. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.
- Г. Предсердная возвратная экстрасистолия. Эхо ритм*
- Д. Синусовая брадикардия.

48. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ?

- А. Предсердная экстрасистолия.
- Б. Синусовая аритмия.
- В. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.
- Г. Предсердная возвратная пароксизмальная тахикардия.*
- Д. Синусовая брадикардия.

49. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ?

- А. Экстрасистолия из АВ соединения с одновременным сокращением предсердий и желудочков.
- Б. Желудочковая экстрасистолия.
- В. Предсердная экстрасистолия.*
- Г. Предсердная вставочная экстрасистолия.
- Д. Экстрасистолия из АВ соединения с предшествующим возбуждением предсердий.

50. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ? ЧСС 43 в мин.

- А. Предсердная блокированная экстрасистолия.
- Б. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.
- В. Синусовая тахикардия.
- Г. Синусовая брадикардия.*
- Д. Синусовая аритмия.

51. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ?

- А. Предсердная экстрасистолия.
- Б. Синусовая аритмия.
- В. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.*
- Г. Синусовая тахикардия.
- Д. Синусовая брадикардия.

52. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ? ЧСС 120 в мин.

- А. Предсердная экстрасистолия.
- Б. Синусовая аритмия.
- В. Синусовая тахикардия, синоатриальная блокада, выскакивающее сокращение из АВ соединения.*
- Г. Синусовая тахикардия.
- Д. Синусовая брадикардия.

53. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ? Частота предсердных и желудочковых сокращений 46 в минуту.

- А. Предсердная экстрасистолия.
- Б. Синусовая брадикардия.
- В. Синусовая тахикардия.
- Г. Фибрилляция предсердий.
- Д. Выскакивающие сокращения из АВ соединения, неполная АВ диссоциация.*

54. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ?

- А. Предсердная экстрасистолия.
- Б. Синусовая аритмия.
- В. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.*
- Г. Синусовая тахикардия.
- Д. Синусовая брадикардия.

55. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ? ЧСС 150 в мин.

- А. Синусовая тахикардия.
- Б. Предсердная пароксизмальная тахикардия.
- В. Синоатриальная пароксизмальная тахикардия.
- Г. Пароксизмальная тахикардия из АВ соединения с одновременным сокращением предсердий и желудочков.*
- Д. Ускоренный нижнепредсердный ритм.

56. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ? ЧСС 100 в мин.

- А. Синусовая тахикардия.
- Б. Предсердная пароксизмальная тахикардия.
- В. Синоатриальная пароксизмальная тахикардия.

- Г. Пароксизм фибрилляции предсердий.
- Д. Ускоренный нижнепредсердный ритм.*

57. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ? ЧСС 200 в мин.

- А. Фибрилляция предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Б. Трепетание желудочков.
- В. Фибрилляция предсердий с блокадой левой ножки пучка Гиса.
- Г. Желудочковая пароксизмальная тахикардия.*
- Д. Фибрилляция желудочков.

58. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ?

- А. Фибрилляция предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Б. Трепетание желудочков.
- В. Фибрилляция предсердий с блокадой левой ножки пучка Гиса.
- Г. Желудочковая пароксизмальная тахикардия.
- Д. Фибрилляция желудочков.*

59. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ?

- А. Фибрилляция предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Б. Трепетание желудочков.*
- В. Фибрилляция предсердий с блокадой левой ножки пучка Гиса.
- Г. Желудочковая пароксизмальная тахикардия.
- Д. Фибрилляция желудочков.

60. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ?

- А. Вставочная желудочковая экстрасистола.
- Б. Предсердная экстрасистола.
- В. Экстрасистола из АВ соединения.

- Г. Желудочковая экстрасистола.*
- Д. Выскакивающее желудочковое сокращение.

61. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ? ЧСС 80 -120 в мин.

- А. Миграция суправентрикулярного водителя ритма.*
- Б. Синусовая брадикардия.
- В. Синусовая тахикардия.
- Г. Пароксизмальная предсердная тахикардия.
- Д. Предсердная экстрасистолия.

62. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ ? ЧСС 160 в мин.

- А. Синусовая тахикардия.
- Б. Предсердная пароксизмальная тахикардия.
- В. Синоатриальная пароксизмальная тахикардия.*
- Г. Ускоренный ритм з АВ соединения.
- Д. Ускоренный нижнепредсерный ритм.

63. Какое нарушение ритма представлено на ЭКГ?

- А. Фибрилляция предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Б. Трепетание желудочков.
- В. Фибрилляция предсердий с блокадой левой ножки пучка Гиса.
- Г. Желудочковая пароксизмальная тахикардия.
- Д. Фибрилляция желудочков.*

64. Определите нарушение ритма. ЧСС 100 в мин.

- А. Нижнепредсердный ритм.
- Б. Полная АВ блокада.
- В. АВ ритм с одновременным возбуждением предсердий и желудочков.

- Г. АВ ритм с предшествующим возбуждением желудочков.
Д. Ускоренный идиовентрикулярный ритм.*

65. Какие нарушения имеются на ЭКГ?

- А. Вставочная желудочковая экстрасистолия.
Б. Предсердная экстрасистолия.
В. Экстрасистолы из АВ соединения.
Г. Желудочковая бигеминия.*
Д. Выскакивающие желудочковые сокращения.

66. Какие электрокардиографические нарушения имеются в отведении V1 на ЭКГ?

- А. Синоатриальная блокада.
Б. Межпредсердная блокада 1 степени.
В. АВ блокада 1 степени, блокада правой ножки пучка Гиса*.
Г. АВ блокада 2 степени 1 тип.
Д. АВ блокада 3 степени.

67. Какие нарушения имеются на ЭКГ? Частота зубца Р 85 в мин. Частота QRS 42 в мин.

- А. Синоатриальная блокада.
Б. Межпредсердная блокада 1 степени.
В. АВ блокада 1 степени.
Г. АВ блокада 2 степени 1 тип.
Д. АВ блокада 3 степени, проксимальный тип*.

68. Какие нарушения имеются на ЭКГ? Частота зубца Р 60 в мин. Частота QRS 30 в мин.

- А. АВ блокада 3 степени, дистальный тип.*
- Б. Межпредсердная блокада 1 степени.
- В. АВ блокада 1 степени.
- Г. АВ блокада 2 степени 1 тип.
- Д. Синоатриальная блокада.

69. Какой электрокардиографический синдром зарегистрирован на ЭКГ?

- А. Блокада левой ножки пучка Гиса.
- Б. Синдром ВПВ.*
- В. Блокада правой ножки пучка Гиса.
- Г. Блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса.
- Д. Блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса.

70. Какие нарушения имеются на ЭКГ? ЧСС в пароксизме 180 в мин.

- А. Фибрилляция предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Б. Трепетание желудочков.
- В. Фибрилляция предсердий с блокадой левой ножки пучка Гиса.
- Г. Желудочковая пароксизмальная тахикардия.
- Д. Двунправленная пароксизмальная желудочковая тахикардия.*

71. Какие нарушения имеются на ЭКГ?

- А. Гипертрофия левого предсердия.
- Б. Гипертрофия правого предсердия.

- В. Гипертрофия правого и левого предсердий.*
- Г. Правопредсердный эктопический ритм.
- Д. Левопредсердный эктопический ритм.

72. Какие нарушения имеются на ЭКГ? ЧСС 100 в мин.

- А. АВ блокада 3 степени, дистальный тип.
- Б. Нижнепредсердный ускоренный ритм.*
- В. АВ блокада 1 степени.
- Г. АВ блокада 2 степени 1 тип.
- Д. Синоатриальная блокада.

73. Какие нарушения имеются на ЭКГ?

V6

- А. Полная блокада правой ножки пучка Гиса.
- Б. Полная блокада левой ножки пучка Гиса.
- В. Гипертрофия правого желудочка R тип, гипертрофия правого предсердия*.
- Г. Блокада правой ножки и задней ветви левой ножки пучка Гиса
- Д. Гипертрофия левого желудочка.

74. Какие нарушения имеются на ЭКГ? Частота предсердных волн 250 в мин. Частота QRS 125 в мин.

- А. Фибрилляция предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Б. Трепетание предсердий 2:1.*
- В. Фибрилляция предсердий с блокадой левой ножки пучка Гиса.
- Г. Желудочковая пароксизмальная тахикардия.
- Д. Фибрилляция желудочков.

75. Какие нарушения имеются на ЭКГ? ЧСС 80 в минуту.

- А. Фибрилляция предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Б. Трепетание желудочков.
- В. Ускоренный идиовентрикулярный ритм.*
- Г. Желудочковая пароксизмальная тахикардия.
- Д. Фибрилляция желудочков.

76. Какие нарушения имеются на ЭКГ?

- А. АВ блокада 3 степени, дистальный тип.
- Б. Синоатриальная блокада 2 степени 3:2.*
- В. Межпредсердная блокада 1 степени.
- Г. АВ блокада 1 степени.
- Д. АВ блокада 2 степени 1 тип.

77. Какие нарушения имеются на ЭКГ? Частота QRS 33 в мин.

- А. АВ блокада 3 степени, дистальный тип.*
- Б. Межпредсердная блокада 1 степени.
- В. АВ блокада 1 степени.
- Г. АВ блокада 2 степени 1 тип.
- Д. Синоатриальная блокада.

78. Какие нарушения имеются на ЭКГ? ЧСС 40 ударов в минуту.

- А. Синусовая брадикардия*
- Б. Межпредсердная блокада 1 степени.
- В. АВ блокада 1 степени.
- Г. АВ блокада 2 степени 1 тип.
- Д. Синоатриальная блокада.

79. Какие нарушения имеются на ЭКГ? ЧСС 55-75 в мин.

- А. Синусовая брадикардия.
- Б. Миграция водителя ритма.*
- В. АВ блокада 1 степени.
- Г. АВ блокада 2 степени 1 тип.
- Д. Синоатриальная блокада.

80. Какие нарушения имеются на ЭКГ? ЧСС 200 в минуту.

- А. Полная блокада правой ножки пучка Гиса.
- Б. Полная блокада левой ножки пучка Гиса.
- В. Блокада правой ножки и передней ветви левой ножки пучка Гиса.
- Г. Блокада правой ножки и задней ветви левой ножки пучка Гиса.
- Д. Пароксизмальная желудочковая тахикардия.*

81. Какой электрокардиографический синдром представлен на ЭКГ больного с жалобами на приступ удушья, боль в прекардиальной области, резкую слабость, снижение АД ? На ЭКГ: угол альфа + 150. Появился глубокий зубец S в I и высокий R в 111 стандартных отведениях.

- А. Нижний инфаркт миокарда.
- Б. Трепетание желудочков.
- В. Ускоренный идиовентрикулярный ритм.
- Г. Желудочковая пароксизмальная тахикардия.
- Д. Тромбоэмболия ветвей легочной артерии. Синдром S1/qR 111.*

82. Какие нарушения имеются на ЭКГ? ЧСС 80 в мин. Угол альфа + 30.

- А. Полная блокада правой ножки пучка Гиса.*
- Б. Полная блокада левой ножки пучка Гиса.

- В. Блокада правой ножки и передней ветви левой ножки пучка Гиса.
- Г. Блокада правой ножки и задней ветви левой ножки пучка Гиса.
- Д. Межпредсердная блокада.

83. Какие нарушения имеются на ЭКГ? ЧСС в пароксизме 100 в мин.

- А. Фибрилляция предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Б. Трепетание предсердий.
- В. Ускоренный идиовентрикулярный ритм.
- Г. Желудочковая пароксизмальная тахикардия.
- Д. Реципрокная узловая возвратная пароксизмальная тахикардия.*

84. Какие нарушения имеются на ЭКГ? ЧСС 200 в мин.

- А. Пароксизм фибрилляции предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Б. Трепетание желудочков.
- В. Ускоренный идиовентрикулярный ритм.
- Г. Желудочковая пароксизмальная тахикардия.*
- Д. Фибрилляция желудочков.

85. Какие нарушения имеются на ЭКГ? ЧСС 40 в мин.

- А. Синусовая брадикардия.
- Б. Межпредсердная блокада 1 степени.
- В. АВ блокада 1 степени.*
- Г. АВ блокада 2 степени 1 тип.
- Д. Синоатриальная блокада.

86. Какие нарушения имеются на ЭКГ?

- А. Синусовая брадикардия
- Б. Межпредсердная блокада 1 степени.
- В. АВ блокада 1 степени.*
- Г. АВ блокада 2 степени 1 тип.
- Д. Синоатриальная блокада.

87. Какие нарушения имеются на ЭКГ? ЧСС 150 в мин.

- А. Наджелудочковая пароксизмальная тахикардия, полная блокада правой ножки пучка Гиса.
- Б. Наджелудочковая пароксизмальная тахикардия, полная блокада левой ножки пучка Гиса.
- В. Наджелудочковая пароксизмальная тахикардия, блокада правой ножки и передней ветви левой ножки пучка Гиса.
- Г. Наджелудочковая пароксизмальная тахикардия, блокада правой ножки и задней ветви левой ножки пучка Гиса.*
- Д. Желудочковая пароксизмальная тахикардия.

88. Какие нарушения имеются на ЭКГ? ЧСС 180 в мин.

- А. Пароксизм фибрилляции предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Б. Трепетание желудочков.
- В. Ускоренный идиовентрикулярный ритм.
- Г. Желудочковая пароксизмальная тахикардия. *
- Д. Фибрилляция желудочков.

89. Определите нарушение ритма. ЧСС 200 в мин.

- А. Пароксизм фибрилляции предсердий с блокадой правой ножки пучка Гиса.
- Б. Трепетание желудочков.
- В. Ускоренный идиовентрикулярный ритм.
- Г. Желудочковая пароксизмальная тахикардия.
- Д. Фибрилляция предсердий на фоне синдрома ВПВ.*

90. Определите нарушение ритма. ЧСС 100 в мин.

- А. Трепетание предсердий.
- Б. Предсердная пароксизмальная тахикардия.
- В. Синусовая тахикардия.
- Г. Предсердная политопная экстрасистолия.
- Д. Синусовая тахикардия, предсердная и желудочковая экстрасистолы.*

91. Определите нарушение ритма. Интервал PQ 0,56 с.

- А. АВ блокада 1 степени.*
- Б. Предсердная пароксизмальная тахикардия.
- В. Ускоренный идиовентрикулярный ритм.
- Г. Желудочковая пароксизмальная тахикардия.
- Д. Трепетание предсердий

92. Определите нарушение ритма. Отведение V1.

- А. Желудочковая бигеминия.
- Б. Полная АВ блокада, желудочковая экстрасистола.*
- В. Предсердная экстрасистола.
- Г. Желудочковая тригеминия.
- Д. Вставочная желудочковая экстрасистола.

93. Определите нарушение ритма.

- А. АВ блокада 1 степени.
- Б. АВ блокада 2 степени, 2 тип.
- В. Предсердный замещающий ритм.
- Г. Полная АВ блокада, проксимальный тип.*
- Д. АВ блокада 2 степени, 1 тип.

94. Определите нарушение ритма. Частота P 150 в мин. Частота QRS 33 в мин.

- А. Полная АВ блокада, проксимальный тип*.
- Б. АВ блокада 1 степени.
- В. Предсердный замещающий ритм.
- Г. АВ блокада 2 степени, 2 тип.
- Д. АВ блокада 2 степени, 1 тип.

95. Определите нарушение ритма.

- А. АВ блокада 1 степени.
- Б. Полная АВ блокада, проксимальный тип.
- В. АВ блокада 2:1.*
- Г. АВ блокада 2 степени, 2 тип.
- Д. АВ блокада 2 степени, 1 тип.

96. Определите нарушение ритма.

- А. Ритм из АВ соединения.
- Б. Ускоренный идиовентрикулярный ритм.
- В. Синусовая тахикардия.
- Г. Синдром укороченного интервала PQ*
- Д. Синдром ВПВ.

97. Определите нарушение ритма. Частота зубцов P 260 в мин. Частота QRS 180 в мин.

- А. АВ блокада 1 степени.
- Б. Полная АВ блокада, проксимальный тип.
- В. Предсердная пароксизмальная тахикардия с АВ блокадой 2:1.*
- Г. АВ блокада 2 степени, 2 тип.
- Д. АВ блокада 2 степени, 1 тип.

98. Определите нарушение ритма.

- А. АВ блокада 1 степени.
- Б. Полная АВ блокада, проксимальный тип.
- В. Предсердная вставочная экстрасистолия.*
- Г. АВ блокада 2 степени, 2 тип.
- Д. АВ блокада 2 степени, 1 тип.

99. Определите нарушение ритма.

- А. Предсердный Эхо ритм.*
- Б. Полная АВ блокада, проксимальный тип.
- В. Предсердная вставочная экстрасистолия.
- Г. АВ блокада 2 степени, 2 тип.
- Д. АВ блокада 2 степени, 1 тип.

100. Определите нарушение ритма. 11 стандартное отведение.

- А. Вставочная желудочковая экстрасистолия.
- Б. Полная АВ блокада, желудочковая экстрасистолия.
- В. Предсердная экстрасистолия.
- Г. Желудочковая тригеминия.
- Д. Нижнепредсердный ритм. Желудочковая бигеминия.*

**Эталоны ответов
к тестам по электрокардиографической диагностике
нарушений ритма и проводимости ЭКГ.**

1	Д	21	Г	41	Б	61	А	81	Д
2	Г	22	А	42	Д	62	В	82	А
3	Г	23	Б	43	Д	63	Д	83	Д
4	Д	24	Б	44	Б	64	Д	84	Г
5	Г	25	Б	45	Б	65	Г	85	В
6	Г	26	Г	46	А	66	В	86	В
7	А	27	В	47	Г	67	Д	87	Г
8	В	28	Д	48	Г	68	А	88	Г
9	Б	29	Д	49	В	69	Б	89	Д
10	В	30	Б	50	Г	70	Д	90	Д
11	В	31	Г	51	В	71	В	91	А
12	А	32	Д	52	В	72	Б	92	Б
13	Б	33	А	53	Д	73	В	93	Г
14	Д	34	В	54	В	74	Б	94	А
15	Г	35	А	55	Г	75	В	95	В
16	Г	36	Д	56	Д	76	Б	96	Г
17	А	37	Г	57	Г	77	А	97	В
18	В	38	А	58	Д	78	А	98	В
19	Г	39	Г	59	Б	79	Б	99	А
20	Д	40	Б	60	Г	80	Д	100	Д

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Задача № 1

Больной А., 67 лет, поступил в отделение неотложной кардиологии с выраженным ангинозным приступом за грудиной, продолжительностью 30 минут. Состояние средней тяжести. АД 140/90 мм рт. ст. ЧСС 100 в минуту. На момент поступления в отделение боли купированы бригадой "скорой помощи". На протяжении 3-х лет периодически беспокоили боли в области сердца с иррадиацией в левую руку при значительной нагрузке, проходили после приема нитроглицерина. В течение последних 7-ми дней характер ангинозных приступов изменился. Боли участились, увеличилась их продолжительность, количество таблеток нитроглицерина для снятия боли возросло до 5-7, присоединилась одышка при нагрузке, боли сопровождались изменениями ЭКГ преимущественно в боковой стенке левого желудочка (ЭКГ прилагается).

1. Какой диагноз поступления?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом кардиореанимации?

Задача № 2

Больной Б., 65 лет, доставлен «скорой помощью» в отделение неотложной кардиологии с жалобами на слабость, головокружение, одышку, боли в области сердца, частое сердцебиение, которые беспокоят в течение 8-ми часов. В анамнезе эпизоды тахикардии отмечает на протяжении последних 2-х недель. Заболеванию предшествовала острая респираторная вирусная инфекция 4 недели назад, во время которой пациент продолжал работать, не соблюдал постельный режим. Пульс частый, слабого наполнения, артериальное давление 130/80 мм рт.ст. Тоны сердца ослаблены, на верхушке систолический шум. Печень +1 см. Регистрируется пастозность голеней. На ЭКГ:

1. Как охарактеризовать изменения ЭКГ, какой синдром развился у пациента?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом?

Задача № 3

Больной В., 77 лет, доставлен бригадой «скорой помощи» в отделение неотложной кардиологии. После физической нагрузки почувствовал внезапную острую боль за грудиной и в правой половине грудной клетки, одышку, кашель, кровохарканье. В анамнезе: 10 лет болеет стабильной стенокардией напряжения III ФК и покоя. Объективно - цианоз, вздутие шейных вен и тахикардия 110 уд / мин, давление 140/90 мм рт.ст., усиленная пульсация во II-III межреберье, акцент II тона над легочной артерией с систолическим шумом, ритм галопа над мечевидным отростком, боли в области печени, Субфебрильная температура, хрипы в легких. В анализах - нейтрофильный лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом, увеличение СОЭ, повышение ЛДГ (фракции ЛДГ3), нормальная АСТ, гипербилирубинемия, протеинурия. Рентгенологически: деформация корней легких, обеднение легочного рисунка, расширение сердца вправо, расширение корня легких с фрагментацией, ампутация корня, высокое стояние диафрагмы, треугольный очаг уплотнения тканей легких с верхушкой в положении к воротам легких. ЭКГ - прилагается:

1. Какой диагноз поступления?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом?

Задача № 4

Больной Г., 75 лет, обратился в приемное отделение с жалобами на сжимающие боли за грудиной при нагрузке, одышку, аритмичный пульс. Указанные явления отмечает в течение 12 лет. Два года назад перенес инфаркт миокарда без зубца – Q - передне-перегородочно –верхушечной области левого желудочка. В последнее время (полгода) боль и одышка усилились, принимает до 8 таблеток нитроглицерина в сутки. Объективно - цианоз, вздутие шейных вен, аритмичный пульс, АД 150/85 мм рт.ст., ослабленный 1 тон сердца, систолический шум на верхушке, акцент II тона над легочной артерией, печень выступает из-под реберной дуги на 3 см , чувствительная при пальпации, отеки нижних конечностей. ЭКГ - прилагается:

1. Какой диагноз поступления?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом?

Задача № 5

Больной Д., 45 лет, обратился в приемное отделение больницы скорой помощи с жалобами на головную боль, головокружение, мелькание мушек перед глазами. В анамнезе - повышение АД в течение последних 5 лет. Состояние ухудшилось после психоэмоционального напряжения. Объективно - ЧСС 88 в мин, АД 180/110 мм рт.ст., сердечный толчок усилен, тоны сердца звучные, систолический шум на верхушке, печень не увеличена, отеки нижних конечностей отсутствуют, ЭКГ – прилагается:

1. Какой диагноз поступления?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом?

Задача № 6

Больной Е, 48 лет, обратился в поликлинику с жалобами на боль за грудиной при ходьбе в пределах дистанции 2-х кварталов, перебои в работе сердца, головокружение, слабость. Ухудшение состояния отмечает при значительных психоэмоциональных нагрузках последние полгода. Объективно - АД 110/60 мм рт.ст., тоны сердца аритмичные, отеки нижних конечностей отсутствуют, ЭКГ - прилагается:

1. Какой диагноз поступления, осложнение, обследование?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом?

Задача № 7

Больная Ж., 27 лет, обратилась в приемное отделение больницы с жалобами на "колющую" боль в области сердца, связанную с глубокими вдохом, чувство нехватки воздуха, раздражительность, нарушение сна. Ухудшение состояния отмечает после значительного психоэмоционального стресса. Объективно - ЧСС 60 уд / мин, АД 130/80 мм рт.ст., тоны сердца ритмичные, звучные, печень не увеличена, отеков нет. ЭКГ - прилагается:

1. Какой диагноз поступления, осложнения, обследование?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом?

Задача № 8

Больной З., 63 лет, обратился в поликлинику с жалобами на перебои в работе сердца, головокружение, слабость, умеренные боли в области сердца. Ухудшение состояния отметил через 3 недели после перенесенного гриппа, когда появилась одышка, незначительные отеки голеней вечером, общая слабость, субфебрильная температура. Объективно - АД 110/70 мм рт.ст., частота сердечных сокращений 60 в минуту, пульс и деятельность сердца аритмичные, печень безболезненна, пастозность голеней, ЭКГ - прилагается:

1. Какой диагноз поступления и его осложнения?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом?

Задача № 9

Больной И., 57 лет, доставлен в отделение неотложной кардиологии с интенсивным ангинозным приступом, при поступлении АД 60/40 мм рт.ст., внезапно потерял сознание, цианоз, вздутие шейных вен, ЭКГ - прилагается:

1. Какой диагноз поступления и его осложнения?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом?

Задание № 10

Больной К., 63 лет, обратился в поликлинику с жалобами на одышку, боли за грудиной при ходьбе в пределах 300 м, ощущение перебоев, беспокоящих в течение 5 года, причины возникновения не знает. Объективно - пульс аритмичный, АД 130/85 мм рт.ст., тоны сердца приглушены, систолический шум на верхушке, печень выступает из-под реберной дуги на 1 см, отеки голеней - больше к вечеру. ЭКГ - прилагается:

1. Какой диагноз?
2. Какая помощь оказывается врачом?

Задача № 11

Больной Л., 70 лет, доставлен в отделение неотложной кардиологии с колющей пульсирующей болью в области верхушки сердца, ощущением сильного толчка, аритмичный пульс. В анамнезе - стабильная стенокардия III ФК. При развитии эпизодов тахи-/брадикардии, потери сознания был поставлен искусственный водитель ритма (1.09.2013), за последнюю неделю дважды ощущение отсутствия сокращений сердца, слабость, головокружение, однократно кратковременная потеря сознания (25.12.2013), при поступлении пульс ритмичный, АД 110/70 мм рт.ст., ЭКГ – прилагается.

1. Какой диагноз поступления и его возможное осложнение?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом?

Задача № 13

Больной О., 63 лет, доставлен бригадой «скорой помощи» в отделение неотложной кардиологии с жалобами на интенсивный ангинозный приступ. При поступлении в момент регистрации ЭКГ внезапно потерял сознание, пульс на периферических и центральных сосудах отсутствует, АД не определяется, ЭКГ - прилагается:

1. Какой диагноз поступления и его возможное осложнение?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом?

Задача № 14

Больной П., 57 лет, доставлен бригадой «скорой помощи» в отделение неотложной кардиологии с жалобами на интенсивные боли в эпигастрии, давящего характера, длительностью более 3 часов, не купируется приемом но-шпы, баралгина, частично уменьшилась после нитроглицерина, введения анальгина и димедрола. Наблюдались удушье, слабость. Развитие заболевания связывает с посещением свадьбы, где после значительного физического и эмоционального напряжения, употребления алкоголя и большого количества пищи появились выше описанные ощущения, боли нарастали и больной вынужден обратиться за медицинской помощью. Во время обследования пульс 88 уд / мин, артериальное давление 180/95 мм рт.ст., тоны сердца ослабленные, живот мягкий, несколько чувствителен при пальпации в эпигастрии. Уровень лейкоцитов $10 \cdot 10^9$ / л, СОЭ 12 мм / ч, креатинфосфокиназа - 879 Ед / л. Представлена ЭКГ:

1. Какой диагноз поступления и его возможное осложнение?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом?

Задача № 15

Больной Р., 57 лет, поступил с диагнозом - ИБС. Острый трансмуральный инфаркт миокарда передне-перегородочно–верхушечной области с вовлечением боковой стенки левого желудочка (20.12. 2012). Кардиосклероз диффузный. ОСН KillipII. В течение 6-ти суток состояние больного средней тяжести, на ЭКГ - формирование отрицательного зубца Т с возвращением сегмента ST к изолинии. На 7-й день после еды больной неожиданно потерял сознание, откинулся на кровать с громким храпом, в контакт не вступает, на сонных артерий пульс не определяется, артериальное давление не определяется, на мониторе во время приступа регистрируется следующая ЕКГ:

Немедленно начатые неотложные мероприятия привели к следующим изменениям на ЭКГ согласно мониторингу:

1. Какой диагноз поступления и его возможное осложнение?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом?

Задача № 16

Больной С., 47 лет, обратился в поликлинику с жалобами на ухудшение самочувствия, участились и усилились ангинозные приступы, продолжаются 15-20 мин, сопровождаются снижением переносимости нагрузки. В анамнезе последние полгода боли беспокоили при ходьбе на расстояние 800-1000 м, на момент госпитализации ограничил дистанцию до 100 м, увеличил суточное количество нитроглицерин до 18 таблеток в сутки, дестабилизацию состояния отмечает в течение 12 дней.

На ЭКГ, зарегистрированной при осмотре были определены следующие изменения в отведениях V5-6:

После проведенной медикаментозной ургентной коррекции врачом кардиореанимационного отделения, ЭКГ стабилизирована:

1. Какой диагноз поступления и его возможное осложнение?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом?

Задача № 17

Больной Т., 50 лет, поступил в отделение кардиореанимации с выраженным ангинозным приступом, продолжительностью 3 час. Состояние тяжелое. На ЭКГ:

Несмотря на проводимую терапию стабилизации ЭКГ не отмечено. На 3-й день рецидива болевого синдрома, во время акта дефекации больной потерял сознание, на ЭКГ:

1. Какой диагноз поступления и его возможное осложнение?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом?

Задача № 18

Больной У., 67 лет, поступил в отделение кардиореанимации с диагнозом: ИБС. Острый трансмуральный инфаркт миокарда задней с вовлечением верхушечно-боковой стенки левого желудочка (25.05.2012). Кардиосклероз диффузный. ОСН Killip I. Внезапно на 3-и сутки госпитализации возник приступ удушья, боль за грудиной. Акроцианоз, холодный пот, тахикардия 120 уд / мин, артериальное давление 195/110 мм рт.ст., тоны сердца глухие, над всей поверхностью легких масса разнокалиберных влажных хрипов, клокочущее дыхание, живот мягкий, безболезненный, печень выступает из-под реберной дуги на 1 см, безболезненная, на ЭКГ:

1. Какой диагноз поступления и его возможное осложнение?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом?

Задача № 19

Больной Ф., 52 лет, доставлен «скорой помощью» в отделение кардиореанимации с интенсивным ангинозным приступом продолжительностью 4 часа, одышкой, чувством страха смерти. На этапе «скорой помощи» артериальное давление 240/140 мм рт.ст. («Рабочее» давление 130/90-140/95 мм рт.ст.), частота сердечных сокращений 100 ударов / мин. На амбулаторном этапе больной получил 0,15 мг клофелина перорально, 6 мл 0,5% дибазола внутримышечно. На момент осмотра артериальное давление 200/120 мм рт.ст. На ЭКГ регистрируется следующая картина:

1. Какой диагноз поступления и его возможное осложнение?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом?

Задача № 20

Больной Х, 69 лет, доставлен «скорой помощью» в отделение кардиореанимации с потерей сознания, которому предшествовали около 3-х месяцев слабость, головокружение, брадикардия или тахикардия, ощущение перебоев, снижение артериального давления до 100/60 мм рт.ст. На ЭКГ регистрируется следующая картина:

1. Какой диагноз поступления и его возможное осложнение?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом?

Задача № 21

Больной Ц., 52 лет, доставлен «скорой помощью» в отделение кардиореанимации с потерей сознания в течение 2-х минут, которому предшествовали последние 2 - недели слабость, головокружение, одышка, кардиалгии, брадикардия. Болезни предшествовала острая респираторная вирусная инфекция 4 недели назад. Пульс слабого наполнения, аритмичный, артериальное давление 100/60 мм рт.ст. Тоны сердца ослаблены, на верхушке систолический шум. Печень +1 см. Регистрируются пастозность голеней. На ЭКГ:

1. Какой диагноз поступления и его возможное осложнение?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом?

Задача № 22

Больной Ч., 77 лет, доставлен бригадой «скорой помощи» в кардиологическое отделение, жалобы на приступ удушья, усиливающийся после нагрузки, боль за грудиной. В анамнезе 10 лет болеет стабильной стенокардией III ФК и покоя, гипертонической болезнью. Объективно - акроцианоз, холодный пот, тахикардия 100 ударов / мин, давление 180/110 мм рт.ст., тоны сердца слабые, над всей поверхностью легких масса разнокалиберных влажных хрипел, kloчующих дыхания, живот мягкий, печень выступает из-под реберной дуги на 1 см, безболезненная, ЭКГ - появление депрессии сегмента ST в Отвод V5-6 (ЭКГ прилагается).

1. Какой диагноз поступления?
2. Какая неотложная помощь оказывается врачом кардиореанимации?

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (ЗАДАНИЕ)

Задача 1. Диагноз при поступлении: ИБС. Прогрессирующая стенокардия (указать дату). ХСН, II ФК. В лечении - ургентная госпитализация, аспирин 500 мг, клексан 0,8 мл п / к, изосорбида динитрат 20 мг 3 р / д (нитроглицерина аэрозоль , внутривенно нитраты при рецидиве боли за грудиной), метопролол 25 мг 3 р / д, клопидогрель 75 мг 1 р / д, аторвастатин 40 мг 1 р / д.

Задача 2. Диагноз при поступлении: Острый вирусный миокардит. Диффузная форма. Тяжелое течение. Аритмический вариант (пароксизм суправентрикулярной тахикардии (указать дату). ХСН II Б, III ФК. Изменения на ЭКГ - пароксизм суправентрикулярной тахикардии. В лечении - пенициллин 1 млн Ед внутримышечно через 4 ч; внутрь месулид 100 мг 2 р / д; гипотиазид 12,5 мг 1 р / д; кетотифен 1 табл. на ночь , тиклопидин 250 мг 2 раза в сутки; предуктал MR 35 мг 2 р / д, неон 2-4 г в 200 мл 5% раствора глюкозы дважды в сутки в / в. С целью антиаритмической терапии - амиодарон 150 мг в / в и 200 мг внутрь в сутки.

Задача 3. Диагноз при поступлении: ИБС. Стабильная стенокардия напряжения III ФК и покоя. Диффузный кардиосклероз. Тромбоемболия легочной артерии (25.05.08). ХСН II А, неопределенный вариант, III ФК. В лечении - стрептокиназа - 250000 Ед в 20 мл физраствора за 15 мин (30 капель / мин) еще 1250000 Ед в 100 мл 5% раствора глюкозы или 0,9% раствора NaCl за 30-60 мин; дальнейшее внутривенное введение гепарина 20 тыс Ед в сутки в 4 приема или - 0,8 мл клексана п / к. Ликвидация болевого синдрома (1 мл 1% морфина или 3 мл 0,25% дроперидола в комбинации с 2 мл 50% анальгина (или - 2 мл 0,005% фентанила), кислородотерапия, спазмолитики, улучшение микроциркуляции, антибиотики.

Задача 4. Диагноз при поступлении: ИБС. Стабильная стенокардия напряжения III ФК. Постинфарктный (ИМ без Q, передне-перегородочно - верхушечно-боковой ЛЖ (указать дату). Фибрилляция предсердий, постоянная форма. Симптоматическая гипертензия. ХСН II А, III ФК. В лечение: в госпитализации не нуждается, плановое обследование - эхокардиография, коронарорентрокулография. В терапии - изосорбида динитрат 20 мг 3 р / д, метопролол 6,25 мг 1-3 р / д (титруемой), эналаприл 2,5 мг 2 р / д, гипотиазид 12,5 мг 1 р / д, лазикс 40 мг / в 3 дня, аспирин 75 мг 1 р / д, предуктал 1 т 2 р / д, аторвастатин 20 мг.

Задача 5. Диагноз при поступлении: гипертоническая болезнь II ст. Гипертензивное сердце. ХСН 0. В лечении - в госпитализации не нуждается,

проведение плановых дообследований - эхокардиография, холтеровский мониторинг АД, стресс-тесты после стабилизации АД. В терапии после в / в реланиуму - бисопролол 5 мг 1 р / д, эналаприл 5 мг 2 р / д, гипотиазид 12,5 мг 1 р / д, аспирин 75 мг 1 р / д.

Задача 6. Диагноз при поступлении: ИБС. Стабильная стенокардия напряжения, II ФК. Желудочковая бигемения. ХСН 0. В лечении - показана госпитализация и обследование: холтеровский мониторинг ЭКГ, эхокардиография, стресс-тесты. В терапии - амиодарон 200 мг 3 р / д, панангин 1 т 3 р / д, предукталMR 35 мг 2 р / д, аторвастатин 20 мг.

Задача 7. Диагноз при поступлении: Нейро-циркуляторная дистония по кардиальному типу. В лечении - в госпитализации не нуждается, стресс-тесты. В терапии - MgB6 1 таб. 3 р / д, предукталMR 35 мг 2 р / д, Ново-пассит 1 ч.л. 3 р / д.

Задача 8. Диагноз при поступлении: Острый вирусный (послегриппозных) миокардит, очаговая форма, легкое течение, AV блокада II степени II типа, СН I ст, и ФК. В лечении - обязательная госпитализация, ретарпен 1200000 ME в / м 1 р / 3 недели, месулид 100 мг 2 р / д, кетотифен 1 мг - S т 2 р / д, гипотиазид 6,25 мг 1 р / д, атропина сульфат 0,5 мл 0,1%-ного раствора в / в 2 р / д, вобензим 2 др 3 р / д, MgB6 1 таб. 3 р / д, предукталMR 35 мг 2 р / д.

Задача 9. Диагноз при поступлении: ИБС. Острый коронарный синдром (указать дату, время). Синдром Морганьи-Адамса-Стокса. Пароксизмальная желудочковая тахикардия (по типу "Torsadesdespoints"). Кардиогенный шок аритмического генеза (указать время). ОЧН Killip I. В лечении - ургентная дефибрилляция, амиодарон 150 мг в / в капельно, стабилизация гемодинамики (допамин) и метаболизма (неотон) миокарда.

Задача 10. Диагноз при поступлении: ИБС. Стабильная стенокардия напряжения, III ФК. Фибрилляция предсердий, постоянная форма. ХСН III А, III ФК. Лечение: плановая госпитализация, медикаментозная терапия - молсидомин 2 мг S т 3 р / д, амиодарон 200 мг 3 р / д, эналаприл 2,5 мг 2 р / д, гипотиазид 6,25 мг 1 р / д, аспирин 100 мг 1 / д, панангин 1 т 3 р / д, предуктал MR 35 мг 2 р / д, аторвастатин 40 мг.

Задача 11. Диагноз при поступлении: ИБС. Стабильная стенокардия напряжения, III ФК. Кардиосклероз диффузный. Синдром слабости синусового узла. Искусственный водитель ритма (1.09.2009). Синдром Морганьи-Адамса-Стокса, отказ ИВР (25.12.2012). ХСН II А, III ФК. В лечении - консультация кардиохирурга, исследование сократительной способности миокарда.

Задача 13. Диагноз при поступлении: ИБС. Острый коронарный синдром (25.12.2012). Фибрилляция желудочков. ОСН Killip IV. В лечении - ургентная дефибрилляция, искусственный массаж сердца, доступ к центральной вене с катетеризацией, амиодарон 300 мг в / в болюсом, восстановление гемодинамики и метаболизма миокарда.

Задача 14. Диагноз при поступлении: ИБС. Острый Q-инфаркт миокарда задней стенки левого желудочка (24.12.2012 г.). Гипертоническая болезнь III ст. ОСН Killip I. ХСН II А, II ФК. В лечении - стрептокиназа 250000 Ед первая доза и 1750000 Ед полная доза, клексан 0,8 мл п / к, изосорбида динитрат 20 мг 3 р / д, метопролол 25 мг 3 р / д, аспирин 500 мг однократно, затем 75 мг ежедневно, клопидогрель 300 мг 1 р / д, затем 75 мг 1 раз в день, аторвастатин 40 мг 1 р / д.

Задача 15. Диагноз: ИБС. Острый трансмуральный инфаркт миокарда передне-перегородочно-верхушечной и боковой стенок левого желудочка (20.12.2012). Кардиосклероз диффузный. Фибрилляция желудочков. ОСН Killip IV. Осложнения: Фибрилляция желудочков. В лечении - ургентная дефибрилляция, искусственный массаж сердца, доступ к центральной вене с ее катетеризацией, амиодарон 300 мг в / в болюсом, восстановление гемодинамики и метаболизма миокарда.

Задача 16. Диагноз при поступлении: ИБС. Прогрессирующая стенокардия (с 25.12.2012р.). Диффузный кардиосклероз. ХСН I, II ФК. В лечении - ургентная госпитализация, клексан 0,8 мл п / к, изосорбида динитрат 20 мг 3 р / д (нитроглицерина аэрозоль при приступе и внутривенно нитраты в случае рецидивирования боли за грудиной), метопролол 25 мг 3 р / д, кардиомагнил 75 мг, клопидогрель 75 мг 1 р / д, аторвастатин 40 мг 1 р / д.

Задача 17. Диагноз: ИБС. Острый распространенный передний трансмуральный инфаркт миокарда (20.08. 2012). Кардиосклероз диффузный. Пароксизм желудочковой тахикардии. ОСН Killip IV. Осложнения: Пароксизм желудочковой тахикардии. В лечении - ургентная дефибрилляция, доступ к центральной вене и ее катетеризацией, амиодарон 300 мг в / в болюсом, восстановление гемодинамики и метаболизма миокарда.

Задача 18. Диагноз при поступлении: ИБС. Острый трансмуральный инфаркт миокарда задней и верхушечно-боковой стенок левого желудочка (25.05.2012). Кардиосклероз диффузный. ОСН Killip II.

Клинический диагноз: ИБС. Острый трансмуральный и нфаркт миокарда задней с вовлечением верхушечно-боковой стенки левого желудочка (25.05.2012). Отек легких (28.05.2012). ОСН Killip III. ХСН II А, диастолический вариант, II ФК. Осложнения: отек легких. В лечении - нитроглицерин с / л, 1 мл 1% морфина в / в, 0,4 мл 5% пентамина, 40 мг

лазикса, кислород, проходящий через спиртовой раствор антифомсилану, наложение жгутов на конечности; в дальнейшем - инфузия 2 мл 1% нитроглицерин на 150 мл физиологического раствора, продолжение - клексан 0,8 мл п / к, метопролол 12,5 мг 3 р / д, изосорбида динитрат 20 мг 3 р / д, клопидогрель 75 мг 1 р / д, аторвастатин 40 мг.

Задача 19. Диагноз: ИБС. Острый Q - инфаркт миокарда передне-перегородочно-верхушечной стенок левого желудочка (20.05.2012). Кардиосклероз диффузный. Гипертоническая болезнь III ст., Криз. ОСН Killip II. ХСН II А. В лечении - клексан 0,8 мл п / к, бисопролол 5 мг 1 р / д, эналаприл 10 мг 2 р / д, изосорбида динитрат 20 мг 3 р / д, клопидогрель 75 мг 1 р / д, аторвастатин 40 мг. При значительном подъеме АД в терапию может быть включен: клонидин 0,1 мг внутривенно медленно или лабеталол по 50 мг внутривенно повторно через 5 мин, или 200 мг в 200 мл изотонического раствора натрия хлорида внутривенно капельно или пентамин до 50 мг внутривенно капельно или струйно, или натрия нитропруссид 30 мг в 300 мл изотонического раствора натрия хлорида внутривенно капельно, постепенно повышая скорость введения от 0,1 мкг / (кг / мин) до достижения необходимого АД.

Задача 20. Изменения на ЭКГ-отказ синусового узла с паузой 4,4 с и переходом к узловому ритму. Диагноз: синдром слабости синусового узла с приступами синдрома Морганьи-Адамса-Стокса. В лечении-консультация кардиохирурга, установка искусственного водителя ритма, с предварительным введением в / в 1 мл 0,1% атропина ч / з каждые 6 часов, метаболическая терапия - предуктал MR 35 мг 2 р / д, милдронат 5 мл 10% раствора на 10 мл физиологического раствора в / в, неотон 2-4 г в 200 мл 5% глюкозы.

Задача 21. Диагноз при поступлении: Острый вирусный миокардит. Диффузная форма. Тяжелое течение. Аритмический вариант (AV-блокада, II степень, I тип, синдром Морганьи-Адамса-Стокса, (25.05.08 г.). ХСН II Б, диастолический вариант, III ФК. Изменения на ЭКГ: AV-блокада, II степень, I тип. Осложнение: клинический синдром Морганьи-Адамса-Стокса. В лечении-пенициллин 1 млн Ед внутримышечно через 4 ч; внутрь месулид 100 мг 2 р / д; гипотиазид 12,5 мг 1 р / д; кетотифен 1 т, тиклопидин 250 мг 2 раза в сутки; в / м введение 1 мл 0,1% атропина ч / з каждые 12 часов, метаболическая терапия - витамин Е - 1 мл в / м 1 р / д, предуктал MR 35 мг 2 р / д, неотон 2-4 г в 200 мл 5% 2 раза в сутки в / в.

Задача 22. Диагноз при поступлении: ИБС. Прогрессирующая стенокардия (с 20.05.2012р.). Диффузный кардиосклероз. Гипертоническая болезнь II ст. ОСН Killip III, 22.05.2012 г.). ХСН II А, III ФК. В лечении - ургентная госпитализация, нитроглицерин под язык, 1 мл 1% морфины в / в, 0,4 мл 5% пентамина, 40 мг лазикса, дыхание кислородом, проходящим через

спиртовой раствор антифомсилану, наложение жгутов на конечности; дальнейшая терапия - инфузия 2 мл 1% нитроглицерин на 150 мл физиологического раствора, клексан 0,8 мл п / к, метопролол 12,5 мг 3 р / д, изосорбида динитрат 20 мг 3 р / д, клопидогрель 75 мг 1 р / д, аторвастатин 40 мг.

Литература

1. Аритмии сердца — механизмы, патофизиология, лечение / Под ред. проф. Wilbert S. Aronow. — InTech, 2014. — 152 с.
2. Белялов Ф.И. - Аритмии сердца . – 2011. – 165 с.
3. Боттерон Г., Смитт Дж. Тахикардии с широкими комплексами. *Consilium medicum*, 2001, Том3, №2
4. Бунин Ю.А. Неотложная терапия пароксизмальных тахиаритмий. *Consilium medicum*, 2005, Том7, №11.- С.917-925.
5. Кушаковский М.С. Аритмии сердца. Издательство: «Фолиант», 2004.- 672с.
6. Клинические рекомендации. Диагностика и лечение нарушений ритма и проводимости. МЗ Российской Федерации, Москва.2013 г
7. Клиническая аритмология / Под ред. проф. А. В. Ардашева. — М.: МЕДПРАКТИКА-М, 2009. — 1220 с. .
8. Люсов В.А. Аритмия сердца. Терапевтические и хирургические аспекты /В.А. Люсов, Е.В. Колпаков. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 400 с.
9. Неотложная кардиология / Под ред. А. В. Тополянский, О. Б. Талибов - МЕДпресс-информ - 2010 г. 352 с.
10. Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии. – Медицина, "Медицина", 2004. - 528 с.
11. Селивоненко В.Г., Овчаренко В.Т., Сыволап В.Д. Клиническая оценка отведений в электрокардиографии. Киев.: «Здоров'я», 1984.-96 с.
12. Сулимов В.А. Методические рекомендации. Алгоритм диагностики и лечения аритмий на догоспитальном этапе. -Неотложная терапия.- 2004. - №3-4.- С. 8-19.
13. Сыволап В.Д. Клиническая электрокардиография.- Запорожье. – 2008. – 263 с.

14. Сычов О.С. Фибрилляция предсердий. Современные подходы к лечению и профилактике осложнений у пациентов с сопутствующей патологией сердца. - Украинський медичний часопис. – 2011. - №6 (86)
15. Струтынський А.В. Электрокардиограмма. Анализ и интерпретация. – 2013. – 210 с.
16. Сумин С.А. Неотложные состояния. — Медицинское информационное агентство, 2006. — 800 с.
17. Трешкур Т.В. Атриовентрикулярные блокады (клиника, диагностика, лечение), Санкт-Петербург: «Инкарт», 2004, С 53-57.
18. Braunwald's. Heart disease: a textbook of cardiovascular medicine. – 7th Edition Volume 1. – 2005. – 1102 p.
19. Myerburg R.J., Huikuri H.V., Castellanos A. Origins, classification and significance of ventricular arrhythmias. In: Spooner P.M., Rosen M.R. ed. Foundations of Cardiac Arrhythmias. New York, Basel, Marcel Dekker Inc., 2001. 547–569.

**Электрокардиографическая диагностика
в неотложной кардиологии**

Учебное пособие

Сдано в набор г. Подписано к печати г.
Бумага офсетная. Печать – ризограф
Тираж 300. Заказ №
Издательство ЗГМУ
69035. г. Запорожье, ул. Маяковского, 26